



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

U.S. DEPT. OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

WASHINGTON, D.C. 20535

TELEPHONE (202) 452-2000

TELETYPE (202) 452-2000

FAX (202) 452-2000

INTERNET WWW.FBI.GOV

MAIL ROOM (202) 452-2000

RECORDS MANAGEMENT (202) 452-2000

IDENTIFICATION (202) 452-2000

LABORATORY (202) 452-2000

TRAINING (202) 452-2000

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE COURT

OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE

OFFICE OF THE SECRETARY OF HOMELAND SECURITY

OFFICE OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR

OFFICE OF THE SECRETARY OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY OF ENERGY

OFFICE OF THE SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

OFFICE OF THE SECRETARY OF EDUCATION

OFFICE OF THE SECRETARY OF TRANSPORTATION

OFFICE OF THE SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

OFFICE OF THE SECRETARY OF AERONAUTICS AND SPACE

OFFICE OF THE SECRETARY OF ARMY

OFFICE OF THE SECRETARY OF NAVY

OFFICE OF THE SECRETARY OF AIR FORCE

OFFICE OF THE SECRETARY OF MARINE CORPS

OFFICE OF THE SECRETARY OF COAST GUARD

616-

88

F94E

DE SANAN

DIS TOTIVS HVMANI

corporis eiusdemq; partium tam
internis quàm externis malis Li-
bri v. accurata diligentia
conscripti, Leonhar-
to Fuchsio me-
dico auto-
re.

Obiter etiam in nuncupatoria epistola impuden-
tissimum plagium Gualtheri Riffi Ar-
gentoracensis detegitur.

Accessit quoque rerum & verborum
Index locupletissimus.



LVGDVNI, APVD GVIL-

ELMVM ROVILIVM.

M. D. XLVI.



3
A M P L I S S I M O , H V.

M A N I S S I M O ' Q V E P A T R I ,

ac Domino D. Ioanni Gudino Abbati

in Marchtall, Domino suo unicè

colendo, Leonhartus Fu-

chsius medicus

S. P. D.

Therologo



NNO ab hinc tertio, amplissime ^{Secundæ} Pater, perbreuem quandam meden- ^{huius ædi-} ^{tionis oca-} ^{catio,} dirationem, quod id ipsum ut face-
remus à nobis studiosi aliquot effla-
gitarent, conscripsimus, ac subinde
in multa exemplaria transcriptam
publicauimus. Quæ sanè tam incre-
dibili plausu à nostræ arti initiatis est comprobata & exce-
pta, ut breui admodum tempore quotquot apud typogra-
phum extabant exempla distracta sint. Quare cum non de-
essent qui alteram æditionem urgerent, Ioannes Oporinus,
uir singularis eruditionis & iudicij, ut priorem ab initio ad
finem usque retexerem, & in ea si qua minus placerent re-
secarem, aut nonnulla pro arbitrio adijcerem, maiorem in-
modum à me petijt. Quum uerò hunc ipsum æqua à nobis
postulare intelligeremus, committere non potuimus quin
confestim quod tantopere contendebat, præstaremus. In ma-
nus igitur sumptis quæ initio concinnauius, ea summa di-
ligentia reformare, ac ueluti recoquere cœpimus. Quod ^{Quid huic}
dum facio, non tantum operarum incuria & negligentia ^{æditiōi præ-}
commissa errata, quæ sanè non pauca fuerunt, è medio tol- ^{ter priorē}
luntur, uerumetiam quàm plurima quæ non satis arriserunt ^{accesserit,}

nobis mutantur, integraq; capita multa accedunt, ut refin-
gendo ij libri quos De sanādis corporis eiusdemq; partium
malis adornauiamus, nouam planè faciem acceperint. Sed no-
lo hoc loco nostrā operam nimium prædicare, quod quisq;
facile, collatione utrobq; facta quantum accesserit, et ut al-
tera hæc editio priori sit melior et splendidior, cognoscere
poterit. Hoc tantum dixisse satis sit, neminem pecunie suæ ia-
cturam facturum, qui alteram editionem sibi comparare uo-
luerit. Præter enim capita multa admodum, quæ in priore
prorpius desiderantur, integer quoq; Liber Quintus De sa-
nandis tumoribus præter naturam nunc accessit. Quare igitur
complura sint ac minimè contemnenda quæ iam adiecta
sunt, perfacile tantillæ pecunie iacturam sarcient. Dedimus
præterea operam diligentem, ut sublati passim barbaris uo-
cibus, quas tamen data opera in priore locum habere uoluim-
us, pro ijs bonas uel Græcas uel Latinas substitueremus.
Aut si quo in loco id nobis præstare non licuit, ut ijs tantum
uteremur, quas Actuarius et alij posteriores Græci usurpa-
runt. Nam ut singula medicamentorum nomina ijs quibus
in nostris De componendorum ac miscendorum medicame-
torum ratione libris usi sumus responderent, curauimus.
Quare hoc etiam nomine posterior editio charior esse de-
bet. Quæ certè initio nobis præfanda fuerunt, ne parū æqui
iudices nos in hac retexēdi ratione studiosorum pecunie in-
sidiari, atq; adeò typographi auaritiæ, à qua tamē hunc lon-
gissimè abesse omnes norunt, inscruiue uoluissē iudicarent,
æstimantes nos ex aliorum ingenijs, qui non rarò nulli neq;
mutatis neq; adiectis, aureos tamen montes in librorum in-
scriptione polliceri nihil uerentur. Verum prolixiore nobis
excusatione minimè opus esse cēseo, quòd ex cæteris nostris
lucubrationibus quas retexuimus, quid hic etiam præstiterim-
mus,

mus, abundè constare queat. Ceterùm ut de altera editione cogitaremus, nō parum etiā iniurijs cuiusdam Gualtheri Riffi Argentoracensis, hominis omnium quotquot sol ille uidit, impudentissimi, compulsi sumus. Nam quum is fuci m-
 star alienis insidietur laboribus, nec ullum bonum Latium scriptum à nostri ordinis hominibus elaboratum relinquat, quin id ipsum statim simulatq; prodijt arripiat, & in Ger-
 manicum sermonē conuersum, nulla penitus illorum qui eo-
 rundem authores sunt, facta mētionē, pro suo edat: à nostris etiā manus abstinere haud potuit. Superior: nanq; anno li-
 bros quatuor quos De medēdicatione, itemq; tres alios quos De compositione medicamentorum inscripsimus, uerbum uerbo exprimēs pro suis sceleratē edere nō abhorruit. Quod tamen mihi nemo unquam persuadere potis fuisse: nisi ipse collatis suis conuersionibus cum nostris, hoc ipsum euiden-
 ter deprehēdissem. Quis enim ullo tempore Germanum ho-
 minem tam præfacta, omni exhausto rubore, audacia ac te-
 meritate præditum conspexit, ut cum alienos sibi integros li-
 bros impudenter ac sine fronte arrogare nihil puduerit? Nec ulla planè ratione sceleratum hoc suum facinus tueri potest. Nam utcunq; in præfatione Enchiridij fateatur, se sua nō so-
 lum è ueteribus, sed & recentioribus præcipuis & probatis-
 simis medicis deprompsisse: tamen quum ad uerbum omnia è nostris cōuerterit & transcripserit, nostri mētionē prorsus intermissa, ex plagij criminē elabi nō poterit. Quod mul-
 tò minus ut illi liceat, in libello cui titulum indidit, explicatio-
 nem mixturæ seplasiariorum, permitteremus. Nam illic nulla neq; mei neq; aliorum facta mētionē, tanquam in surdo thea-
 tro constitutus, sine omni pudore aliena pro suis edere nihil metuit. Vt igitur tandem impudicam Gualtheri impudētiam re primeremus, atq; eundem ne reliquas quoq; nostras lucu-

Alia huius
 secundæ edi-
 tionis occa-
 sio.

brationes furtiuus suis manibus attrectaret arceremus, eos quos De medendi ratione conscripseramus libros retexere uoluitus. Hac siquidem ratione satis amplam me nactum esse occasionem uidebam, ut plagiarij illius furti inter praefandum toti orbi detegerem, quo subinde moueret cornicularisum, furtiuus nudata coloribus. Vt enim peculiari libello eiusdem improbitatem retunderemus, nihil opus esse, nec id ipsum mereri furti manifesta, existimabam. Quanquam si perrexerit deinceps nostra sibi ut antea uendicare, ne tum quidē proprio scripto illius furtum insectari grauabimur. Et sanē non defuturos etiā alios quosdā puto, qui iniquē lataturi sint, quod eorum scripta inepta sua conuersione cōtaminare, et impudenter sibi arrogare uoluerit. Nam ut de priuata iniuria sileam, quis rogo a quo animo ferret sic profanari ab eo medicinam, ut, si liceret, hanc etiam ab imperitis finis rusticis ac mulierculis exerceri uellet? quasi uerò medicina ipsa artium omnium difficillima, citra linguarum aliarumq; artium adminicula rectē tractari possit. Parum secū reputat asinus ille, quod plus periculi sit ab eius farinae medicis imperitis ac idiotis, quā ab ipso morbo. Sed quum homo ille ἐγκέφαλον δ' ἐκ' ἑχ'», minimē mirum si cum insanis insaniat, furoriq; uulgi faces ministret. Optamus igitur illi meliorem mentem, ut in se descendens, intra suam pelliculam se cōtinere discat: ne si leonima indutus denuō in publicū prodire contendat, quod Cumano olim accidit asino, aures illi promineant, quas, utcūq; annitatur, occultare haud poterit. Redeat itaque ad Seplasiū hortor, et illic, ut olim, phar-maca potius quā bonorū uirorum scripta cōmiscere per-gat. Relicto igitur apud Seplasiarios suos Gualthero, quae reliqua sunt persequemur. Ego cū libros nostros quos olim De medendi ratione concinnaueram, sic retexuerim, ut no-

nam

Plus pericu-
li esse ab im-
peritis, me-
dicis, quā
a proprio mor-
bo.

nam iam quasi formam inducunt, nouum etiam exigere patrocini-
um iudicauimus, praesertim ijs temporibus ubi à praedatoribus istis nulli libri satis tuti esse possunt. Quum uerò de patrono aliquo idoneo inueniendo anxio et sollicito animo essem, nemo omnium cui potius quam tibi hos meos labores dedicarem, occurrebat. Nam in eo rerum statu Literarum et-
rondumq; cul-
tores hodie
propemodum
omni sunt
destituti pa-
trocinio. tu eò propemodum uentum est, ut omni patrocinio artes bonae harumq; cultores destituti sint. Olim quidem Reges ac principes toti in hoc erant, ut bonarum artium studia fouerent, ornarent, tuerentur. Nunc ex illo ordine qui literas magnifaciant, quiq; ut in hoc quo iam sunt splendore conseruentur, atque adeò ad posteros propagentur solicii sint, pauci aut ferè nulli reperiuntur. Longè enim diuersa illorum sunt studia, quam ut literarum curam sustineant, aut ad se salutem pertinere credant. Hic enim totus in eo est, ut imperij sui fines dilatet, nunquam non ultra progredi cupiens, parum scilicet attētus quomodo eos quos nunc tenet rectè gubernet, sicq; in ijs singula administret, ut illic pacis artes, atq; adeò pietas ipsa atq; iustitia floreant. Quasi uerò non maior sit comoditas, ista ratione quae habes tueri ne subinde amittas, quam perpetuò aliena cōsectari. Nam magna ex parte accidit, ut dum mouendus bellis aucupamur aliena, nostra interim, quae pacis cōseruatione retinere potuissemus, amittamus. Alius est, qui sic otio et uoluptatibus diffuat, ut omnē curam Reipublicae abieciisse uideatur. Quare neq; quo in loco sint artium bonarum studia, per quae pietas, religio, pax et tranquillitas cōseruantur, cognoscere studet, sed Sardanapali instar muliebres tantum delicias cōsectatur. Est qui uenationibus tantopere delectetur, ut officij sui parum memor, praeter ijs omnia cōtemnat. Quo sanè uitio maximè dolendo, quotquot hodie ferè sunt Principes obnoxios esse constat: ut fatale esse crederem, nisi perspectum habere

habere idipsum prauæ educationi potius esse adscribendum. Nam quum statim ubi per ætatem licet animi Principum ab omnia cogitatione ad unam colendam uenationem traducantur, nihil mirum, cur amor ille quæ mox ab ineunte ætate contraxerunt, ad senectutem usq; pertinaciter hæreat atque duret. Quod si uerò tantum operæ & curæ parentes, aut alij qui eorundem curam agunt, poneret, ut animos optimis tum disciplinis tum moribus imbutos ad gubernacula adferrent, quantum illos à studijs doctrinæ & humanitatis ad aulicas delicias auocât, multò minus malorum hodie Principū esset. Quis igitur hanc prauā Principum nostri temporis educationem non deploraret? præsertim si secum animo reputet, quàm liberaliter instituti sint ueteres Principes, educatione doctrinæq; puerili? Quis enim est qui nesciat, qualis Cyri Persarum regis πρῶτος fuerit? quàm probè ab Aristotele philosopho excellentiss. institutus sit Alexander Magnus? Utinam hodie etiam sint Principes, quos tantorum regum exemplum moueat, ut prolem suam sic educare curent, ut in ea aliqua in primis sit numinis ueneratio, & nō uulgaris etæga omnes bonas disciplinas, quarum ope respublica gubernatur, amor. Sic enim facile uitia quæuis, ad quæ statim simulatq; scholas deseruerunt, eos effrænata & furiosa nobilitas pertrahere conatur, euitarent. Sed iam ad id unde digressi sumus, reuertamur. Sunt item ex Principibus, qui in extruendis magnificis molibus firmissimisq; arcibus totum uitæ tempus terunt, putantes se ista ratione sua optimè munuisse & firmasse, parū memores quod mirificæ illæ moles modico terramotu labefactari, ac subito cōcidere, aut fulminis ictu tormentorumq; æreorum ui demoliri, aut incendio deflagrare possint. Quantò autē plus ad eam rem momēti adferāt pacis artes, iustitia, moderatio animi, aliæq; uirtutes Principe uiro dignæ,

digna, non animaduertunt. Sed quis posset omnium Principū inutilia studia, quæ illorum animos à cura cōseruationis bonarum artium atq; pietatis auocant, epistola cōplecti: neq; ut id ipsum conemur, necessarium esse existimo, quum in cōfesso sit nullibi esse maiorē literarum artiumq; omnium contemptum, quàm in aulis Principum. Quum itaq; in his ipsis uirtutum satis patrocinium literarum cultores inueniamus, ad uestri ordinis homines nobis cōfugiendum erit. Bona siquidē nobis spes est, fore ut uestri officij memores, literarum desertarum patrocinium promptē sitis suscepturi, hoc potissimū tempore, quo quasi fatali necessitate ingens imminet monasterijs calamitas, si non esse quod debēt uoluerint. Nulla enim alia de causa monasteria ipsa à maioribus nostris fuisse constituta, quàm ut essent scholæ sacrarum literarum, et aliarū disciplinarum Ecclesiæ utilium, in quibus pueri ad tempus inclusi, atq; adeò à cæteris cogitationibus uacātes, optimis tū disciplinis, tum moribus instruerētur, notius esse puto, quàm ut à me longius dici debeat. Vnica igitur nūc cura ijs qui præsunt monasterijs sit, ut primū illi, quos alunt, monachi sic instituantur, ut in ijs non uulgaris sacrarum in primis, aliarumq; artium eluceat eruditio. Deinde ut reliquas suas fortunas ad excitanda et fouenda nunc penitus deserta studia, liberaliter et prolixè profundant. Sic enim efficient, ut primū Ecclesiæ Christi nunquā sint defuturi idonei pastores et ministri. Neq; etiā hac ratione deerunt uiri boni et literis ex culti, qui Rempub. probè et laudabiliter administrarent. Et quod omnium maximum est, eruditorum hominū sibi cōciliabunt summā gratiam, qui sublati nunc abusibus, qui senfim sub pietatis specie in monasteria irrepsērunt ne illa subinde ab ijs qui bona ecclesiarum occupare, inq; suum uertere usum manibus pedibusq; conantur, funditus euertantur, suis

Monasteria cur etiam constituta.

scriptis ac prudentissimis consilijs impediunt. Nam ut nemo uir bonus & peritus temerè superstitionibus alijsq; abusibus patrocinari uolet, ita etiam ut quorundam iniquum sanè institutum, qui bona ecclesiarum & monasteriorum non tantum usurpant, sed & dissipant, probet, fieri haud potest. Quum iure etiam cautum sit, ne illa quæ sacris publicis ueusibus dicata sunt, ullus ad se princeps rapere cogitet. Quare si quid in ijs perperam administrandis ac infumendis peccatum est, hoc corrigat potius, & ut in meliores usus conuertatur, curet. Et certè non sine optimo cōsilio maiores nostri tot ac tanta ecclesiarum esse bona uoluerunt, ut ex ijs scilicet fouerentur nō quidē impietas & superstitio, sed in primis pastores & ministri uerbi Dei, deinde uerò literarū studia & eorundē cultores. Quare si, ut cœptum est, in monasteriorū aliarumq; ecclesiarum bona furore quodam grassari plerisq; impunè licebit, de religione atq; studijs ipsis actum erit. Neq; enim ista ratione futuri sunt unquā, qui sacris discendis operam dare strenuā, aut reliquas cōseētari artes, quibus Respublica gubernatur, uelint. Nā cū sublata uiderint bonarum artium præmia, ad ea potius se studia cōferēt, unde se suosq; cōmodè sustentare & alere possint. Et certè nunc puto satis elucere, quid subinde futurum sit cū ecclesiæ bona prorsus fuerint dilapidata. Quis enim nō uidet nūc esse tātā eorū qui sacra tractant penuriā, ut etiā opifices nulla neque linguarū neq; aliarum artium peritia adiuti, ad munus longè difficillimū docendi uerbum Dei admittātur? Vt nihil mirum sit, quum imperiti homines passim in sacris tractādīs adhibeantur, tot prodigiosa in Ecclesia quotidie oriri dogmata. Quare optandū, ut tandē Deus regum & principū animos hac flectat, ut bona quæ sunt ecclesijs dicata, in usum optimū & Reipub. Christianæ maxime uilē cōuertāt: sic enim plus

plus pietatis, minusq; monstrosarū doctrinarum in ecclesia
erit. Atqui ipse cū paucis aliquot Abbatibus tua spōte facis,
ut ecclesie tue bona in longē optimū usum cōferas. Nam ut
ex aliorū prædicatione cognoui, nullis sumptibus parcis ut
monachi tue cōcrediti curæ sic instituātur, ut illorum, ingra
uescente pastorū penuria, aliquis in ecclesia usus esse possit.
Vides enim in eo esse nunc statu rem Christianā, ut propediē
sint ecclesie aliquot carituræ pastoribus, nisi è monasterijs,
tanquā scholis sacris, illi qui Dei uerbū diligenter doceant,
mittantur idonei ministri. Quare pro tua prudentia summa
intelligis, nō in hoc condita esse monasteria ut illic saginē
tur tantum corpora, sed potius ut in ijs ad publicum usum fo
ueātur uiri pietate, religione & eruditione haud uulgari præ
diti. Verum nō es contētus tuis sic proffexisse, ne illis desint
qui animos eorundē optimis tum moribus tū disciplinis im
buant, sed & omnes quotquot in aliqua sunt eruditionis opi
nionē, maxima beneuolentia cōplecteris eorundēq; studia pro
uiri foues, ornas ac tueris. Quā quidē ratione perpetuam ac
nunquā interiturā laudem tibi cōparas. Sola siquidē laus, quā
doctrinæ cōseruatio parit, immortalis existit. Pergas igitur,
ut cœpisti, studia bonarum artium tegere ac tueri: sic enim
non solū Christo seruatori nostro gratū præstabis officiū,
sed & efficies ut docti omnes te certatim in cœlum laudibus
efferrant. Quod ad me attinet, cōfusus de tua in omnes nostri
ordinis humanitate & beneuolētia, nihil dubito quin lucu
brationes has nostras de Sanandis corporis eiusdemq; partiū
malis inscriptas, hilari & exporrecta fronte sis accepturus.
Quare si spe nostra, quā de te cōcepimus quidem optimam,
frustrati haud fuerimus, ad maiora nomini tuo consecranda
nos extimulabis. Christus te sospitem & incolumem conser
uet. Tubingæ, Cal. Augusti. Anno M. D. XLII.

RERVM AC VOCVM TOTO HOC OPVSCV lo memorabilium, Index.

A Bsynthite uinum	Pagina	Amor geniture conciliatio	191
272. & 370		Angina	178
Aceti uis	485	Ani procidentia	286
ἀκυνόδης ὄρεξις	217	Anirima	287
ἀκμαστικοί	410	ἀνάβατικοί	410
ἀκροχορδῶν	477	Anasarca	314. & 317
Adultus epilepsia correptis quo-		αἰθραξ	466
modo subueniendum	98	αἰσθησία	235
Aetas quæ conceptioni apta	391	αἰτιάδες	174
αερίων	139	ἀπειρία	243
Agarici dilutum	184	Apophlegmatismi	27
αἰμοπύου	191	ἀποπληξία	85
αἰμόπυστος	eadem	Apoplexia quos potissimum in-	
Alboras quid	479	uadat	eadem
Albugines oculorum unde dictæ		Appetentiæ amissio	235
126		Appetentia canina	236
Alcola	163	Aqua miræ utilitatis	259
Alexiteria medicamenta	152	Aqua inter cutem	314
Aloë	281	Aqua inter cutem ad matulone	
Alopecia	25	quid	337
Alui profluuium non temerè si-		Arthritis	404
stendum	256	Arquatus	308
Alui profluuium lumbricis iun-		ἀσκήσεις	279
ctum ut curandum	282	ἀσκήτης	314
ἀλφός	479	Asthma	185
Ambusta	476	ἀσματικὴ	eadem
		Atram	

INDEX.

Atramentum scriptorium refri-		Calculus renum	328
gerat	476	Calculorum differentie	eadem
Aurigo quid	308	Cancri ulcerati curatio.	490
Aurium dolor	140	Calor quid	37
Aurium dolori adhibendū medio		Capillorum defluuium	29
criter calidū esse oportet	141	Caput in profluvio sanguinis na-	
Aurium sonitus	144	rium quomodo cōponēdū	153
ἄφται	163	Capitis dolor ex plenitudine	44
B		Capitis dolor ex siccitate aut hu-	
Alneum podagricis commo-		miditate	42
disimium	411	Capitis dolor è pituitosis humo-	
Βαρυκόλα	146	ribus	50
Betæ foliorum uirtus	476	Capitis dolor è biliosis humori-	
Bilis qua ratione uacuanda	48	bus	47
Bilis atræ fluxiones	410	Capitis dolorem excitantia	60
Bolus armenia	476	Capitis dolor ex calore	37
Bolus purgatorius	50	Capitis dolor ex frigore contra-	
Βουβωνικός	361	cto	40
Βούλιμος	241	Capitis dolor in febriētibus	59
Βράγχος	156	Capitis dolor ex ebrietate	55
Brassica marina	320	Capitis purgatio	90
Βραχυπύται	71	Capitis ulcera manantia	33
Bubones	451	Castoreum	272
Bubones exorti quid portendant		Carbunculus	466
eadem		Carbunculus & anthrax non dif-	
Bulimo sine febre laborātes quo		ferunt	eadem
pacto curandi	241	καρδία	212
Bulle in ambustis quomodo pro-		καρδία	eadem
hibende	476	καρδία	eadem
C		καρδία	77
Acochymia	323	Carus	eadem
		Carus	

INDEX.

Carus à lethargo quomodo differe	169	Columella inflammatio	eadem
rat	eadem	Columna	169
Catapotia ex aloë	10	Coma	80
Cataracta	130	κώμα	eadem
κατάρρα & κατάρρα	155	κώμα simpliciter	eadem
Catarrhi causæ	eadem	κώμα διυσιδ'αγγεγ'ου	eadem
καῦσις	424	κώμα ὑπνωδ'ες	81
καχεξία	313	κώμα ἀγρυπνου	eadem
κνίσις	101	Coma soporiferum	eadem
κνίσις	279	Coma uigilans	eadem
κεφαλαλγία	36	Comitialis passio	98
κεφαλαία	61	Compositio ruffi	58
κίου quid	169	Concipiendi tempus opportunif	
κινίς	eadem	simum quod	391
κισσική	362	Concubitus inuiti cur ferè steri-	
κίλη	361	les	391
Chirurgia curandi ratio in ægilo		Condylomata	288
pe quando necessaria	140	Conuulsio	100
Cholerico nauseantiaqua tepida		Conuulsionis tres species	101
uomitū citans propināda	253	Conuulsio ab inanitione & sic	
Chordapson	276	citare	103
Clauus quid	477	Conuulsio à pituitosis humori-	
Cæcitus nocturna	137	bus	102
Colis resoluti curatio	94	Conuulsio ab ictu fera uenenda	
Colicus dolor à flatulentis spiri-		te	103
tibus	273	Conuulsio à repletionem	101
Colicus dolor ab inflammatio-		Conuulsio per consensum	101
ne	274	Corporis malus habitus	313
Coli dolor	270	κορῶνα	156
Columella	169	Cordis palpitatio	207
Columella laxata	172	κώφωσις	146
		Cremor	

INDEX.

Cremoris ptisanæ facultas	161	Difficultas urinae	350
Cruditæ	243	διψακία	336
χειρὰ δαε	486	Dolor lateralis	189
χολέρα	252	δυσεντερία	262
χολεραῖνες	eadem	Dysenteria	eadem
Cholera	eadem	Dysenteria cruenta quatuor spe	
Cholerici	eadem	cies	eadem

D

D	Ecoctū cinnamomi quid	cedit	260
152		δυσκοκία	146
Dens quomodo citra dolorem et		δυσουρία	350
absq; ferro extrahi possit	161		

E

Dentium dolor	159	E	Buli radices uirtus	318
Dentes denigrati liuentesq; et		E	Edulia poculentaq; semini	
mobiles	162		generando conuenientia	393
Dentium dolor à nuda qualita-			ἐκθύματα	473
tum intemperie obortus quo-			ἐγκαυσίς	38
modo curandus	159	Elaterium cum sale infricatum		
Dentificium optimum	163	uerrucas tollit	477	
Destillatio quid	156	Electuarium de nucibus	459	
Destillationem reprimentia	158	Electuarium de ouo	452	
Destillatione laborans coenare		ἐλμυθες sporγύλαι	279	
quàm prandere parcius de-		ἐμπροδότον	102	
bet	157	ἐμπύημα	202	
Detentio seu deprehensio quid		Empyema	eadem	
78		Empyici	eadem	
Diabetes	336	ἐμπύημα	eadem	
διγερσία	255	ἐντροκαλν	361	
Diaria	413	ἐπαιμασίαι	420	
Diaria due species	eadem	Epialos febris	442	
Diaria plurium dierum	418	ἐπιληψία	94	
		Epilep		

INDEX.

Epilepsie tres differentie	94	Februm continentium duo pre	
ἐπιληψία πρῶτος	96	sentissima remedia	413
ἐπιπλοῦν τροχῶν	362	Febris continua	eadem
ἐπιπλοῦν	361	Febris continuæ ab intermittente	
Erysipelas	464	differentia	425
Erysipelas exquisitum	eadem	Febres inualescentes	420
Erysipelas inflammatum	eadem	Febres consistentes	eadem
Erysipelas scirrhosum	466	Febris quotidiana	441
Erysipelas œdematosum	eadem	Febris tertiana exquisita & cur	
Errhinon nuscitiosis cōuenit	137	sic dicta	430
Error Gentilis & Valesci	455	Febris tertianæ pulsus	432
ἐλαθιματα	472	Febris tertiana notha	436
Exanthemata sublimia	473	Duplex tertiana quæ	432
Exanthemata lata	eadem	Tertiana exacta quæ	eadem
Exanthemata rubei coloris cura		Tertiana extensa quæ	eadem
tu faciliora	474	Febris tertianæ à quartana di-	
Exanthematorum latorum eru		scrimen	432
ptio, cur multis mortis causa		Febris hectica	433
existat	eadem	Hectica quanto tempore duret	
ἐφιάλης	104	445	
ἐφύμερα	413	Febris quartana	438
F		Ferrum in aqua extinctum licni	
Astidium cibi	235	conducit	306
Febris ardens	427	Fluor muliebris	373
Febris ardentis cū exquisita ter-		Fluor ruber	374
tiana intermittente conuenien-		Fluor pallidus & biliosus	375
tia, & differentia	eadem	Fluor albus & saniosus	374
Febris amphimerina	441	Fœnogræci succus ut parandus	
Febris continens	420	224	
Februm continentium tres dif-		Fœtus prodeuntis due naturales	
ferentie	eadem	figure	396
		b	Formica

INDEX.

Formica quid	477	Herpes exedens	eadem
Formica ut penna educenda	478	Hiera picra triplex usus	27
Formica quibus remedijs tollen		Hippocras potus	89
de	eadem	Hirudines	136
Formica quomodo ore sanen-		Hydropis	314
tur	eadem	Hydropis tres species	eadem
Frictio infernarum partium per		Hydrope qui ut plurimum Labo-	
medicamenta calefacientia in		rent	315
sanguinis narium profluio			
confert	153	I	
G		ἰκτερός	308
Alenus phrenitidis specie		Icterus	eadem
expertus	69	Icterus ater	309
γοργαστῶν	169	Iecur lupinum ad quid conducit	
γοργαστῶν	357		293
Grauedo quid	156	Ignis sacer	464
Gramos sanguinis dissoluentia		Iliaca passio	275
342		Iliaca passio quos potissimū tor-	
Gurgulio	169	queat	eadem
H		ἡμιπληγία	85
Hemitritæus	448	ἡμιτρίτω	448
Hemitritæi generatio du-		Impetigo	463
plex	eadem	Impotentia coeundi	360
Hemitritæus nō exquisitus	449	Ineubo siue incubus	104
Hemitritæus exactus quis	eadem	Incubo cur per initia succurren-	
Hemicrania	63	dum	105
Hæmorrhoides	284	Infantes epilepsia correpti quo-	
Hæmorrhoidum due species ea.		modo curandi	97
Hernia	361	Inflammatio quid	460
Hepatici	289	Inflammatio erisipelacea	464
Herpes	462	Iecinoris inflammatio	296
		Iecinoris imbecillitas	289
		Iecin	

INDEX:

Iecimoris obstructio	293	Lienis intemperies	300
ἰσχίαι	400	Lieni medicamenta ualentiora ad	
Ischiadici	eadem	hibenda	204
Ischiadicis adstringentia nō ad-		Lippiiudo	117
hibenda	401	Linguae resolutio	39
ἰσχῶ	144	λίσταργῶ	73
ἰσχυρία	351	Lumbrici	278
Isthmus quid	173	Lumbricorum tria genera eadē	
		Lumbrici teretes quibus familia	
L		res	279
Lactis defectus	216	Lumbricus latus	eadem
Lactis redundantia	218	Lumbricos enecatos quo pacto	
Lac procreantia	eadem	expellere oporteat	283
Lac in grumos conuersum	219	λυγμός	249
Lactis abundantia	eadem		
Lactis crassities	eadem	M	
Ladanum	30	Acula oculi	127
Lamina plumbea lumbis suppo-		Mammarum inflammaz	
sita	359	tio	211
Lateralis dolor	189	Mania	106
Lateris alterius resolutio	68	Mania à sanguine copioso eadē	
λεῖχη	468	Mania à sanguine bilioso	108
λδύκη	479	Manie et phrenitidis discri.	106
λδύκη φλεγματία	314	μαρασμός	444
λδύκωματα	115	Medicamentum presentissimum	
Lethargus	74	ad sistendum sanguinem	154
λεῖψος	260	Medicamenta lumbricos enecan	
Lienteria	eadem	tia	281
Leuitas intestinorum quid eadē		Melancholia	108
Lienis scyrthus	305	Melancholia trifariā nascitur ea.	
Lienis inflammatio	303	Melancholiz tres species	109
Lienis obstructio	307	Melancholia unde potissimū di-	
		gnos	

INDEX.

gnoscatur	eadem	οἰδήμα	482
Melācholia hypochōdriaca	109	Oedema	eadem
Melancholiarum uariæ imagina		ὀζάναι	150
tiones	109	ὁμότοναι	410
Meliloti uis	161	ὁμοτίμη	45
Memoriæ abolitio	82	ὀπιδιόπον	101
Mentagra	469	ὀφθαλμία	117
Menses redundantes	371	Ophthalmia à plenitudine	116
Mense suppressi	365	Ophiafis	25
Menses euocantia	369	Oris exuctio aquam in auribus	
Metrenchitæ	370. & 373	detentam euocat	142
Miliaris herpes	462	Oris collutio	167
μύλη	382	Oris tortura	92
Mola cur dicta	eadem	Oris fœtor	166
Morbilli qui dicuntur	473	ὀρθοπνοιῆ	185
Mulieris fœcundæ forma qualis		Ossa ethmoïdea	156
esse debeat	391	Ouum crudum ambustis præsen	
Mucilago	225	tissimum remedium	476
μυσφίσις	132	Oxycratum	232
		Oxypora	246
		ὄλαι	125
N			
Nausea	227		
νεφίλια	125		
νυκτάλωπιν	137	P	
Nuscitiosi	eadem	Π	
		Αλμός καρδίᾳς	207
		Palmulæ capitis dolorē	
		pariunt	56
O		Papule	473
Œsfitas in coniugatis ui-		πῆσαγμασιν	411
tanda	392	πῆσακωάγχι	179
Obturbatio oris uteri	389	πῆσαλυσιν	88
Oculorum albugines	115	πῆσαπληγία	eadem
Odorem bonum faciens & den-		πῆσασωάγχι	179
tes dealbans	167	πάρεσις	

INDEX.

παρεσις	68	Pituitosi inedia ac famis patientia	
πῆξιμα	173	tes	410
πῆσιπιδου	148	Plenitudo	44
Partus difficultas	325	Plenitu. nervosorum corporum	102
Partus ob secundas difficilis. ead.		πλευρίτις	168
Passio comitialis inueterata quo		Pleuritis	eadem
paeto curanda	98	φλεγμονή	460
Pastilli mansiles	27	φλυκταίναι	122
Pastilli pro suffitu	378	Phlyctenarum color quare variea	
Pediculatio	32	tur	eadem
πέριναιτα	476	πλῆθ	36. 44
πέριναιτου quid	268	πλῆθος	44
Peripneumonia	192	πλῆσις	102
Pestilentia	450	πνιγνάλω	104
Pestilentie causa	eadem	Podagra	404
Pestilentia quo potissimum tem=		Porrigo	32
pore grassetur	451	Porriginem abstergentia	32
Pestilentie tempore fuga optimum		Portulacæ succus	199
remedium	455	Potus in tertiana quando exhi=	
φάρμακα	173	bendus	433
φίμα & φίμοσις	369	Præservatio à pestilentia	455
Phimosi inueterata ut curan=		Priapismus	355
da	390	πρωκταρκτηκία	36
Phreniticis animi perturbatio=		Pruritus	472
nes officunt	72	Pudendi exulceratio	354
πιτυρίαισις	31	Pueri vesicæ calculo magis quā	
πίωσις	129	senes laborant	339
Pilule de cynoglossa	252	Pulvis optimus ad difficultatem	
Pistacia	295	partus	398
Pituitæ eruptiones	473	Pulsus tertianæ	412
Pituitæ extenuatio	51	Pulmonis ulcera quare difficul=	

INDEX.

ter curentur	204	mum cause	eadem
Pupillæ dilatatio	132	Sanguinis eruptio ex uesica	342
Purulenti	201	Sanies intra corneam	129
Pus expurgantia	203	σαρκίτης	314
Pus sub cornea	129	σαρκωκόλη	361
πύρρον γάλακτος	204	Satyriasis	359
πύρρον γάλακτος	120	Scabies	470
φθισίς	32	Sciatica	400
φθισίς	203. B	Sciatici	eadem
ψώρα	470	σκιρρῶς	305
		Scirrhus exquisitus	483
		Scyrrhorum in tendonibus cum	
		ratio	eadem
		Scolopomacherion quid	478
		σκότωμα	63
		Scutum stomachi	216
		Semmis profluuium	357
		Semen extinguentia	359
		Serpentes qui	176
		Siccitas ex se dolorem capitis nō	
		generat	42
		Singultus	249
		Sitis immensa	230
		Somnifera	73
		Soldanella Soldana	320
		σαρκωγνώσις	118
		σαρσμός κυνικός	92
		Spongia recens	482
		Sterilitas ut remouenda	390
		Sterilitatis duplex ratio	391
		Stomachi dolor	212
		Stom	

INDEX.

<i>Stomoma ferrum</i>	306	<i>Tenesmus & tenasmus eadem</i>	
<i>σπασμὸς</i>	348	<i>Tempus conceptioni aptissimū</i>	
<i>Strangulatus seu suffocatio uterina</i>	393		
<i>ri</i>	375	<i>τῆτανθ</i>	102
<i>Strumæ</i>	486	<i>θρόν βοοίς</i>	219
<i>Strumarum differentie eadem</i>		<i>Tinæ capitis</i>	33
<i>Succi quomodo dignoscendi</i>	25	<i>Tinnitus aurium</i>	144
<i>Succi corticis raphani uirtus</i>	312	<i>Tonsille</i>	173
<i>Sudores immodici quæ ratione coërcendi</i>	211	<i>Tophi</i>	411
<i>Sudor in tertiana quomodo eligendus</i>	435	<i>Tormina quæ</i>	262
<i>Suffusio</i>	130	<i>Tremor quid</i>	115
<i>Sugillatio</i>	117	<i>τρύμηθ</i>	eadem
<i>Suppuratio</i>	101	<i>Tunica adnata quid</i>	117
<i>Surditas</i>	146	<i>Tussis</i>	182
<i>Sustiriosi</i>	185	<i>τυμπανίτης</i>	314
<i>σφικτύρ</i>	288	<i>Tympanites eadem</i>	
<i>Syncope</i>	210	<i>Tyria</i>	25
<i>Syncope stomachica</i>	232		
<i>Syncope cordis eadem</i>		V	
<i>σωάγχις</i>	179	<i>Variola</i>	473
<i>σωεχός</i>	414	<i>Venæ rupturæ</i>	323
<i>Synochus citra putredinem</i>	418	<i>Ventriculi inflatio</i>	247
<i>σινοχος</i>	410	<i>Ventriculi imbecillitas</i>	223
<i>Synochos duplex eadem</i>		<i>Ventriculi inflammatio</i>	233
<i>σύκισμθ</i>	144	<i>Verruca</i>	477
		<i>Verrucarum euulsio</i>	478
T		<i>Vertigo</i>	65
<i>T Abes</i>	203	<i>Vesicæ quæ dicantur</i>	121
<i>ταπία</i>	279	<i>Vesicæ ulcera</i>	349
<i>ταυτομός</i>	267	<i>Vesica resoluta quomodo curāda</i>	93
		b 4	<i>Vesicæ</i>

INDEX.

Vesicæ inflammatio	343	Vomitùs immodicus	219
Vesicæ calculus	339	Voluulus	275
Veternus	74	Vrina quomodo proleſtāda	354
Vincula iniecta quid conſcrant		Vrinæ fluor	337
73. & 153		Vrinæ ſtillicidium	348
Vinum ὀλεγοφόρον	71	Vrinæ ſuppreſſio	353
Vinum diarijs ſimpliciter nomi-		Vteri exulceratio	387
natis conuenit	415	Vteri inſtitio	386
Vinum aruiſium	295	Vteri procidentia	370
Viperarum eſus	495	Vteri inflammatio	384
Viperarum præparatio eadem		Vteri peruerſiones	395
Viſus repentina obſcuritas quo		Vteri caliditas, frigiditas, humidi-	
paſto curanda	136	tas & ſiccitas quomodo cogno-	
Viri calida & frigida tempera-		ſcantur	393. & 394
tura unde noſcatur	391		
Vitiligo	479	Υ	
Vitiliginis due ſpecies eadem		Υ Δεφαυλν	361
Vlcera narium	150	Υ ὑπόπυον	117
Vngula	120	Υ ὑποπέρκη	314
Vnguis eadem		Υ ὑπόφρυμα	127
Vomitùs	217	Υ ὑόχυμα	130
		Υ ὑόχυσις	eadem

FINIS.

LEONHARTI

FVCHSII DE MEDEN.

dis singularum partium cor-
poris humani à summo
capite ad imos vs-
que pedes malis,

Liber pri-
mus.

De Alopecia & Ophiasis. Cap. I.



ΑΛΟΠΕΚΙΑ Græcis malum est Alopecia,
capitis, in quo areas deciduus capil-
lus efficit. Sic autem appellatam fe-
runt, quod hæc ipsa uulpibus crebro
accidat. Siquidem ἀλώπηξ Græcis
uulpem significat. Latini peculiari
destituta uoce cum Græcis Alope-

ciam nuncupant. Barbari autem, ut crebro alijs, immutatio-
ne unius literæ nomen deprauantes, Alopiciam appellant.
Οφίασις Græcorum medicis malū, existit quod capitis par- Ophiasis,
tem lesam serpentis instar, quæ ὄφις Græcis est, glabram
ostendit. Latini itidem ut Græci hoc malū Ophiasin uocant.
Arabicam uerò sectantes medicinam Barbari Tyriam: hæc Τυρία,
enim uoce illi omnes serpentes, potissimum uerò uiperas in- Causa,
telligunt. Vtrunq; passionis genus à uitiatis humoribus pro-
uenit. Quemadmodum enim plantæ nonnullæ humoris dese-
ctu inarescentes contabescunt: aliæ uerò alienis naturæ ipsa-
rum humoribus occursantes pereunt: sic etiam capillis acci-

dit. Vel enim ex defectu humiditatis, qua nutriuntur, uel ex eiusdem prauitate corrumpuntur. Porro quales hi sint uitiati humores, ex cutis capitis colore cognosces. Nonnullis enim mutata albidior apparet, nonnullis nigrior, aut pallidior. Candida cutis pituitam, atra melancholiam, pallida flauam significat bilem. Ad uitiosi denique humoris speciem certius dignoscendam, non leue adiumentum praecedens uictus ratio adferret: praesertim intelligenti, qui nam ciborum pituita, & qui nam atra flauaque bilis succum coaceruet. Porro cum malum ex uitiatis humoribus procreatum sit, necesse erit ut uniuersa uictus ratio sit ex ijs constituta, quae bonos succos gignunt: potissimum uero cibos & potus tales esse conuenit, qui optimum succum creare possunt. Quorum cognitio petenda ex libris Galeni. De alimen. facul. inscriptis, & libello de cibis boni & mali succi. In primis, quod ad curandi rationem attinet, totius corporis purgatio molienda, medicamento aut pituita ducente, aut flauam bilem, aut atram exhibito, coiectura redduntis humoris, ut paulo ante ostendimus, ex cutis colore facta. Si enim is cadidior, quam pro naturae habitu sit, pituita si humoris purgationem adhibebis: si pallidior, eiusmodi bilis purgationem, haud secus quam si nigrior conspicitur, quae nigram detrahent bilem, offeres. Pituitosos autem humores, praesertim e capite, hiera ex colocynthide purgare consuevit, quae describitur a Paulo Aegineta lib. 7. cap. 8. sub nomine Hierae Archigenis. Hiera quoque amara, quae a Galieno lib. 7. ther. meth. & lib. 11. De comp. med. secund. locos, cap. 1. describitur, mirificum confert: nigro scilicet interdum adiecto uetrario, ubi atra bilis humorem expurgare uolueris: interim scamonia, si flaua bilis purganda erit. Quinetiam ex aloë catapotia commodè sic affectos purgare solet. Habent uero, teste Alexan. Tralliano lib. 1. cap. 1. pulpae colocynthidos 3 aloës, scamoniae, singul.

32. suc

Catapotia
ex aloë.

§ 2. succi absinthij § 1. Conteruntur autē singillatim omnia,
 mixtaq; simul absinthij succo excipiuntur, et in catapotiare
 diguntur. Ex drachma uerò una cōficiuntur undecim catapo-
 tia, unaq; uice deuoratur. Vsus hodierno tēpore Hieræ picæ Hieræ pl-
 triplex est. Primū enim sub forma pulueris in uino, aut iure crævus tri-
 gallinaceo, aut alio cōuenienti liquore assumitur. Dandi mo-
 dus est drachma una. Secundo sub specie catapotiorū deuora-
 tur, id quod crebrò accidit. Tertio eclegmatis in modū forma-
 ta exhibetur. Hac forma passim in omnibus officinis prepa-
 rata habetur. Ceterum post totius corporis purgationē apo-
 phlegmatismis, quæ masticatoria hodie barbara uoce nomia-
 nantur, pituitā è capite per os ducere oportet. Cōficiuntur ex
 sinapi, hyssopo, staphide agria, pipere, origano, radice pyre-
 thri, carpesijs, et similibus. Valet autē hoc potissimū, quod Passilli mā-
 filis.
 habet: Piperis lōgi, nucis moschata, sing. 3 & Seminis staphia-
 dis agriæ, pyrethri, singul. 2. sinapi, origani, utriusq; 2. 1.
 Trita excipiuntur mastiche aut melle, aut cera, singanturq; pa-
 stilli forma lupinorū māfiles, quorū unus ad horæ ferè unius
 medietatē cōmanducetur. Possunt etiam prædicta, postquam
 trita sunt, in linteolum deligata cōmanducari, ut copiosè in li-
 bris nostris De comp. med. monstrauimus. His peractis, ad lo-
 calia uocata medicamēta ueniendum erit, quæ discutiendi atte-
 nuandiq; uires habeāt. Inter ea autē calidissimum est euphor-
 bium. Eo minus calidum thapsia, post hāc uerò sinapi et na-
 sturtium. His succedūt sulphur, nitrum, uterq; elleborus, eru-
 cæ semen, oleumq; laurinum. Quinetiam pix liquida, murii
 stercus, anserinus adeps, sed magis ursinus, amygdalæ ama-
 ræ totæ ustæ, herinacci terrestres cutis, et thus acerrimo a-
 ceto subactum, quemadmodum copiosè docet Galenus lib. 1.
 De comp. medicam. secundum locos, cap. 1. Ante tamen nunc
 commemoratorum medicamentorum usum capillos noua-
 cula

cula tollere oportet, ac deinde patientem cutem per linteolū neq; asperum, neq; molle nimis confricare, obseruareq; quā- tum ruboris huic ex eiusmodi frictione accedat. Si enim per modicā frictionē statim rubesciat, morbus sanatu facilis erit. Sin uix post longam atq; multam frictionem rubescat, diffi- cilem tum passionē, tum curationē ominaberis. Medicamēta uerò quæ capiti illinuntur, ad hūc qui sequitur modum cōpo-

Linimētū. Vnum quod accipit seminis eruce, nasturtij, nitri, sin- gul. 3 1. & thuris in aceto acri & ualido macerati 3 1. Sulphu- ris uiui 3 1. & adipis anserini, ursini, utriusq; 3 1. olei laurini 3

Unguentū. 3. Tritis & cōmixtis omnibus fac linimētum. Aliud paulò ua- lidius, quod habet euphorbij, thapsiæ, utriusque 3 1. ellebori utriusq; sing. 3 & seminis nasturtij, eruce, amygdalarū ama- rarū cum corticibus ustarū, sing. 3 1. sinapi 3 1. oleorū nar- dini, laurini, utriusq; 3 2. cere quod satis est fingatur unguen- tum, quo caput assiduē illinatur. Sunt autem hæc præsidia in

Quo in lo- calido aëre adhibenda, & maximē si fieri possit in loco inso-
co applica- lato aura carēte. Si uerò hyems fuerit, in hypocausto, aut bal-
da medica- neo medicamētis ijs uti satius est. Præ omnibus uerò cauē-
menta, dum, ne dum ualida medicamēta admouētur, cutis ultra quā cō- uenit concalescat: id quod tum ex colore ipsius, tum digi- torum tactu deprehēdes. Color namq; in ea rufus magis ap- parebit, digitorūq; ipsam cōtactu satis esse calidā cognosces.

Simplicia Horū itaq; animaduersionē habere oportet: periculum enim
& paratu iterum atq; iterum repetito eorundē usu, cutem exuri. Qua-
cilia medi- re ad molliora transeundum est. Inter simplicia & paratu
camenta, facilia medicamēta hæc potissimum alopecie cōferūt. Abro- tonum, cui acetum commixtum sit. Non leuis momenti auxi- lium adferunt sterces caprinæ, earundemq; ungulæ crema- tæ, si cum aceto illinantur. Quin & rosmarinum pluribus diebus, cum aceto maceratum, alopecie succurrit. Benefacit
etiam

etiam uerbenaca recta cum aceto trita & illita. Cortex deniq; raphani melle solutus, itemq; cortices ceparū una cum cepis tritis illiti profunt. Equinos dentes cremato, & ex aceto utitor. Marrubium uiride tritum, illine. Perdicio herba, quam parietariam uocāt, trita cum folijs assidue locum perfricato. Plura alia paratu facilia medicamenta, habet Galenus lib. i. De compo. med. secundum locos, cap. i.

De defluuio capillorum Cap. II.

Hoc malū raritatē cutis, inopiamq; substantiæ capillos *Causa*
generātis cōsequitur. Relaxatio enim seu raritas mea-
tuū cutis, causa est cur pili nō firmiter hæreāt. Humoris uerò
cuius beneficio pili oriūtur, inopia, pili primū extenuantur,
dein etiam excidūt. Notis nihil opus est ad mali cognitionē, *Signa*
quod primo statim obtutu ac cōspectu deprehēdatur. Curā *Curatio*
di ratio eorū qui sic afficiuntur, non eundē scopum cum alo-
pecia obtinet. In ea enim ut uitiosus humor consumatur, pri-
mariū scopum habemus: in defluuio uerò capillorum, ut
capitis habitum corroboremus, & boni succi allationē mo-
liamur, cutemq; ad densitatem & raritatem mediocrem re-
uocemus. Quapropter humectantibus medicamētis, aliquod
mediocriter adstringens miscere oportet, quale est ladanum,
quod utraque in se moderata obtinet, quæ huic symptomati
conueniunt, calorem uidelicet moderatum, & adstrictionem
ei respondētem. Quamobrem oleo mixtum, quo illini possit,
defluentium capillorum symptoma sistit. Verū cuius con-
stat, antequam medicamento utaris, capitis frictionem præ-
cedere oportere, & multitudinis pilorum resectionē. Si uerò
anni tempus permittit, etiam perfectam ablationem: sic enim
ob frictiones & illitus, robusta & calida cutis reddetur, &
moderatam densitatem, eam scilicet quæ secundum naturam
est,

est, acquireret. Ceterum consuevit hæc passio magna ex parte
 ijs antea qui egrotarunt, accidere: raro autē cura morbum:
 magisq; requirit uictus rationē, & reſectoriā, & salubrem.
 Multiq; citra medicamentū perfectē & celeriter sanati sunt.
 Cibis itaq; humectantibus boniq; succi ac coſtioni nihil ad-
 uersantibus ab omni ſalsugine & acrimonia alienis tum utē-
 dum erit. Porro medicamenta talia ſint, quæ cutem mediocri-
 ter denſent, ita tamen, ut ne ſimul eam refrigerēt: quippe ue-
 hementer adſtringētia, omnino etiā refrigerant, & affluxum
 nutrimentū repellūt, quo minus quā par eſt ſuppeditato, capil-
 li deſluunt. Huc itaq; medicamentorū ratio dirigenda, ut ſana-
 guinem qui affluit, non ſolum non prohibeant, ſed etiā pro-
 moueant: ſenſim autē & leuiter cutē contrahant, luxatūq;
 adanum. ac rereſectam cōstringant. Tale autē, ut diximus, ſua ptena-
 tura eſt ladanum, quod quia ceræ ſimilē conſiſtentiā obtinet,
 liquorem quendā deſiderat conuenientē & largum, ut capiti,
 illūmi poſſit. Præſtat autē huiusmodi liquorē ſimilē eſſe lada-
 no, hoc eſt, ex cōtrarijs facultatibus mixtum adſtrictoria ni-
 mirum, & contrahente. Eius generis eſt oleū lentifciniū, ſua-
 pte natura tale exiſtens, quale & ladanum. Nullum itaq; me-
 dicamentum, Galeno etiā teſte, in fluentibus capillis præſtan-
 tius eo, quod ex ladano & lentifcino mixtum eſt. Maſiſtū
 autē cuius eſſe arbitror, raſis craſſius eſſe medicamentū ad-
 mouendum, conſiſ autem liquidius. Nam quod comas nutrire
 non cōueniat, donec aliquis curetur, euidentis eſſe omnibus pu-
 to. Porro ſi magnū fuerit capillorum deſluuium, & magnam
 raritatē cutis capitis factam eſſe cōiicias, haud abſurdum fue-
 rit in præſentia myrtinum oleū in uicē lentifcini ladano mi-
 ſcere. Eſt autē dimidia ladani pars cum integra olei myrtini
 parte commiſcenda. Licebit etiam aliquando in ætate frigida,
 atq; ad eò temperamento capitis natura frigido, & hyberno
 tempo

tempore, calefactorie facultatis adhibere oleū, quale est nardinum. Ladanū uerò in duplici uase liquefacito, et ubi liquefeceris, cum nardino spicatum oleū admisceto. Atq; hæc quidem medicamēta unā cum refectoria et salubri uictus ratione abundē sufficere uidentur. Verū ne studiosi aliquid desiderare queant, aliqua iam dictis, eaq; paratu facilia, adijcimus. Verbenacā rectam uiuentē cū radicibus in omphacinū oleo coniicito, atq; ubi per plures dies insolaueris, oleum excolato, eoq; singulis diebus utere. Quod si uiuens defuerit, aridam unā cum radicibus cōtundito, et per angustissimum cribrum cōcernito, dein oleo cōmixto ut strigmēti crassitudinem accipiat, in uas æreum reponito, atq; ubi computruerit, pro oleo similiter utitor, nulli enim remedio cedit. Ladani et absinthij æquales partes, baccas iuniperi decē lintheolo illigato, et in oleo ad dies quinq; macerato, ex eoq; caput illimito, et neq; capilli defluent, neq; furfures habebunt. Ladani partes duas, adianti partem unam, uino et myrtino oleo excipe, et utere. Nigellam urito, aquaq; subactā illimito. Huius enim usus ad eliciendos pilos mirificē probatur, siue capiti, siue mento: in primis autem, si supercilijs adhibeas.

Paratu facilia medicamēta,

De porrigne. Cap. III.

Porrigo malū est quod Græci *τρυελαιον* uocāt. Qui *τρίψα* hodie factitant medicinā, furfures appellant. Fit, cum oīes, tenues ac furfuraceæ squamule ex capitis cute, nulla relictā exulceratione, decidunt. Prouenit hoc symptoma uitioso quopīā humore, salsæ pituita, aut bilioso et melācholico sanguine caput subeūte. Notæ ex ijs quæ iam diximus manifestæ. Vi-
Furfur. Causa.
 etus ratio talis sit, quæ crassos et uitiosos humores nō generet, nec flatus pcreet. Sint itaq; boni succi cibi, qbus uescūtur
Notæ. Curatio.
 egrotātes: coctionis autē probæ in primis cura habēda est.

Deamb

Deambulationes lenes plurimæ, manè & uesperī optime sunt. Vinum prodest album & tenue. Ira, indignatio, mora in sole, & uehemens refrigeratio uitanda, omnia item quæ caput replent. Si uniuersum corpus uitiat humores plenum fuerit, initio illi antequam localia adhibeantur, medicamentis pituitam maximè ducētibz uacuandi erunt. Deim prauos humores in capite malum hoc procreantes, medicamentis discutiendi & extergendi facultate præditis absumere oportet. Sunt tamen qui iam dictis medicamentis etiam adstringentia quædam, hoc quidem consilio ut per ea patiens particula corroboretur, ne facile in seipsam influentes serofos humores recipiat, sed resistat, eosq; repellat, admiscenda esse putent. Abstergent autem à capite porriginē, amygdale amaræ decorticatæ cum aqua aut aceto affricatæ, quumq; exaruerint capilli calida abluendi sunt. Maluam agrestam, quam alio nomine althæam uocant, in aqua marina donec decima pars relicta fuerit, coctā terito & affricato. Nitri spumam, & atramentum sutorium, calcantum Græci appellant, æquis partibus cum uino, ter aut quater in mense affricato. Hoc adeò efficax est, ut neq; in posterum porrigo regeneretur. Cimoliæ & sulphuris uiui æquas portiones contritas illine, tum lupinorū decocto lauato. Lithargyri, olei rutacei, aceti partes æquas inungito. Radicis cucumeris syluestris decocto utere. Scillam assato, & ubi flaccescere cœperit succum exprimito, & oleo commixtum illine, Syluestrem staphida oleo eliquatam illinito.

Porriginē
abstergen-
tia,

De phthiriasi. Cap. IIII.

φθειρία-
σις.
Pedicula-
tio.

Φθειρίασις pediculorū in capite accruatim generatio est. Latini pediculationē, & morbum pedicularem nuncupant. Accidit hoc malum ex multis calidis humoribus,

non

non tamen ad tantam caliditatem progressis, ad quātam per- ^{Causa.}
ueniunt acres & serosi humores. Vnde manifestū fit, in pro-
fundo cutis affectum pediculationis fieri, ubi etiam animalia
hæc gigni possunt: non in cutis superficie, in qua porriginē ^{Notæ.}
consistere diximus. Notis ad eius mali cognitionē nihil opus
est. Medicamēta malū hoc requirit desiccatoria, & quæ ex ^{Curatio.}
alto trahere & euacuare possunt, magis utiq; quā ea quæ
porrigini conueniunt. qualia sunt, quæ sequuntur. Staphidi
sylvestris partes duas, sandarachæ, hoc est, ut hodie uocant, <sup>Sādara-
cha</sup>
arsenici rubei, nitri utriusq; partem unā, cum aceto & oleo
ueteri capiti illine. Rhoēn obsoniorum similiter cum oleo
illinito. Oxylapati radicem cum oleo, eodem modo. Elleborū
albū, staphida sylvestrem, & nitrum pari pondere cum oleo
in balneo utitor. Aut cum aqua marina, aut meraca muria
persundito. Quod si nuditas pilorū adsit, sylvestrē staphida
cum oleo & aceto illinito, aut alumen tritū cum oleo. Con-
fer etiā caput lauare lupinorum, aut tamaricis decocto, aut
aqua tepida cū aceto. Hederæ succū cum melle mixtum, uel
helxinem, quam parietariam nominant, dormituri illinire
prodest. Oleum quoque laurinum, aut raphaninū inunctum
auxiliatur. Lupinorū insuper & baccharū lauri decoctum
pediculationi medetur, si ijs caput detergatur. Paulus mirifi-
cè probat staphida sylvestrem, ex aceto & oleo tritā inun-
ctam. hæc quæ se quod uoluit semper affecutum esse tradit.

De achoribus. Cap. V.

Aχρόρ Græcis ulcuscula cutis capitis sunt, tenuissimis ^{ἀχρόρ}
cutē foraminibus perforantia, per quæ glutinosa ser- ^{Manantia}
tur sanies. Plinius ulcera capitis manantia dixit. Nostra ætas ^{capitis vl-}
à timearum in uestibus similitudine, capitis timeas appellat. ^{cera.}
Vt enim hæ multo eoq; tenui morfu & erosione uestes per- ^{Tineæ ca-}
forant ^{pit.}

- Causa.** forant, sic capitis cutē achores. Generatio huius mali ex humore mixto est, qui partim tenuem serosumq; ac mordacem, partim uerò crassum succū in se habet. Tenuis itaq; humor, utpote mordax, primum quidem ad scalpendum ipsos cogit, progressū uerò temporis ad pruritum tum tumor augetur, tum foramina circa ipsum erumpunt. Paulus pathos hoc ex nitrosa salsaq; pituita creari tradit. Si humores qui excernuntur tenues admodum cōsistentia fuerint, biliosas; sin à tenuitate absint, & crassi ac glutinosi fuerint, pituitosas potius superare sanies portendent. Victus ratio in hoc malo ex cibis boni succi cōstare debet. Omnia deniq; acria & salsa uitanda,
- Victus.**
- Curatio.** perinde atq; crassa & glutinosa. Curandi ratio à uacuatione humorum qui malū hoc generant, auspicanda. Si itaq; adhuc influxerint humores totius corporis prēmittenda purgatio erit haud secus quā in alopecia. Deim caput per os & nares purgandum sic enim influxus humorū prohibebitur. Ceterū si malum exiguum fuerit, sola localia uocata remedia, citra totius corporis euacuationē suffecerint. Conueniunt autē ipsis, propter crassitiē & lentorē humoris eos generantis, medicamēta quæ hunc incidunt, quæq; facultatē discutiendi & reprimendi necessariò obtinēt. Incipientes tamen achores, ubi corpus uniuersum excrementis caruerit, cū adstringentibus reprimentibusq; tantum curare licebit, ut sunt myrti bacca, rubi folia illita, plantago, salicis folia, polygonum, & similia. His igitur quæ mixtas facultates habet, atq; adeò affluentes humores reprimūt, eos uerò qui in parte patiente cōtinētur cōcoquunt ac discutiunt, in morbi augmento potissimū utēdū erit. Acetū itaq; ex incidētū ordine existens, ultra hoc quòd discutit, præcipuū quiddā in se habet, quo reprimat, ac quod influit depellit, utpote quòd substantia sua modicè calidū est, plurimū uerò frigidū, & par-
- tium

tium tenuiū. Hoc ipso sanè medicamēta metālica nominata, aliās aliud imbues atq; dilues, moderata quidē in quibus incipit et adhuc exigui est malū, fortia uerò in maioribus et diuturnioribus, fortiora autē in inueteratis iā et ægerriimè curabilibus, achoresq; sanabis. Tollēdi uerò prius capilli sunt, antequā medicamēta admoucātur, à leuioribusq; semper imchoandum, præsertim si dolor simul cum ipsis adsit. Decasis igitur capillis, caput bis ter ue, aut etiā sæpius die fouendum aqua calida, in qua myrti bacce sint decoctæ, uel rubus, uel bryonia, uel lenticula, uel amari lupini, uel asparagi radix. Quū uerò plus sanici emanat, rectè illinuntur salicis folia cū aqua, uel lenticula cum melle. Vnguenta uerò parabis è lēnia terra, spodio, pōpholyge, spuma argenti, cadmia, adianto et rosaceo. Prodest etiā sarnogræci decoctum, affricum, malua cum uino et farina hordeacea subacta. Item melilotū cū farina sarnogræci et uino impositū. Quòd si ex ijs malū non quiescat, medicamētū ex charta siccū, aceto dilutū, illinendū Galenus enim sola charta exusta et aceto diluta locū patientem illinens, atq; uno et item altero die usus, nonnullos perfectè sanitati restituit. Cōuenit autē hoc medicamētū ijs maxime, qui duræ sunt carnis. Præterea sunt medicamenta uiribus omnino robustissima, adeò ut etiā achoras ex crasis et lētis humoribus obortos, cōtumaciterq; cuti infarctos euacuare queāt, atq; id adeò ualidè, ut etiā si scirrhosum quid habeant, id ipsum uacuare ualeāt: licet ipsum cutis habitū in eiusmodi prauitate ducant, ut id quod influit corrumpāt, etsi benignū fuerit. Talia sunt sal, uini sarn uista, sandaracha, quā uulgo arsenicum rubeum nominant, calx uiua, fel calidorum et siccorum animantium, et id genus alia. Ceterum quæ optime discutunt, sunt lilij radix affricta, rosmarinum cum uino et aqua, et lupinorum amarorum, aut syluestris cucumeris rā-

Discutientia,

dicis decoctum affricatum, ruta folia, farina fœnogræci cum nitro, thus ex aceto illitum, malicoriū cum oleo laurino illitum. Reliqua ex lib. primo Galeni De comp. med. secundū locos petenda erunt.

De dolore capitis. Cap. VI.

Dolorem capitis eū, qui non est inueteratus, non curādo an p se accidat, aut alterius affectus symptoma & comes sit, Græcorū medici κεφαλαλγία, barbarā uero se stantes medicinā, Sodā nomināt. Huius quidē cōplures sunt causæ. Nunc enim ex sola simplici intēperie citra humores accidit, nūc uerò ex horū qualitate oritur. Interdum etiā ob plenitudinē humorū, quā πλὺν Græci uocāt, generatur. Interim quoque ex stomachi uitio capitis dolor excitatur. Quādoq; etiam à causa externa, προκαρακκησ Græci appellant, utpote ardore solis, frigore, ebrietate, & ictu. Vex hementissimi aut capitis dolores ex caliditate & frigiditate nascūtur, præsertim quī inæquales extiterint: moderati, qui ex siccitate proueniunt. Humiditatē uerò per se nullus cōsequitur dolor, nisi calori, aut frigori, aut humorum plenitudini, aut acrimoniæ cōiuncta fuerit. Pari modo si ob redundantes, uel in omnibus capitis partibus, uel una quacūq; tandem, uel duabus, humores capitis dolor contingit, uehementior quidē è calidis & frigidis, moderatior uerò à siccātibus citra cōspiciuā caliditatē & frigiditatē oboritur. Humectantes, quantū ad qualitātē ipsorum attinet, nullū penitus dolorem inuehunt: etenim propter plenitudinem instrumentaliū partiū morbos procreant: nullū autē similariū, in quibus solis affectus ex intemperie simplici gignuntur. Qui uerò ex plenitudine nascūtur affectus, citra quidē obstructionem, caput grauāt: cum obstructione autem, siquidē ea moderata fuerit,

κεφαλαλγία.
Causæ.

Notæ.

Humiditas
per se nullum
efficit
dolorem.

fuerit, moderate dolorifici: fin uehemēs, ualide dolorosi sunt. Quod si etiam mordacem qualitātē humorū plenitudo habuerit, secundum hanc quoq; dolorē augebit. Alias notae, quibus causae capitis dolorē cōciliantesprehenduntur, ex sequentibus petent studiosi. Nos enim ut omnia dilucide tractentur, ordine singulos affectus capitis dolores excitantes prosequemur, initio à calida intemperie sumpto.

De dolore capitis ex calore nato.

Cap. VII.

PER calorē hoc in loco intēperiē calidā nudae qualitatis ^{Calore,} citra humorē intelligimus. Generatur magna ex parte à solis ardore: omnes enim homines soli aestiuo diutius immo ^{Causa,} rati, capite incalescūt. Ex motu itē immodico, balneis, flammæ uicinitate, ira, furore, calidis affectib. & odoramētis. Qui ex ardore solis, quē Græci ^{Signa,} *ἔγχευσις* uocant, caput dolent, eorū ^{ἔγχευσις} cutis tactu calida est, & primo statim iniectu manus aridior apparet, oculiq; rubent. Frigidis tum perfusionibus, tum inunctionibus gaudēt & iuuantur. Reliquae causae è sermonibus agrotātis cognosci possunt. Euitādus in hoc genere do- ^{Vitius 12o} loris capitis aer calidus, qui nullū perflatū recipit, calidisq; ^{rio.} uaporibus refertus est. Deligēdus cōtrā qui natura frigidus ^{Aer,} est, aut qui nostra industria sic preparatus sit è floribus ac germimibus frigida facultate præditis p̄ areā sparsis, & humi fusis ac proiectis, rosis scilicet, uiolis, nymphae floribus, uitiū capreolis, ruborū ramis, et id genus alijs. Præterea aë- ^{Cibus,} rē, aqua frigida de uasis in uasa trās fusa, refrigerare expedit. Cibus sit exiguus, & natura frigidus, qualis est lactuca, por-
tulaca, ptisana hordei, aut eiusdē alicuius, oia sorbilia, panis ex aqua, pulli colūbarū cū omphacio, agrestā hodie facitantes
medicinā nomināt, cocti. Pisces itē petrosi, & lac amygdal-

Potus. Larum cū furfuribus decoctū. Pro potu aqua utendū est, nisi sint quibus uētricus propter aqua potū subuertatur: tum enim præstat uti uino aquoso, & bene diluto, aut aqua in qua parū cinnamomi decoctū sit: cui si lubet serapiū intybi satiui latioris, endiuia appellāt, & acidū simplex nominatū, aut oxosaccharū admiscebis. Cæterū somni & quietis cura in primis habēda est ægrotāti. Coitū euitet, aluiq; excremēta, ac lotiū minimè retineat: sed ab ijs sese statim à somno, si fieri potest, exoneret. Exercitationes, frictiones, solem balneaq; fugiat. Irā, furorē, aliasq; animi pturbationes corpus calefaciētes, pr̄sus nō admittat. Proinde uitari debet clamor, cōtentio, omnisq; mētis perculsio, & in bona animi firmitate degendū. Porro dolorē capitis à calore ortū curant quæcūq; cura manifestā adstrictionē refrigerādi facultatē obtinēt. Inter ea autē optima censenda, quæ tenuiū partiū substantia prædita sunt. Initio itaq; nihil præstātius, quàm oleo rosaceo probè apparato caput pfundere. Quod si illi parū aceti adiectū fuerit, lōgē maiore, et penitius penetrādi uim induet medicamentū. Proximū à rosaceo chamæmelinū locū habet, in ijs maximè corporibus, qui uehementi refrigeratione non indigēt: ut sunt corpora muliebria, eunuchorū, puerorū, & eorū qui molli carne præditi sunt, albumq; colorē habent. Si uerò uehementiori refrigeratione opus erit, semperuiui, aut lactuca, aut portulacæ, aut polygoni, aut uuæ acerbæ & immatura, aut solani, aut seridis, aut psyllij succū, aut id genus aliū refrigerādi facultatē obtinentē adijcere conuenit. Parabuntur itaq; medicamenta, quæ capiti adhibētur, in hūc modū: Olei rosacei ℥ 2. liquoris stillaticij rosarū ℥ 1. & aceti optimi ℥ 6. misce. Aliud, quod recipit liquoris stillaticij semperuiui lactuca, solani, singulorū ℥ 2. liquoris stillaticij chamæmeli ℥ 1. & aceti ℥ 1. Commisceantur singula, & in ijs fascia

Somnus.
Excremen-
torum ex-
purgatio.
Exercitiū.
Animi per-
turbatio-
nes.
Curatio.

Admotio
medicamē-
torum qua-
lis esse de-
beat.

made

malesiat, quæ iuxta frontē ubi pilosa eius par desinit, atq; tē
 pora ipsa, capiti imponatur. Porro medicamentū hoc occi-
 put haud tāgat: neq; enim citra molestiā refrigerantia susti-
 net, ppter ea quod isthic medullæ spinalis initium existat. Per
 sincipitis autē regionē ob laxitatē coarticulationis iuxta co-
 ronālē suturā, & ob osiū tenuitatē & raritatem, facillē tum
 caliditas, tū frigiditas omniū quæ sibi adhibētur medicamen-
 torū intro distribuitur. Quare siue refrigerare aliquādo ca-
 liditatē ex aestu solis, alijsq; ex causis contractā, siue caleface-
 re frigiditatē oporteat, idonea est capitis iuxta sinciput re-
 gio. Caterū refrigerabis, æstiuo potissimū tēpore, quæcūq;
 adhibere uoles, aquæ admodū frigide imponens: aut si huius
 copia nō detur, niuē aut glaciem uasculo circūponens. Hoc
 præsidium, etiā si humorū aut uaporū copia ad caput impetū
 fecerit, præclarē auxiliatur. Eadē quidem ratione alijs oleis
 refrigerandi ui præditis uti licebit, ut est cotoneorum, uiola-
 ceū, nymphææ, quod nenupharinū hodie uocāt. Neq; alienum
 ab instituto nostro erit linimentum, quod in hunc cōficitur Linimen-
tum.
 modū: Lenti cremoris, mucilaginé barbari nomināt, seminis
 cotoneorum & seminis psyllij, utriusq; 3 3. succi portulacæ
 3 1. f. succi solani 3. f. olei rosacei 3 1. Misceatur, & in forme-
 tur linimētū. Poteris etiā adiectā cera aut accessione aliorū
 medicamentorū fingere unguentum ad eum modū. Vnguenti Vnguentū.
 populeon 3 1. oleorū uiolacei, rosacei, singulorū 3 3. florum
 nymphææ aridorū, rosarū rubearum, singul. 3 1. ceræ quod
 satis est, fiat unguentum, quod fronti & tēporibus illinatur.
 Neq; temere etiā quispiam embrochis ē rosis, uiolis, floribus Embroche
 nymphææ, folijs salicis, uitis, portulacæ, hordeoq; cōpositis
 utetur. A stupefacientibus tamē, utpote quæ nō citra offen- Stupefaciē-
tia.
 sam refrigerent, & ab ijs quæ cū eo quod refrigerant mania-
 feste adstringūt abstinentum, nisi id ipsum necessitas exigat.

Quare si quando necessitas postulet, parum quiddam ex eis refrigerantibus miscendum est. Huius gratia mādragora & papaueris succi caueri debent. Solani etiam succum, aut nequitia miscemus, aut prorsum exiguum, quod nos in linimento superiori fecimus. Ita & mali granati, & mali cotonei, & mespili succi eo quod adstringāt fugiendi. Ad hanc tamē rem malorum granatorum acidorum succus præstantior est, ut qui magis refrigeret. Hactenus quidē medicamēta quæ inter initia mali cōueniūt, cōmemorauimus. Mox deinde mitigātia cōcoquentiaq; medicamenta reprimētib; admiscere oportet.

Embrocha tet. Fingatur itaq; embrocha cum in modum. Florum rosarum, uiolarum, utrorunq; m. f. foliorum salicis, chamæmeli, meliloti, singulorum m. i. seminis malæ 3 i. hordei decorticati 3 i. Coquantur singula in aquæ lib. 2. donec tertia pars absumatur, & fiat embrocha. Tandē ex discussorijs medicamentis aliquod adiiciendum, quorum catalogum habes in libro nostro primo De compositione medicamētorum, paulatim detractis ijs quæ repellunt. Porro intra corpus, si dolor capitis ab exercitijs, ira, & huiusmodi est ortus, assumi debent medicamēta, xulapium uiolaceum, rosaceum, condita eorundem, antidotus quæ manus Christi uocatur, & alia eiusmodi hodie usitata, quibus refrigerandi facultas inest.

De dolore capitis ex frigore contracto.

Caput VIII.

Causæ.

PER frigus accipe intemperie frigidam nude qualitatis, citra alicuius frigidi humoris affluxum. Hæc autē contrahitur ab ambiente nos aëre frigido, potissimum ubi quis aperto capite in eo diutius uersetur, & ab improvida frigidorum omnium admotione. Signa eorum qui caput ob frigiditatem dolēt, contraria planè sunt ijs, quæ ex calore oriuntur.

Notæ.

In capite enim tum nullus sentitur calor: facies etiā ipsorum incōtracta, & minimè arida, decolor tamē existit. Oculi deniq; non rubēt, sed contrā sub tumido pallore deformantur. Frigidis nec gaudent, nec iuuantur. Qui sic dolent, aërem caueant frigidum, & morentur in calido. Lactis præterea in cibo usum, piscium, & aliorum omnium quæ possunt refrigerare, deuient. Ouis sorbilibus carnibus auicularū, & ijs similibus uestantur. Dandū ijs uinum tenuium partium, quod tantum abest ut noceat, ut etiā plurimum conducat, eò quòd calefaciendi extenuandiq; facultate præditum sit. Motu corporis utatur, gestationeq; in equo, quod utraq; calorē exci-
tent. Balnea quoq; illis calida prosunt. Somnus quidē ijs cōfert mediocris, ideoq; plus eis uigilandū erit, quā dormiendū. Tristitiā graues cogitationes aliasq; eius generis animi perturbationes fugiant. Cæterum in admouēdis capiti remedijs, Curatio.
cerebri natiuum temperamentū unice considerandū erit: hoc enim tale existit, ut neq; uehementē calida, neq; etiā admodum frigida ferat medicamenta. Galeno autē autore, rutaceū oleum calidum sincipiti superfusum, perfectē hominē liberare potest. Quòd si uerò uehementiore sit opus calefactione, piper aut euphorbium oleo iniiciatur, aut aliquid olei de piperibus uel oleum de euphorbio rutaceo commiscendum. Instar rutacei, laurinum & irinum olea prosunt. Prædictis omnibus aliis quædam calida medicamenta adiungere licebit, ac unguentum in eum parare modum. Oleorum irini & rutacei, utrorunq; ꝑ. f. maioranæ, betonica, piperis singu. ꝑ. i. euphorbij grana s. cera quod satis est, singatur unguentum. Eo & similibus non solum frontē, uerumetiam narium meatus inungere oportet. Haud inutiliter adhibebuntur etiā embrochæ floribus meliloti & chamæmeli, maiorana, origano, betonica, sampsucho, salvia, laurinis folijs, stichadæ, & simi-

Vi-
tus ra-
tio.

Curatio.

Vnguētū.

Sacculi. libus in aqua decoctis parata. In quē usum sacculi quoq; applicari capiti possunt, qui accipiunt: Foliorum lauri, serpilli, maioranæ, singul. m̄. f. florū rosmarini m̄. i. rutæ m̄. f. garyophyllorū, stichadis, singu. 3 i. pulegi, calaminthæ, sing. 3 i. f. Trita demittatur in sericū, aut linteolū purissimū ac tenuissimum, formeturq; sacculus, qui calefactus, acetōq; prius irrigatus capiti admoueatur. Neq; temere etiam quis orbiculo odorifero (pomum hodie uocant) in hunc modum compositū utetur. Styracis calamitis 3 2. garyophyllorum, maceris, ligni aloës, singul. 3 f. lauandulæ 3 2. galliæ moschatae 3 1. f. moschi, ambar, utriusq; grana 3. Tritis & cribratis omnibus cum stillatio maioranæ liquore, & statæ, quam storacem liquidam Arabes & horum sectatores barbari medici appellant, quod satis est: singantur orbiculi odorati.

Orbiculus
odoriferus,

De dolore capitis & siccitate aut humiditate orto. Cap. IX.

Siccitas & humiditas, se folis dolorē nō inferunt.
PER siccitatem hoc in loco intemperies sicca nuda qualitatē accipienda uenit, perinde atq; humiditatem intemperiem humidam ex nuda qualitate procreatam. Harum autē neutra se sola, nisi accedat, uel caliditas, uel frigiditas, dolorē capitis excitare potest. Quod grauissimus autor Galenus cap. 5. lib. 1. De symptomatum causis, in eum scribēs modum confirmat: Porro, inquit, uehementes conueniunt in tactu à naturali habitu transmutationes, ob uiolentum calidi frigidiq; occursum, atq; ob eas res, quæ cōtundere, secare, extendere, aut erodere possunt. Nam siccitas, humiditasq; nisi calori frigori ue cōiungantur, occursum suo uim inferre nō cōsueuerunt. Hæc ille. Rationem eius, quod diximus, præptē ex ijs quæ ibidem idem Galenus scribit, quiuis colligere poterit. Nam cum nulla res, nisi eius occursum sit uehemens ac repentinus, dolo

dolorem excitare queat, humiditas autem & siccitas nullam violentam aut moleſtam ſenſionem in corporibus ſenſu prædiſ efficere poſſint: imbecillior enim earundē eſt alteratio, atq; adeo ſenſim irrepēs, quod magis ſint paſſiue quā actiue: ideoq; dolorē nullum inferre capiti poſſunt. Atq; hinc eſt quod Galenus ac alij ueteres Græci medici in ſuis libris nullā doloris ē ſiccitate & humiditate orti, mentionē faciant. Nos tamen hic earundē intempericrum meminimus, non quod ſolus excitare poſſe dolorē capitis putemus, ſed ut haberēt etiā ſtudioſi medicamentorum copiam, ubi ē calore & ſiccitate, humiditate uē, aut ē frigore & ſiccitate humiditate uē coniuñctis dolorem capitis excitari contingeret. Porro dolor à Cauſa ſiccitate fit ab aëre ambiēte ſicco, medicamētis ſiccātibus fame, exercitijs, coītu, & animi perturbationibus. Ab humiditate itidē, à medicamentis humectantibus aëre ambiēte humido, balneis, aquæ calidæ, & alijs quæ ſuprà modū humectāt. Deprehenditur ſiccitas, ſi pauca, aut nulla penitus ē naribus excremēta, aut humida profluxerint, ſi oculi cōcaui fuerint, Signa multæq; præceſſerint uigiliæ. Cōtrā humiditas, ubi multus ex naribus mucus pmanarit, ſi oculi tumidi fuerint, & laborātes multū dormiant. Qui ob ſiccitatē dolent, ij in aëre uerſentur humido, ueſcanturq; cibis humectantibus, & boni ſucci, uitellis ouorum, teſtibus gallorum, ac eorundem iuſculis, phaſianis, pdicibus & alijs quæ plurimum nutrire & humectare poſſunt. Vinum bibant tenue, aquoſum tamen. Somno utantur quoad fieri poteſt largiore. Fugiant motum corporis, ac quiete potius, otioq; utantur egri. Coītus, fames, ſitis, & omnia quæ exiccare nata ſunt, euitanda. Lauacra quæ humectare poſſunt, ut ſunt Galeno libro 3. De tuend. uale. teſte, dulcium calefactarum aquarum, ſi tepidiores fuerint, non parum commoditatis egrotanti aſſerent. Lætur deniq;

niq; & omnes alias animi perturbationes uitet. Si propter humiditatē dolor accidat, cōtrariā uictus rationem adhibere expedit, nimirum exiccantē, quā quisq; ex ijs quæ nunc diximus, & subinde in alijs locis cōmemorabimus, faciliē cognoscet. In dolore capitis à siccitate nato, adhibendum oleū uiolaceum, amygdalinum, quod scilicet è dulcibus est confectum amygdalis. Inungendū uerò his nō solū synciput, imò naribus etiā hæc ipsa instillāda. Prædictis oleis rectissimè cōmiscen-
 Curatio. tur pinguedines ad hunc uel similē modum. Oleorū uiolacci & nymphae, utriusq; 3 3. pinguedinis uitulinae, gallinae, bu-
 Linimētū. tyri recentis salis expertis, sing. 3 2. Misceātur singula, fiatq; linimentum. Proderit nō parum embrochas è uiolis, maluis, alijsq; herbis humectandi facultate præditis cōfecisse. In capitis dolore ab humiditate excitato, contraria planè curandi ratio adhibenda erit. Quæ etiā uariabitur, prout uel calor, aut frigus humiditati coniungetur. Remediorum uerò copiam ex ijs quæ deinceps dicemus, studiosi petent.

De dolore capitis ex plenitudine.

Caput X.

Plenitudo. Hactenus de curādis doloribus capitis qui ex nuda qua-
 litatum alteratione proueniunt, egimus nunc de eo qui
 plenitudine, è plenitudine oritur differemus. Plenitudinē autē uocamus in
 plenitudine, id quod Græcis πλεῖστος καὶ πλεονάζουσα nomina-
 tur: quæ sit, Gal. lib. 1. De comp. medi. secundum locos, cap. 1.
 teste, quatuor humoribus proportionē adauctis, aut solo san-
 guine: idem enim est, quum syncerus sanguis in uenis nūquā
 reperiatur, quin semper aliquid bilis, uel pituitæ, aut serosi
 humoris illi cōmixtū sit. Hoc itaque aucto, reliquos quoque
 omnes humores increfcere, pro sua quēq; portione necesse
 est. Proinde nihil prohibet dolorē hunc capitis de quo nobis
 sermo

sermo est, uocare ex sanguine dolorem. Proportione itaq;
 quod Galenus hic ἀνάλογον, & alibi ὁμοζήτως uocat, hu- ἀνάλο-
 mores quatuor in plethora seu plenitudine augentur, adeo γορ ὁμο-
 ut sanguis, qui copia sua reliquos nunquā nō uincit, semper τιμως.
 in ea præcellat, dein pituita, tertio flaua bilis, & postremū
 atra proportionē illi respondeat. Dolor is capitis ab omni- Cause
 bus quæ plenitudinē in corpore procreare possunt, ut sunt
 cibi et potus boni succi copiosè assumpti: exercitiorū, balnei,
 sudoris, & aliarum uacuationū naturalium & artificialium ne-
 glectus. Facies & oculi rubent, uenæ tenduntur, adeo ut non Notæ.
 solū maiores, uerumetiā minores, & quæ prius sensum effu-
 giebāt, nūc uisu cōprehendātur. Pulsus magnus & uehemēs.
 Urina subrufa & crassa. Venæ tēporū pulsant. Dolor sub-
 sequitur capitis grauius. Versetur in aëre frigido & sicco.
 Vitet carnes, oua sordida, & eiusmodi quæ copiosè nutriūt. Victus ra-
 tio.
 Utatur ptisana hordeacea, aut hordei alica. Oleribus frigi-
 dis, intybo satiuo utroq; endiuia & scariolā hodie appellant,
 portulaca, lactuca, & similibus uestatur æger. Fugiat uinum,
 bibat decoctum cinamomi, aut hordei. Exercitetur mediocri-
 ter, fricetur, frequēti utatur balneo, ita tamē, ut corpus prius
 uacuetur, ægerq; minime febricitet. Somnus sit mediocris.
 Gaudeat & letetur, omnisq; reliqua animi perturbatio ab-
 sit. Curādi ratio statim à sanguinis missione aspicietur. Inci-
 denda autē erit uena in cubito exterior, quam humeralē alio
 nomine, & hodie cephalicā uocāt, eius scilicet partis, in qua
 dolor potissimum uiget. Siquidem hæc uena capiti cōtinuata
 est, & non solum per eam à patiente particula in contrariū
 auellere, uerumetiā uacuare licet. Id quod non solum Hip-
 pocrates, & post hunc Galenus, uerumetiā Rhazes, non
 contemnendæ autoritatis inter Arabes scriptor, libro suo
 nono, quem Almanfori inscripsit, capite 1. docet. Et nos in
 libro

Rhazes, libro tertio Difficiliū quæstionū, hoc ipsum manifestissimis argumentis demonstrauimus. Quod si uerò ætas, aut uirtus imbecilla uenæ secāde consiliū interturbat, cucurbitæ affigendæ erunt: nō quidē capiti, sed partibus illi continuatis, & cōiunctis. Id quod Galenus lib. 13. Thæ. meth. cap. 13. confir-

» mat, ubi sic scriptū reliquit: Dū adhuc generātur passiōes,
 » minimē ijs partibus quæ laborare incipiunt, sed quæ illis
 » sunt cōtinuatæ, cucurbita imponi debet, auellendi in cōtra
 » riū causa. His iam peractis, refrigerantia & adstringentia

Localia
cōprimen-
tia,

Decoctum
purgans,

medicamēta capiti adhibebūtur, de quibus abūde supra, capi-
 te nimirū 7. dictū est, ut nunc ea repetere nihil attineat. Cæ-
 terū alius quoq; ut in hoc malo aperta sit in primis, medi-
 cus curabit: quapropter si sua sponte excrementa corporis
 nō deiecerit, hoc uel simili decocto subducatur, quod accipit:
 Flōrū buglosi, cirsiij (borrachinē nomināt) rosarū, uiolearū,
 singulorū ī ʒ. Seminum quatuor cōmuniū frigidorū maio-
 rum excorticatorū, singul. 3 2. myxorū, sebesten appellant:
 prunorum damascenorū, singul. numero 12. uuarū passerū,
 oxyphœnicōn (tamarindos uocant) utriusq; ʒ 1. corticū my-
 robalanorū flauorum, citrinos hodie nomināt: cerulcorum,
 indos appellant: cepulorū, chebulos uocāt: empeliticorum,
 emblicos nuncupant: belexicorū, belliricos, appellāt: singulo-
 rum 3 1. glycirrhizæ rasæ ʒ 1. fumariz, adianti (capillū Vene-
 ris nominant) utriusq; ī 1. tamaricis, hemionitidis (scolopē-
 drium officinæ uocant) utriusq; 3 1. foliorū senæ, polypodij,
 utriusq; ʒ ʒ. agarici optimi 3 2. ʒ. zingiberis 3 ʒ. Coquantur
 omnia in aqua fontana sufficienti, donec dimidium absuma-
 tur: dein colentur, & manibus exprimantur. Ius subinde de-
 cocti saccharo quod satis est dulce reddatur, cumq; albumini-
 bus ouorum spurcicia omnis euerratur, fiatq; potio depura-
 ta, de qua æger appetēte diluculo ʒ 4. bibat. Quod si res ipsa
 ualidius

ualidius exigat medicamentum, tum præstiterit 3. iuri no-
 minati iam decocti addere, rhabarbari scenitici seu meridio-
 nalis redacti in puluerem 3. f. spice 3 f. Aut in iisdem dis-
 soluere Casie fistularis 3. f. aut mellis aërij, quod alio no-
 mine Mannam appellat 3. f. Aut antidoti diaphœnicœ 3. f.
 In eundem usum conducit exhibere serapium uiolaceum, &
 oxysaccharum. Posthæc capiti adhibenda sunt remedia, Discutien-
tia.
 quæ morbi reliquis discutere ualent: ut est altheæ semen,
 fœnumgræcū, chamæmeli & meliloti flores. Olea præterea
 chamæmelinum, anethinum, & ijs similia. Ex quibus dem-
 ceptus medicus pro arbitrio suo & ægroti linimenta, unguen-
 ta, emplastraq; componet, ad eum modum qui in superiori-
 bus capitibus expositus est.

De dolore capitis è biliosis humo-
 ribus. Cap. XI.

HOc genus doloris capitis fit ab omnibus, quæ corpus Causa.
 uniuersum, atq; adeo caput, præter naturā calefaciunt
 & exiccāt, adeoq; bilem flauam procreant: qualia sunt Gale-
 no lib. 2. De tempe. cap. 8. teste, sollicitudo, ira, dolor, labor,
 exercitatio, uigiliæ, abstinentia, & inedia. His accedit uictus
 ratio ex biliosis cibis, allio nimirum, porris, ac similibus con-
 stans. Notæ eorū qui sic dolent similes ijs, quos ob calorem, Signa.
 solis potissimum æstus, dolor affligit: sed maior ipsis mor-
 sus accedit, & faciei pallor. Interim etiam oris amaritudo,
 siccitas oculorum, linguae & narium adest. Præterea malum
 hoc ætati uigenti, & temperaturis calidioribus, uitæq; so-
 licite, & ijs, quæadmodū paulò antè cōmemorauimus, qui
 flauā bilē coaceruant, accidere solet. Aeger moretur in aëre Victus ra-
tio.
 frigido, & humido, qui arte etiam, ut supra cap. 7. osten-
 sum est, parari potest, si ædium pauimentum assidue humore
 irroretur:

irroretur : aut flores ac germina, quæ frigida humideq; facultatis sunt, per aream spargantur. Vniuersa quidem uictus ratio humidior sit. Cibis itaq; uescatur humidis & boni succi, lactuca, portulaca, piscibus exiguis ac saxatilibus. Potus sit aqua, aut cinnamomi decoctum. Vino autem in totum ab-
 Curatio. Bilis quidē interdū ut vacuet, cō-
 modē co-
 ctionē exi-
 git, nunquā aut ut cras-
 sitiem adi-
 piscatur. *stineat. Quiete utatur, & somno largiore. Balneū quoq; huic temperatum, unctiōesq; cōferunt. Latetur, & omnes animi perturbationes declinet. Porro curandi ratio statim à bilio- si humoris uacuatione auspicanda, quod scilicet is ipse tenuis & mobilis sit, atq; adeo euacuationi perinde atq; pituita pro- pter suam crassitiem minimè reluctetur. Quod si uerò bilio- sus humor aliquā corporis partē quietus obsederit, atq; adeo incandescat, eamq; partē exurat, & calefacientia medica- menta (qualia sunt omnia ea quæ purgant) respuat, ante bilis purgationē exhibēda erunt, quæ eius calorem ac feruorem restin- guant atq; cōcoquāt, hoc est alterēt. Neq; enim cōcoctio, de qua nūc nobis sermo, aliud est, quā humoris morbum efficiētis à natura alteratio. Talia itaq; medicamenta ante purgationē eousq; diluculo ieiunis præbenda, donec in urinis decens ap- paruerit concoctio. Nam hac ratione bilis cocta, & ueluti subacta, ac edomita, naturæq; obsequens reddita, absque molestia minoriq; negotio ad conuenientia loca euacua- tionis à purgante medicamento trahetur. Non est igitur ut insicias eamus, bilem quæ aliquam partem corporis quietā obsidet, exigere concoctionem, ut educi è corpore queat: sed hoc constanter negamus huic opus esse, quod putauit Aui- cenna, & hunc hodie sequentes medici ferè omnes, ut crassi- tiem adipiscatur. Sic de humorum cōcoctione 1. Aph. 22. lo- quitur Hippocrates, dum ait: Concocta medicari, atque mo- uere non cruda, modo non turgeant: plurima uerò non tur- gent. Sic etiam Galenus, & post hunc Alexander Trallianus lib. 1.*

lib. 1. cap. 16. ubi ex professo de dolore capitis è bili prognato agit, & Actuarius in lib. De cōp. medi. cap. de flaua bile purganda, de bilis concoctione loquuti sunt, ut copiosissimè cap. 20. nostræ Methodi seu rationis perueniendi ad ueram medicinā diximus. Sed ad institutum nostrum reuertamur, ac medicamenta aliquot quæ biliosos humores cōcoquere possunt enumeremus. Tale est quod accipit: Serapij uiolacei ꝛ 1. serapij nymphaeæ ꝛ 1. liquoris stillaticij intybi satiui utriusq; rosarum, utriusq; ꝛ 1. Misceantur omnia, & appetente diluculo à ieiuno bibantur. In hunc usum exhiberi possunt Zula pia rosaceū & uiolaceum, decocta è seminibus cucumerum, cucurbitæ, portulacæ, intyborum satiuorū radicibus eorundè & cichorij, rosis, uiolis, nymphaea, lactuca, prunis damascenis, zisiphis, myxis, & similibus. Caterum uacuatur biliosus humor per absynthij dilutum, uel aloën, uel hieram picram per se datam, aut cum modica scammonia, aut catapotijs quæ ex aloë constant. Neq; ab instituto aberrabit, qui decoctum purgans, quod superiore capite commemorauimus, bibendū præbebit, in eo ꝛ 1. antidoti è succo rosaceo, aut è psilio dissoluens. Proderit etiam exhibere rhabarbari dilutum, quod recipit: Rhabarbari selecti ꝛ 2. spica ꝛ 1. Concidantur singula minutatim, & macerentur in stillaticij liquoris intybi satiui latioris, cassuthæ, buglosi, sing. ꝛ 1. uini optimi ꝛ 1. horis duodecim, dein ualide exprimantur & colentur, adiectis antidoti è succo rosaceo, è psilio, singul. ꝛ 1. Cōmixtis omnibus fiat potio purgās. Vti quoq; licebit catapotijs aureis uocatis, alaphanginis, è rhabarbaro, è hiera simplici, & similibus quæ in libro nostro secundo De usitata cōponendorū medica. huius temporis ratione ordine recensuimus. In delicatis nō temerè quis hoc utetur bolo, qui accipit: Diacrydij ꝛ 1. mace-

Dilutū rhabarbari.

d nymphaeæ,

Bolus pur-
gatorius.
Clyster.

Localia.

nymphæ, utriusq; ꝛ ꝑ. sacchari quod satis est, singatur bolus. Noc absurdum etiam erit clysteribus uti, in hunc uel similem modū paratis. Maluæ, althææ, intybi satiui utriusq; uiolarū, sing. in ꝑ. hordei integri ꝛ ꝑ. seminū quatuor cōmuniū frigidorū minorū, sing. 3. Coquātur omnia in aqua fontana ad tertias, et colo trāsfundātur. Dein accipe iuris decocti et colati lib. ꝑ. medullæ casie fistularis ꝛ ꝑ. hieræ picræ ꝛ ꝑ. olei uiolacei ꝛ ꝑ. mellis uiolacei ꝛ ꝑ. salis ꝛ ꝑ. f. cōmixtis omnibus fiat clyster. Post biliosi humoris uacuationē ea adhibeantur medicamēta, quæ caput refrigerare ac roborare possūt, quorū multa cap. 7. huius lib. cōmemorauimus. Quòd si uigil supra dū eger fuerit, synciput oleo nymphææ, & de papauere inungēdū erit. Prædictis ut interdū parū accedat opij necesse erit, ut saltē hac ratione, si aliter nō liceat, somnus conciliari queat. Galenus in hūc usum trigoni pastillū, q̄ a Paulo lib. 7. cap. 12. describitur, ut scilicet eo frons inungatur, cōmendat.

De dolore capitis e' pituitosis humoribus. Cap. XII.

Generatur ab omnibus quæ pituitam in capite procreant, aëre frigido & humido, cibis ijsdem qualitatibus præditis, piscibus lacte, oleribus, fructibus, ocio, somno à satietate, & id genus alijs. Dignoscitur capitis gravitate, faciesq; si alba & humida fuerit. Si deniq; eger somno facile teneatur, piger est, sensibus minimè uiget, & excrementis caput redundat. Aër in quo eger uersabitur, calidus & siccus sit natura: aut si haberi eiusmodi non possit, arte per odoramenta nonnulla, nempe cinnamomū, thus, gariophyllos, lignum aloës, & similia paretur. Carnibus uescatur magna ex parte aspis, & odoramentorum accessione conditis. In potu utatur uino tenui. Motu mediocri, & alijs que

Vitus ratio.

quæ cap. 8. cōmemorauimus. Curandiratio à pituitosi hu- Curatio
 moris extenuatione aspiciabitur. Quapropter ea, quib. exa Pituitæ ex-
 tenuandi & incidendi uis inest exhibebūtur, præsidia: cuius tenuatio,
 farinæ sunt mel rosaceum, oxymeli simplex, compositum, &
 scylliticum, serapiū è stichade, liquores stillaticij hyssopi,
 betonica, maiorana, saluie, & eiusmodi. Paretur igitur
 medicamentum quod accipit: Oxymelitis scylliticij ꝑ 1. se-
 rapij è stichade ꝑ 1. liquoris stillaticij hyssopi, apij, maio-
 rana, singul. ꝑ 1. Commisceantur, fiatq; potio. Quod si se- Decoctum
 rapiorum & stillaticiorum liquorum usus displicuerit, li- pituitæ ex-
 cebit hoc uel simili decocto uti, quod accipit: Radicum fœ- tenuans
 niculi, petroselini, apij, singul. ꝑ 1. radicum pœoniae ꝑ 2. semi-
 nū anisi, fœniculi, seseli: siler montanum officinae uocant, sin-
 gul. ꝑ 3. stichadis, origani, serpilli, maiorana, calamintha, be-
 thonica, saluie, singul. m. ꝑ 1. cinnamomi selecti, maceris utri-
 usque ꝑ 1. f. Decoquantur tātis per in aqua iustæ quātitatis,
 dū medieta relinquantur. Ius decocti colo trāsfundatur, &
 saccharo suaue reddatur, atque subinde oui albuminibus de-
 puretur, adiiciaturq; serapij ex hyssopo, oxymelitis simpli- Purgatio
 cis, utriusq; ꝑ 3. Cōmixtis omnibus fiat potio. Porro exte-
 nuatis, & ad educcionē preparatis humoribus ea quæ pur-
 gandi pituitam uim obtinent medicamenta propinanda ue-
 niunt. In quæ usum pilulas has deuorabit æger, quæ recipiūt:
 Pilularū cochiarum ꝑ 1. f. pilularum è hiera composita ꝑ 1. Pilulæ
 pilulæ lephanginarū ꝑ 1. f. agarici in pastillorū formā redacti
 ꝑ 2. myrobalanorū cepulorū ꝑ 1. turbit optimi ꝑ 1. f. sticha-
 dis, zingiberis, utriusq; gran. 5. mastiches gra. 7. seminū pœo-
 niæ numero 3. castorei grana 4. cū stillaticio lauādula liquo-
 re singatur catapotia ꝑ singulis drachmis undecim. Cōpe-
 tit uerò hoc malo affectis nō semel, sed bis aut ter purgare:
 qd' crassi et tenaces humores repētim ac subite purgationi

non confestim obtemperent, pedetentim uerò & identidem purgādo cōcocti facilius purgatorijs medicamentis obediūt. Conferunt etiā clysteres, non solum propter euacuationē eorum quæ in intestinis cōtinentur, uerumetiā propter reuulsionē eorum quæ ad caput feruntur. In hunc igitur usum decoctum paulò antè descriptum cōducet, si eius iuris accipiatur 3 12. & in ijs dissoluatur benedictæ laxatiuæ 3 6. antidoti indimāioris 3 3. diaphœnicon 3 2. mellis rosacei 3 1. oleorum laurini, rutacei, utrorunq; 3 1. f. salis fossilis saxei 3 1. Miscēatur singula, & fiat clyster. Vacuato itaq; uniuerso corpore, ea quæ caput expurgare possunt adhibēda erunt medicamēta, è quorum numero sunt apophlegmatismi, quorū exemplū è capite primo huius libri petes. Purgatur etiam caput per succos maioranæ, bliti, brassicæ, & similiū, de quibus in lib. 2. de Vsitata nostri temporis medicamētōrū cōponendorum ratione, cap. 25. diximus copiosè. Possunt & hoc nomine exhiberi gargarismi è stillaticijs liquoribus hyssopi, betonicæ, origani, hiera picra, & oxymelite compositi, uel in eum modum, qui accipit: Radicis pyrethri, piperis longi, utriusq; 3 1. f. seminis staphysagriæ 3 6. maioranæ, pulegij, hyssopi, origani, betonicæ, singul. m. f. Decoquātur omnia in aqua iustæ quantitatis ad tertius. Iuridecocti colato adijce mellis rosacei 3 1. f. oxymelitis scyllitici 3 6. Commixtis uniuersis fiat gargarismus. Præterea sternutamentorum quoq; hoc in malo locus erit, quæ accipiunt: Maioranæ 3 1. nigellæ 3 6. garyophyllorum, piperis albi, carpesiorū, singul. 3 1. nucis moschatæ, struthij (condisi officinis uocatur) castorij, ellebori albi, singul. 3 6. Terantur singula, & in tenuissimum redigantur puluerem pro sternutationibus ciendis. Ditiorebus aliquid moschi & ambar, utriusq; nimirum grana 2. cōmiscēantur. Naribus deniq; odoramenta calida adhibere cōuenit,

uenit, aut orbiculum aliquod odoriferum arte paratū, quale est quod cap. octauo cōmemorauimus. Errhina quoq; (*bar* Errhina, *baris* nasalia uocātur) indita naribus mirificè cōmodare egrotantibus solent, quæ recipiunt: Seminis staphydis agriæ, pyrethri, piperis candidi, singul. 3 ℥. nigellæ, struthij, utriusque ÷ 2. ellebori albi ÷ ℥. Tritis singulis cum resina terebinthina & modica cera fiant errhina pyramidis formā referētia. A capitis purgatione conueniunt inunctiones, embrochæ, sacculi, & id genus alia medicamenta suprā capite octauo producta, quibus eius quod reliquum est à purgatione totius corporis, discutiēdi uis inest. Intra corpus adhibebūtur haud inutiliter carpesia saccharo obducta, antidota diambar, diamoschi, aromatici rosacei, diacumini, dianthon, theriaca, mithridatios, diacori, sacchara maioranæ, rosmarini, betonicae, cū serapio è stichade. Præ alijs autē hæc potissimū antidotus conferet, quæ accipit: Specierum antidoti è gemmis, diathios, utriusq; ÷ 1. carpesiorum, maceris, utriusq; 3 ℥. ligni aloës, garyophyllorum, seminis foeniculi, singul. ÷ ℥. cinamomi selecti ÷ 2. stichadis ÷ ℥. sacchari candidissimi in stillicidio florū pæoniæ & lauandulæ liquore liquefacti 3. singantur orbiculi aut morsuli, pro egrotantis arbitrio. Non ignoramus practicarum (ut uocāt) scriptores nonnullos, ijs quæ nunc commemorauimus subijcere Caput de dolore capitis ex humoribus melancholicis nato, præter tamen decorum ac necessitatē, cum hæc omnia quæ ab illis dicuntur, rectius ad Caput de Melancholia transferenda ueniant.

De dolore capitis è ventriculi uitio
orto. Cap. XIII.

HAtenus capitis primarios primogenios uel dolores ut curare oporteat monstrauimus: nunc reliquum est.

ut eorū qui per cōsensum accidunt curationes tradamus, initio sumpto ab eo qui à uentriculo malè se habēte excitatur.

Causæ. Is autē magna ex parte accidit, ubi exiguus quīspīa in eo, & præsertim in ore eius, humor acris coaceruatur, à quo uapores prauī excitati sursum ferūtur. Cognoscitur mordaci dolore, quē qui ita dolēt percipiūt, & nausea, quæ tū ore potissimū uentriculi patiēte, instare egrotantē solet. Porro qui sic caput dolēt, ij si diutius famē & inediā ferunt, magis offendūtur. Augetur enim ipsis propter inediā eiu, modi humoris malitia, & prauitas. Curare eos qui sic instātur oportet, nihil remediorum capiti adhibentes, quū nullū peculiare caput sustineat malū, sed ab humorum in uentriculo prauos excitantiū uapores ascensu molestetur. Noxios igitur uentriculi humores quī in celerrimē uacuare oportet. Euacuatur autē, qui in ore illius cōtimētur, facile his qui ad uomitū proclines sunt, aquæ calidæ potu. Qui uerò agrē uomūt, difficilius: adēd ut etiā nonnulli digitorū, aut pinnarū immisso ne ad uomitū uentriculum irritantes, nihilo plus proficiunt. Porro ad os uentriculi ob naturalē suam leuitatem fluxa & pallida bilis prompte effertur. Pituitosus autem, aut acidus, aut salsus, in spacio & amplitudine magis totius uentriculi, quā in ore ipsius firmatur. Optimum autem fuerit, in fundo uentriculi ipsos contineri. Facile enim relicto uentriculo, ad intestina delabuntur. Pessimus fit affectus, ubi uitiosi humores in uentriculi tunicas sic immerguntur, ut uix elui possint. Si itaque in tunicas uentriculi receptus fuerit humor, optimum remedium est hiera picra medicamentū. Hoc uacuato, cibus subinde boni succi & uentriculo cōmodis utendum. Et cū ad prauorum humorum in uentriculo redundātiā, tum concoctricis facultatis imbecillitas, tum oris uentriculi infirmitas plurimum conserant, danda erit opera, ut

concoct

cōcoctrix facultas, itemq; os uentriculi per ea medicamenta quibus adstringendi ac roborandi facultas inest firmetur. Quorum omnium copiam suppeditabit liber tertius, in quo ex professo de uentriculi uitij tractabimus.

De dolore capitis ex ebrietate.

Caput XIII.

E brietatem parit maximè uinum natura calidum, uapo- Causa
 rosū, merum, & largum. Generant autem calida tem-
 peramento uina dolorē capitis, quia uaporibus caput omni-
 no replent, quandoq; etiam humoribus temperatura calidis.
 Notis ad dignoscendum hoc pathema, nullis opus est, cū Nota
 ē sermonibus agrotantis facile cognosci mali causa possit.
 Curandi ratio duabus potissimum rebus perficitur, nimirum Curatio
 euacuatione, & refrigeratione. Itaque si uinū crudum adhuc
 permanet, & in uentriculo fluctuat, ut aqua tepida epota uo-
 mat qui caput dolet iubebis. Quod si etiam post concoctio-
 nem caput doleat, refrigerātibus, & uapores qui ex alto ad
 caput feruntur reprimētibus medicamentis utendum est:
 quale rosaceum est per se, & cum aceto, aut cū hederæ &
 brassicæ succo. Quin & ipsa Brassicæ folia in aqua calida,
 macerata, & capiti circumdata illigatāq; naturaliter ebrie-
 tati resistunt. Eiusdem etiam decoctæ esus in id efficax est.
 Amara etiam amygdalæ quinque aut septem ieiuno oblata,
 ebrietatem arcere creduntur. Præsentem quoque ebrieta-
 tem extinguunt, centaury minoris decoctum, Aëtio autore,
 cornu ceruinum, uerbenacæq; rectæ semen, ex aqua potum.
 Habenda deinceps cura est somni & quietis: quod ubi factū Vicius 22
 fuerit, per totum diem ad uesteram in balneo dulcis aquæ tio
 lauare: ubi laueris, cibus boni succi, non tamen calfacienti-
 bus nutrire oportet. Sunt autem huiusmodi, ptisanæ succus,

sorbitio ex alica, panis ex aqua, oua sorbilia, & lentis iusculum, præsertim humidiorē uentriculo præditis. Ex oleribus lactuca boni succi est, & refrigeratoria: brassica uapores desiccatur. Ceterum potu omnino aquæ utendū est in ijs qui eius potu assueti sunt, aliasq; habet uentriculū æstuosum ac exustum. Verum quia nonnullorum uentriculus propter aquæ potum subuertitur, malū granatum ipsis cōcedendum est, aut solum per se, aut cum alica subacta, probè cocta, calida. Vnde præterea passæ, & pyra, aliqua quidē cruda, aliqua uerò cocta, ut malū cotoneum, stomachum corroborat. A palmulis abstinere consilium est, ut quæ proprietatē quandā habent capitis dolorem inducēdi. At si neq; post hæc probè dormire possint, ad balneum postridie quā citissimè ducendi sunt, & aqua calida eis frequenter in balneo superfundenda. Deinde ubi dormierint, aut omnino interposito tempore quiesuerint, rursus ad balneum deducendi sunt, dein ueluti pridie nutriendi. Quod si mediocriter habeant, & aquam bibere nequeunt, permittendū est ut aquosum uinum bibāt. Cibi etiā, ubi mediocriter se habuerint, dentur gallorum testiculi & alæ, pisces saxatiles, & tenera carne præditi, columbarumq; pulli. Porro constat omnibus, satius esse & ipsos, & omnes qui caput dolent, augescēte adhuc & uigente dolore, quiescere: remittente uerò & declinante, idoneis locis deambulare. Apti uerò sunt ijs qui calefieri desiderant, calidiora: qui refrigerari, frigidiora. Et ante cibum quidem pluribus deambulationibus utendum, à cibo autem paucis & lentis. Oportet uerò neque comedere multum, neque statim deambulare, sed post duas aut tres, aut etiam plures, horas. Quod si aliquando ex uaporibus & humoribus in caput sublati reliquie quedam relinquantur tenuibus meatibus impactæ, & ob id etiam capitis dolor perseveret, à rosaceo quidem desin-

Palmule capitis
dolorē inducūt.

Generalia
precepta in
uictus ratione
obseruanda.

fin

stendum est, utendum uerò primùm chamamelino modera-
tè calido, postea irino: maximopere enim huiusmodi affe-
ctus inuuant. In balneo autem caput aqua perfundatur, nō so-
lum ut aliquid eorum quæ intra ipsum habentur, discutiatur:
uerum somni etiam conciliandi gratia. Quapropter etiam
secundum, aut tertium ad uesperam balneum apparandum
est, acceptis ab eo lactucis ex aceto. Post hæc die subsequen-
ti ea quæ caput magis calefaciunt applicabuntur, miscendo
irino oleo, nunc nardinum, nunc costinum, nunc alia eius ge-
neris olea & unguenta. Hac igitur ratione capitis dolores ex
uino curantur.

De capitis dolore ex ictu vel casu.

Caput XV.

NAscitur sæpè capitis dolor ex ictu aut casu, quod ubi ^{Viens ma-}
accidit, tum à uino, & carnibus, omnibusq; cibis ple-^{tio.}
nioribus solidioribus uel abstinere oportet, præsertim si æ-
grotautes febricitent. Ptisanæ uerò succus, lutea ouorum, ius
maluæ elixæ, lactucæ intuba, & cucurbitæ ijs sunt exhibendæ.
Præterea quies, corporisq; tranquillitas cōuenit. Abstinèn-
dum etiā à sole, balneo, clamore, distentione, & à cibis aci-
dis, acribus, & salsis. Quòd si itaq; ictus aut casus uulneris, ^{Curatio.}
uel cōtusionis causa fuerit, scopi plures erūt inuentionis re-
mediorū. Vnus sanè, qui propter uulnus existit, cuius causa
glutinātib; medicamentis, & inflammationē arcentibus uti
cōuenit, postquā ulceris labia fibulis impositis cōmissa fue-
rint. Secūdus qui ob cōtusionē, & tertius qui dolorum causa
adhibetur: qui quandoq; in ipsis solis ictis particulis fiunt,
plerūq; uerò etiā ad uicinas partes extenduntur. Nam mem-
brana, quæ caluariā ambit, et cutis quæ huic extrinsecus cir-
cuntenditur, utraq; propriam substantiam continuam ha-
bens,

bens, per totum caput extensa est: & ob id sanè sæpè caput ipsum dolere contingit, præsertim si ictus usq; ad mēbranā os caluæ ambientē penetret: quem membrana caluariā ambiēte diuisa rasiq; curare oportet, ratione qua caro producitur. Quòd si per communionē membrana caluariam ambientis, quam per suturas cum dura membrana habet, etiā intra caluariam ipsa inflammatio distribuatur, eiusmodi capitis dolor periculo non uacat. Ceterum non raro accidit in casu ex alto, aliquam cerebri aut mēbranarum eius particulā abrūpi: quod ubi cōtigerit, etiā amplius capitis dolor inualescit, ipseq; totus affectus curatu difficilior, & periculum præsentius & uehementius est. Optimū igitur in ijs, nisi ætas prohibeat, & facultas uitalis imbecilla appareat, curationis initium à sanguinis missione moliri. Incidenda autē erit humeralis uena, quæ è directo loci patientis sita est. Quòd si propter ætatem, aut uirium imbecillitatē, aut etiam ambo simul, sanguinis detractionē tentare prohibeamur, per clysterē aluum uacuabimus, tum ut huius excrementa euacuentur, tum ut humores qui ad patientes partes ferri cōsueuerunt reuelantur, atq; inde auxilijs ad inflammationem commodis utemur. Conuenit autem imprimis congruis capitis irrigationibus uti, ex lana nimirum oleo dulci imbuta, capiteq; ex ea cōtecto, ne scilicet neruorum origo cerebrum ipsum refrigetur. In quē usum embrochæ etiā probantur. Sin membrana cerebri fuerit conuulnata, probè hanc conglutinat calaminthæ succus instillatus, et milij farina arida inpersa. Deinde butyrum rosaceum, adeps suilla salis expers, uetusta, mixta & tepida superfusa. Animaduertendū autē, ubi crassæ cerebri membranae nudæ rosaceum offertur, quemadmodum in ijs quibus aliquid ex capitis osse excinditur, accidit, solum ipsum modicè tepidum adhibemus. Quum uerò citra denudatio

Venæ sectionio.

Clyster.

Localia.

Embrocha

dationem, per capitis iuxta finciput partem, sana & integra existente caluaria, rosaceum ad cerebri membranā peruenire uelimus, acetum ei ut eò perducatur miscemus. Cuius item rursus uehemens uirtus tum per uiarum transitionem, tum per rosacei mixturam exoluitur. Ceterum cutis capitis, aut quæ post eam est mēbranā caluariā ambientis inflammatio- nes, citra quidē uehementē dolorem abortæ, per modici sanè acetī ad rosaceum admixtionē iuuari possunt: ledentur au- tem, ubi magna fuerint, doloremq; uehementem induxerint. Rosaceum denique cum aceto, incipientibus: in uigore uerò consistentibus, rosaceum solum adhibemus. Quēadmodum etiam in ijs quæ in scirrhum abeūt, absinthium ac pulegium ei permiscemus. At uerò quæ citra indurationem decrescunt inflammationes, laxantibus medicamētis indigent. Quorum omnium in ijs quæ post dicemus exempla inuenies.

De dolore capitis in febribus.

Caput XVI.

Quod si febriētes capitis doloribus affligūtur, accura-
ta perpenſione cōsiderandū erit, num capitis dolores
statim initio cū febribus inuadāt, aut postea febrī
bus increſcētibus oriantur. Nam si nō cōſeſtim cū febre do-
lor capitis irruat, sed interea tēporis dum scilicet febris ipsa
prope iudicationem uenit, tunc nulla penitus remedia quæ-
rantur, quòd is uomitum, aut sanguinis è naribus profluuiū
decretorium portendat, quemadmodum copiosè Hippocra-
tes in libris Prognosticorum, & post eum Galenus lib. 3. de
Crisibus, & lib. 1. ad Glauconem, capite ultimo, tradūt. Si ue-
rò simul cum febribus inuadat, à uaporibus, aut humoribus
ob febris magnitudinem fufis, ac uelut efferueſcētibus ad ca-
put elatis, atq; ob partis imbecillitatem, accidit, Quare si ab
humo

Vene se-
tio.

- humorum copia oriatur dolor, uena secunda est post primā aut secundā remissionē, si nihil prohibeat, præsertim in cor-
- Reuulsio.** poribus boni habitus, multiq; sanguinis. In cōtrarium etiam trahendum, atq; adeò reuellendum erit acribus chysteribus, quorum exempla petes è capite de apoplexia, & nexibus, & frictionibus in partibus inferioribus plurimis. Cucurbitula
- Localia.** etiā occipitio aut ceruici affigendæ. Capiti uerò admouenda sunt irrigationes, quæ ab eo uim repellendi obtinēt, ac dein-
- Repellen-**
tia. de euacuantibus, postremò uerò corroboratibus utendū. Re-
pellunt autē oleum rosaceū, & alia quæ supra capite septi-
mo sunt cōnumerata. Utendū uerò ipsis in calidioribus habi-
tudinibus ac hora æstiuæ frigidis, & cū modico aceto: in fri-
gidioribus autē ac hyeme, tepidis. Si febris uehēmēs fuerit, ui-
giliæq; crebræ egrotantē infestauerint, è capitibus papaue-
rum, sedo, & id genus alijs qbus refrigerandi, & somnū cō-
ciliandi uis inest medicamētis paratis irrigationibus utendū
erit, qualis est quæ accipit: Florum uiolarū, nymphææ, rosa-
rum, utrorūq; m̃. i. hordei decorticati ꝑ. i. capitū papaueris
ꝑ. i. semperuiui maioris m̃. f. Coquantur omnia in aqua iustæ
quātitatis ad tertias, & fiat embrocha. Vbi cerebrū abundē
refrigeratū fuerit, ea subinde adhibēda sunt, quæ caput cale-
facere denuò, atq; adeò euacuare atq; discutere reliquias hu-
morū possūt. Quapropter chamæmelino oleo, anethino, iri-
noq; utēdū, aut decocto chamæmeli, altheæ, et similiū. Et si te-
naces ac crassi fuerint humores, serpillū, aut pulegiij comā,
uel calaminthæ, uel mentæ, uel sisymbrij, in ijs decoquere cō-
uenit. Postremū caput per rosaceum oleum, & similia, nem-
pe betonicā, chamæmelum, ac melilotum, corroborandum ac
firmandum erit. Porro non solū in ijs qui ex febribus caput
dolent, sed etiā & omnibus alijs circa caput obortis passiōi-
bus, cauere oportet hæc quæ sequuntur, uiticis semen, absin-
thij

thij succum, lactis potionē, eruum, myrrham, thus, hederæ corymbos, crocum, peucedanum, cyclaminum, & styracem, quod natura sua capitis dolorem ac grauitatem inducant.

De cephalæa. Cap. XVII.

Kεφαλαία diurnus & agrè cedens, ac contumax κεφα-
λαία.
capitis dolor Græcis dicitur, qui ob exiguas occasio-
nes maximas habet exacerbationes, adeò ut neq; strepitū fe-
rat egrotus, neq; uehementiorē uocem, neq; lucis claritatem,
neq; uini potionē, neq; caput repletia odoramenta, neq; mo-
tum: sed in quiete & tenebris propter dolorum magnitudi-
nem cupiat decumbere, ut cui uideatur caput ueluti à malleo
feriri. Nonnulli etiam tanquam cōtundantur, aut distendan-
tur ea quæ circa caput sunt, sentiunt: non paucis uerò usque
ad oculorum radices dolor progreditur. Ceterum hoc malū
sanè nonnunquam continuos dolores habet, nonnunquā uerò
exacerbationes & intermissiones uel ordinatas, uel inordi-
natas. Iam quidā ex eis cerebri membranas dolitant, quidam
uerò membranam tantum caluariam ambientē. Fit à plenitu- Causæ.
dine, aut humorum uaporum ue acrimonia intra uel extra
caluariam contentorum, inflammatione, & capitis imbecil-
litate. Dolores itaq; qui cum grauitate inuadunt, plenitudi- Notæ.
nem indicāt: qui uerò cum erosione infestant, aut humorum,
aut uaporum acrimoniam: qui cum pulsu, inflammationem:
qui cum tensione, si quidem citra grauitatem & pulsū ob-
ueniant, flatus crudi & flatulenti copiam demonstrant: cum
pulsu uerò membranosi corporis inflammationē. At si cum
grauitate distentio fiat, copiam humorum intra membranas
contentam. Ac dolores quidem in superficie hærentes, mem-
branae os caluæ ambientis passionem significant. Qui uerò
in alto ac profundo affligunt, cerebri membranarum. Qui-
bus

- bus enim affectus intra caluariam est, ijs ad oculorum radices dolores procedunt: eo quod oculorum tunica à cerebri membranis habeant ortum. Quod si etiam putris humor calidior euaserit, cum febre caput dolent: febricitant autem omnino, & qui ex inflammatione dolent. Porro qualis in hoc malo esse debeat uictus ratio, facile ex superioribus de Capitis doloribus capitibus colligi à quouis studioso potest. Consultò itaque hanc, ne temerè idem sæpè repetamus, præterimus. Curadi ratio, ubi humorum uaporum uel copiam causam esse deprehenderis, si quidem ex totius corporis plenitudine generata sit, ab uniuerſi corporis uacuatione auspicanda erit. Vena itaque in hac corporis satietate incidenda primò cubiti externa, eiusdem lateris, quam humeralem uocant, idque faciendū si uires patiantur, aut aliud quippiam non obſtet. Acrioribus quoque clysteribus uti conuenit. Indes si adhuc sanguis redundare uideatur, etiam è naribus, uena adaperſa, quantum satis esse uidebitur, detrahes. Mox hiera, cuius uim exacueris intenderisque, exhibenda est. Porro si caput uelut imbecille existens, ea quæ sursum feruntur excipit, materiam initio in totum corpus reuellere oportet, atque ita particule patienti mederi. Reuulsio autem fit clysteribus, extremorum deligaturis, & pluribus inferiorum partium frictionibus. Hieræ quoque intensioris usus commendatur. Post totius uerò corporis uacuationem, tunc ad ea quæ caput euacuant accedes, deinde ad ea quæ firmanſ, ac robur addunt. Caput uacuant apophlegmatismi, & quæ naribus induntur medicamenta. ῥέγινα Græci uocant, ut est succus cucumeris syluestris, elaterium appellant, cum lacte infusus, uel etiam aridum elaterium inspiratum, succusque cyclamini & porri, & alia quæ supra cap. 12. commemorauimus. Repellit autem oleum omphacinum, hoc est, ex immaturis
- Viſus ratio.
- Curatio.
- Venæ ſectio.
- Clyſteres.
- Purgatio.
- Reuulſio.
- Localia.
- Vacuatio.
- Repellētia

maturis oliuis expreffum, & roſaceum per ſe, & cum aceto illitum, & quæ ſunt ſimilia, de quibus in præcedētibus capiti-
bus abundè diximus. Cæterum adhibebis remedia tepida, ubi copia humorū frigidior & crudior fuerit : frigida, ubi calia-
dior & bilioſior extiterit. Poſt hæc, quæ diſcutiunt medica- ^{Diſcutien-}
menta, ſunt admouēda, ut eſt oleū chamamelinū, anethinum, ^{tia.}
& ijs ſimilia ſupra à nobis comemorata. Si quidem craſſior humorum copia fuerit, ſerpillum, aut pullegij comā, aut ca-
laminthes, aut mētā in oleo elixabis, ac copiā uacuabis. Hæc
autem ipſa etiam robur particulæ adiſciunt, quapropter his
ipſis ad perfectam uſq; curationē uti oportet. Omnium uerò
maximè diſcutit, & ſtrenuè corroborat uerbenaca recta,
 præſertim uiridis : imò & arida, cum radicibus & ſerpillo
pariter oleo cōcoctis. Si uerbenaca per ſe in oleo decocta ca-
put perſuderis, omni capitis dolori diuturno ob frigus obor-
to, aut ex craſſis humoribus medeberis. Maximè autē pro-
ſunt ſub aquario uafe naſcentes aſelli, ſi oleo incoquantur.

De hemicrania. Cap. XVIII.

Hemicrania malū eſt dolorificū in dimidia capitis par- ^{Hemicra-}
te, nunc dextra, nunc ſiniſtra ortum, quòd futura ſecū- ^{nia.}
dum longitudinē eius extenſa diſtinguitur. Hoc plurimū per
circuitus exacerbatur, ac quibuſdam extra caluariam, qui-
buſdam in profundo capitis, nonnullis iuxta temporū muſcu-
los dolor ſentitur. Cauſa doloris huius uaporum, aut humo- ^{Cauſæ.}
rum ſiue multorum, ſiue calidorum, ſiue frigidorum, uel per-
uenas, uel arterias, uel per utraſq; influxu : interim quidem
ipſis ſolis partibus caluariæ internis, hoc eſt, cerebro, & eius
membranis recrementa ſua foras propellētibus interim par-
tibus corporis, quæ infra caput ſunt uitiatos uapores aut hu-
mores ſurſum mittētibus. Notæ qbus uapores aut humores ^{Notæ.}
copioſi

copiosi calidi aut frigidi deprehenduntur, è capitibus superioribus studiosis petendæ erūt. Porro quo in loco capitis passio fuerit, ex ijs quæ in capite de cephalæa diximus, cognosces. Quibus hoc adiiciendum erit, quòd si mēbrana caluam ambiens patitur, tum adeò uehementer dolent, ut ne manuum quidē contactum facillè ferant, adeò ut ne cutis quidē ipsa omnino à passione immunis sit. **Victus ratio.** Victus rationem promptè ex ijs quæ in præcedentibus capitibus cōmemorauimus, mediocriter etiā docti cōstituent. Præcipuè tamen uitabunt egrotantes, ea quæ uaporum acrium copiā sursum ad caput mittere possunt, ut sunt allia, cepe, sinapi, raphanus, & similia. **Curatio.** Qui hemicraniam curare aggreditur, is principiò num sanguinis missione, aut corporis purgatione indigeat eger cōsideret. Si enim ob plenitudinē malum ortū fuerit, humeralis uena (quā hodie cephalicā nominant) quæ è directo patiētis particule est, incidenda erit. Sin propter unius humoris redūdantiā hemicrania inuasit, per cōuenientia medicamenta is humor purgabitur, ut in superioribus monstratū est capitibus. **Localia.** Vniuerso corpore uacuato, ad capitis ipsius localia uocata præsidia ueniendū, ac uel per propriæ manus digitos, uel linteam dimidia frontis pars, & ea præsertim quæ circa temporum musculos est, fricādo calefacienda, atq; id ante accessionis tēpus faciendum. Post accessionē medicamētis à ueteribus medicis hemicranicis appellatis utendū. Si calor multus in doloribus percipitur, ijs quæ aliquid habēt refrigeratoriū: si ille nō adest, ijs quæ uehementè calefaciunt. Vtriusq; autē aliqd corroborans, quod adstrictoria facultate præditū sit, misceatur. **Unguentū.** Optimū uerò in frigido affectu remedium erit hoc unguentū, quod accipit: Oleorū anethini, irini, sing. ʒ ʒ. piperis albi, serpilli, utriusq; ʒ ʒ. castorij ʒ ʒ. euphorbij ʒ ʒ. ceræ quod satis est, fiat unguētū, quod dimidia frōtis partibus, &

ti, & musculo temporis illinatur. Mirificè etiam in hoc ma-
lo confert hoc tepidum in aurem infusum, quod recipit: Olei
dulcis ꝛi. euphorbij ꝛi. His commixtis, gutta una in au-
rem instilletur. Plus autem & minus euphorbij adijciendum,
prout corpus acri aut hebeti sensu præditum fuerit. Quadā
etiam naturæ proprietate euphorbium aceto dilutū, ac latere
dextro dolente sinistro applicatum: & contrā sinistro dolē-
te dextro illitum, hemicranicis maximè cōferre Aëtius pro-
didit. Idem etiam posse lumbricos terræ tritos, & cochlearū
carnes lateri patienti illitas tradit. Sunt qui persicorum nu-
cleos tritos, ac illitos parti malè affectæ miricè conferre me-
moræ prodiderint. Quòd si uerò à calidis humoribus aut ua-
poribus dimidiæ partis dolor accidit, ea sanè auxilia quæ su-
prà De capitis dolore ex calore & biliosis humoribus orto
memorauimus, adhibebuntur.

De vertigine. Cap. XIX.

QUOD σκόρωνα Græcis est, hoc Latinis uertigo dici-
tur. Quare barbari, qui hoc malum corrupta uoce μα-
scotomiā uocant, uehementer errant, dum differ Vertigo.
re inter se hæc duo uocabula tradunt. Est autem uertigo, ubi
obtenebrationes hebetudinesq; oculis obuersantur, & omnia
circumagi & rotari uidetur. Oritur hoc pathema interdum Causæ,
cerebro primogenia passione laborāte: interdum etiā, quum
oris uentriculi consensu laborat. Cerebrum uerò patitur, ubi
crassus & lentus humor ipsum occupat, à quo uaporosus
spiritus ab imbecilli calore resolutus, in cerebri partibus in-
ordinate mouetur. Ori autē uentriculi consentit, quādo pro-
pter uitiosos humores in eo aceruatos, uaporosa exhalatio
ad cerebrum fertur, spiritum animalē in illo rotans ac cir-
cumagēs. Qui hoc malo laborāt, ijs à quacūq; leui occasione Notæ.
e præ

præ oculis tenebræ apparent, adeò ut nonnunquã cadât ægro-
tantes, maximè ubi in circum rotètur. Siquidè illis q̃b una ro-
tatione euenit id, quod alijs à pluribus accidere solet. Proin-
de hebescūt siue aliũ quempia, siue rotam, aut id genus aliud
quippiã, aut ipsos quoq; in aquis uortices circũagi uiderint.
Visibilis enim spiritus rotæ agitata, alijsq; iam dictis occur-
rens, eodem motu circũuehitur, atq; ita turbulētus, in qua
lis, inordinatusq; humoris & spiritus motus redditur. Vbi
ex primaria cerebri passione uertigo dependet, tum aurium
sonitus, uehemens dolor capitis, grauitasq; præcedunt: item
olfactus, atq; alterius cuiusq; sensus à capite proleūtis obla-
sio. Patiuntur autē tum potissimum, quum sub sole æstuaue-
rint, uel aliam ob causam calefacto capite humores dissoluti
circumaguntur. Vbi uerò ab ore uentriculi oritur, stomachi
morsione, *νερόσιν* Græci nominant, & nauſeam præ-
sentiunt. Aeger, quod ad uictus rationē attinet commoretur
in aëre puro & lucido, deuitet autē crassū et nebulosum. Ci-
bis uestatur boni succi, ac concoctu facilibus, statuq; omnino
carentibus, carnibus perdicum, caporum, phasianorum, gal-
linarum, uitulorumq; piscibus deniq; saxatilibus, & eiusmodi,
quæ nullo negotio concoqui queant. Vitanda omnia à quibz
uapores sursum feruntur. Bibendū uinum aquosum, albū,
tenuissimum, non admodum antiquum, aut hydromeli. Exer-
citium sit mediocre. Somnus diurnus uitetur. Nocturnus sit
prolixior. Caueat sibi æger ab animi perturbationibus. Non
intucatur res in gyrum actas & rotatas, aut celeriter motas,
neq; in præcipitijs ambulet: hæc enim singula malū exacer-
bare ualent. Porro, quod ad curandi rationē attinet, uertigi-
nosos in acceſsione odoramētis, frictionibus, & id genus alijs
excitare cōuenit. Virium autē attestante robore, si nihil aliud
obstiterit, uena humeralis secanda est, siue principium mor-
bi fue

Victus ra-
tio.

Curatio.

Vena se-
cādo.

bi fuerit, siue etiā processerit. In sanguinis uerò missione obseruandum, ne confertim sanguis uacuetur, propterea quod à quacunq; leui occasione æger facile concidat. Pluribus itaq; detractiōibus per certa interualla utentes, cōgruam mensurā explebimus. Quòd si uerò sanguinis missionem quidpiā prohibuerit, aliud subducatur, semper redūdātī humori medicamentum adaptando. Mirificè uerò confert primum per acrem uacuare chysterē, nō solum propter eorum quæ in intestinis cōtinentur uacuationem, ut suprā quoq; monuimus, uerumetiam ob reuulsionem eorum quæ ad caput feruntur, cuius quidē exemplum in capite de Apoplexia proferemus. Præmissis itaq; uniuersi corporis euacuationibus, capiti localia adhibebuntur præsidia, inter quæ non postremum locū occupant cucurbitulæ cum scarificatione occipitio admotæ. Localia
Postea apophlegmatismus, gargarismis, & sternutamentis utendum est. In nares deinde anagallidis succus, aut cyclamini infundendus. Nitrum uerò cum nigella tritum, & oleo antiquo mixtum, per nares egregiè purgat. Deinceps æger ad balneum ducendus, ac caput embrocha ex medicamentis discutiendi facultate præditis composita, irrigandum. Quòd si uerò caput in balneo supra modum incaluerit, rosaceo & aceto sæpè fouendum est, atque refrigerandum. Si igitur per hæc præsidia malum cessauerit, subinde ualidioribus abstinendum: sin perstiterit, capitis arterias in temporibus circa aures incidere oportet, uentre tamen prius aut medicamento, aut chysteri purgato. Vt autem incidendæ sint arteriæ, ex Paulo Aeginata discēs, qui id ipsum perspicuè lib. 6. capite 4. tradit. Neque temerè cauterium hoc occipiti post aures accommodabitur, quod accipit: Cantharidum adiectis capiti-
bus alis & pedibus 3 1. fermēti acris 3 6. Cū aceto & uino è
sublimi ignis cōmercio distillato subigātur, & admoueātur. Cauteriu

Vertiginis à Vertigo autem à uentriculi oris consensu uomitu curari potest, qui hoc moueatur medicamento, quod accipit: Anethi m. i. seminum raphani & raporum, utriusq; 3 2. radice raphani & f. Ebulliant in aqua iustæ quantitatis, donec pars tertia absumatur. Ius decocti coletur, & addantur subinde Oxy melitis scylitici & i. f. Commixtis omnibus fiat potus, qui à comestione statim exhibeatur. Proderit etiam deuorare catapotia stomachica uocata, & similia. Dentur frequenter à cibo quæ os uentriculi constringunt, atque adeò ne uapores sursum ad caput ferantur impediunt: ut sunt diacotoneon sine speciebus, cotonia ipsa, pyra adstringentia, & eiusmodi, de quibus suo loco satis copiosè dicemus.

Vomitibus
ut irritandis

De phrenitide. Cap. XX.

Phrenitis
quid,
Phrenitis
dis species
tres,

Prima,

Theophilus medicus.

ΦΡΗΝΙΤΙΣ, Galeno lib. 2. de Sympto. causis autore, est cerebri, aut eius membranarum inflammatio. Sunt autem phrenitidis, eodem Galeno lib. 4. De Patientibus locis cap. 4. teste, species seu differentie tres, prout sensus interiores, qui ex illius sententia totidem sunt, nempe imaginatio, cogitatio, & memoria, leduntur. Quippe sunt phrenetici quidam, qui cogitatione manente illæsa, sensibus atque adeò imaginatione deprauatè mouentur, ueluti Theophilo medico ægrotanti, cuius Galenus in libro de Sympt. disse. meminit, euenisse constat. Is enim quum alioqui prudenter se gereret, & differeret, atq; eos qui tum præsentés erant exacte noceret, tibicines tamen quosdam arbitratur esse in angulo cubiculi, in quo decumbebat, eosq; tibia canere & pulsare, & se illos uidere putabat, alios quidem stantes, alios autem illic sedentes, atq; ita continenter canentes, ut neq; noctu, neq; interdiu quicquã remitteret. Proinde assidue clamãs, iussit eos à cubiculo expelli. Hic uerò ubi conualuit, quicquid singuli eorum qui ipsum uisita-

uifitabant, uel dixiffent, uel egiffent, narrabat. Denique uifo-
 forum quæ de cantoribus apparuerant, probè meminit. Eius-
 modi phrenitidis fpeciem in feipfo adulefcentulo adhuc ex-
 pertus eft etiam Galenus, quod lib. 4. De patiēt. locis cap. 1. Galenus.
 cōmemorat. Quum enim per æstatē ardente febre laboraret,
 & feftucas atro colore ex cubili eminere, & floccos simili-
 ter in uestibus eſſe putabat, quos auferre tentans, nihilq; ſub
 digitis eductum inueniens, accuratius uehementiusq; id effi-
 cere conatus eſt. Audiēs itaq; duos ex amicis, qui tum aderāt,
 dicentes: Vides ne hūc iam & floccos euellere, & feftucas
 colligere? ſtatim intellexit idipſum quod dicebant ſe feciſſe.
 Quum uerò ſic animo conſtaret, ut rationalis in eo facultas
 non uacillaret, rectè (inquit) dicitis: proinde ne phrenitis me
 arripiat, auxilio eſtote. Ex quibus iam planum fit, neque in
 Theophilo, neq; in Galeno cogitationem, rationem uel oble-
 ſam fuiſſe, ſed ſolam imaginationem. Alij rursus de ijs quæ Secunda.
 oculis offeruntur rectè, quātum ad ſenſitiuam notitiam ima-
 ginationem uel pertinet, iudicant: cogitando uerò ac ratioci-
 nādo à naturali iudicio aberrāt. Hoc pacto patiebatur phre-
 neticus ille, cuius meminit Galenus locis iam citatis, qui quū
 Romæ domi cum lanifici puero contineretur, ſurgens à cu-
 bili, obſeratis intus ianuīs, uenit ad fenestram, per quam &
 ipſe uideri, & prætereuntes uidere potuit. Itaq; ex uitreis ua-
 ſis ſingula oſtendens interrogauit, iuberent ne ut ea proij-
 ceret. Illi uerò ridentes plaudentesq; ut ea proijceret, roga-
 bant: tum ipſe deinceps omnia arripiens eiecit, at illi magnis
 acclamationibus riſerunt. Poſtea iuberent ne puerum quoq;
 proijci, quum eos interrogaffet, atque id illi iuſſiſſent, ilico
 ipſum deiecit, quem ab alto cadentem uidentes ſuppreſſo ſta-
 tim riſu, accurrerunt, & confractum iam puerum ſuſtule-
 runt. Hic ſanè ſingula uafa ſuis nomēclaturis probè nomina-

Tertia

uit, unde intelligi potest neq; imaginationem circa illa fuisse lesam, neq; nominum memoriam deletā, sed solam cogitationem à naturali iudicio deuiasse. Sunt præterea qui simul & sensus & cogitationis uitio, quod memorie etiam sequitur abolitio, laborāt. Tali delirij specie per pestilentiam correpti sunt illi, quos Thucydides lib. 2. belli Peloponnesiaci scribit omnium quæ antea nouerunt oblitos fuisse, ita ut non solum suos familiares non agnoscerent, sed ne seipsos quidem. Quæ ideo prolixius à nobis commemorata sunt, ut hinc primum discerent huius nostræ artis studiosi, plures esse quàm unum interiores sensus. Neq; enim aliàs imaginatione illaesa amitteretur cogitatio, aut contrā integra cogitatione, imaginatio obliteretur. Deim ut locis horū sensuū instrumenta distare intelligerent, quod scire nō parū in medendo, ut rectē præstidia adhibeantur, prodest. Quum enim imaginatio, quam alij sensum cōmunē appellant, priorē cerebri partē occupet, cogitatio mediā, memoria uerō posteriorē, necesse erit ut medicus pro cuiusq; facultatis abolitione, conuenientibus locis applicet remedia. Cæterum oritur phrēitis ex sanguine exuperante, uel bilioso humore cerebrum, uel eius mēbranas occupante. Quod si bilis ipsa ex qua malū nascitur, perusta fuerit, grauissima ac cæteris omnibus perniciosior phrenitis accidit. Quos phrenitis inuadit, hos febris cōtinua, & amētia infestāt, plurimāq; parte somnus difficilis, & uigilia comitātur. Interdum etiā somnus turbulētus accedit, ut consurgant ægri, exiliāt, furibundē uociferent, uerba sine ordine & sensu effundāt, interrogātibusq; nihil certi, aut maiore cū tumultu aut temeritate respondeāt, præsertim ubi aliquis antea fuerit māsuetus. Nonnunquā occiput dolor infestat. Oculos deniq; habēt cruētos, uehemēterq; squilidos, & sæpè perfricāt: interm aridos, interim lachrymātes. Lingua eorū est aspera,

& ex

ex naribus sanguis destillat. Floccos præterea auellunt, & festucas ex stragulis ac uestibus carpunt. Pulsus ad hæc exiguos, languidos, & quadatenus duros & nervosiores obtinent. Spiratione quoque (ut in pronosticis autor est Hippocrates) rarā habet. Porro quibus sanguineus humor malum fecit, cum risu insaniunt. Quibus uero flaua bilis, ferociter & immaniter sæuiunt, ita ut coerceri nisi uinculis nequeant, omniumque quæ dicunt faciuntque obliuiscuntur, adeo ut laborantes aliqui, quum matellā petunt, meiere tamē negligunt. Aut quum lotium emittunt, matellā ipsam tradere haudquaquam meminerunt. In uictus ratione sic se gerat æger: Decumbat in loco tum aëris, tum luminis temperati, uarijsque picturis carente: in quē amici quidē gratissimi ingrediuntur, qui tamē inopportune non interpellent, & nonnunquā blandē & leniter alloquantur, nonnunquā acerbius increpent. Cibus primum esto ptisanæ cremor, aut alica hordei, aut panis medulla cum aqua mulsa, aut melle rosaceo sæpius lota. Oleribus uestatur, intubus, lactuca & malua elixis, eiusque generis alijs, quæ refrigerare atque humectare possunt. In morbi inclinatione pisces squamosi & saxatiles dari possunt. Mala quoque punica, cerasæque, si multus intus conficiat feruor offerenda. Potus sit cinamomi aut hordei decoctum, cui admixtum sit serapiū uioaceum, rosaceum, aut nymphaeæ, quod nenupharinū hordei barbara uoce appellat. Hæc autē non confertim, hoc est confertim & celeriter, ingurgitata, sed parcius & per interualla exhibenda, quum alias exiguō utatur potu. Hinc est quod rectissime Hippocrates lib. 1. Prænotionū, & lib. 6. Epid. par. 2. aph. 6. βραχυπρότερος nominet. Porro ubi cōcoctionis nota βραχυπρότερος in lotio apparuerint, & febris uēhemētia remiserit, atque uires non satis robustæ fuerint, uinum tenue & aqua dilutum, Vini ὀλίγου ὀλγοφόρου Græci nuncupant, dandum. Quod tutius γοφόρου,

1. Præfag.

27.

Vicius ratio.

Cōfertim

certè sit in ijs qui sani hoc bibere cōsueuerunt, & uentriculū natura imbecillum ac frigidū obtinent. In quiete deniq; ægri quo ad eius fieri licet retineātur: si diuites fuerint, famulorū adminiculo, sin pauperes, uinculis. Nā inordinata motio ui-

Balneum, res cōuellit. Balneum quoq; dulcis aquæ, modò corpus squa-
lidum & aridū sit, cōfert: idq; si tepidum adhibeatur. Neque enim mali quātitas, tantum, quantū ipsa nocet ariditas, ac uigilie immodicæ. Quare cū balneū prædictū humectet & refrigeret, quod alibi abundè demonstrauius: nō solum sic-
citātē, uerumetiā immodicas uigilias mentisq; alienationem unā cum febre profligare potest. Nō est tamē, quod sæpè an-

Animi af-
fectus, tea monuimus, nisi prius uacuato corpore, eo utendum. Præ-
terea suprā modum officiūt phreneticis animi perturbatio-
nes: proinde nihil quod mœstitiam inferat, aut bilē creet, ijs

Curatio, permittendum est. Ceterū quod ad curādī rationē attinet,
si ægri uires non obstiterint, protinus sanguis mittendus erit:

Venæ se-
ctio, quod nō sit aliud salubrius, neq; præsentius auxiliū. Secāda ue-
rò cubiti uena exterior, quā humeralē uocāt, aut, si ea nō ap-
pareat, media, & quātum tulerint uires educēdū. Non tamē
usq; ad animi deliquium, ut nōnulli magno cū errore statuūt:
præstat enim minus auferre quā oportet, propter plurimā
in illis factam ex uehementi motu resolutionem. Prospicien-
dum quoq; diligenter, ne clam brachij uinculum æger soluat,
aut adimat. Postea rectam etiā in fronte uenam incidere lice-
bit. Quod si uerò etas uenæ sectioni obstiterit, tum cucurbi-
tule cum scarificatione occipitio & spinæ adinouendæ erūt.

Cucurbitu-
læ, Quæ hoc etiā nomine conducunt, quod ad cerebrum hu-
morū defluxum in contrarium auellunt. In hunc sanè usum
confert maximè clysterium usus, qui accipiunt: Foliorum
maluæ, uiolarum, intubi satiui angustī folij, lactuæ, singul. m.
1. hordei decorticati ꝯ 1. myxorum (sebesten uocant) numero

11. *seminum cucurbite, melonum, cucumeris, singul. 33. Co-*
quantur in aqua iustæ quātītatis tantisper, donec tertia pars
absumatur, & colo transfundatur. Dein accipiantur iuris
decocti 312. medullæ casia fistularis recens extractæ 31. f.
mellis rosacei 31. olei uiolacei 33. salis 31. f. Cōmixtis omni-
bus, fiat chyster. Si uolueris ut uehementius purget, adijciēda
erit hieræ picræ, aut compositionis è succo rosaceo 36. Ad
humorum à capite auersionē non parum conferunt uincula
extremis corporis partibus iniecta: item pedum frictiones
cum sale & aceto, idq; genus alia. Caput autem rosaceo, uel
oxyrhodino tepidioribus irrigare oportet. Inflāmato enim
cerebro, uel membranis eius frigiditas tuta nō est, sicut neque
uehēmēs caliditas. Siquidē frigiditas meatus cōstringit, neq;
finīt excrementa è capite discuti: at ingens caliditas feruorē
cōgeminat. Aestate itaq; rosaceum exquisitē tepidum adhi-
bendum cum pauco aceto: hyeme autē mediocriter calidum.
In hunc usum etiam adhibere licebit succum solani, plantagi-
nis, aut illarum & similium herbarum stillaticios liquores.
Si passio ipsa uehēmētior fuerit, caput faciemq; assiduē oleo
in quo capita papauerum decocta sunt fovebis. Odorata
quoq; naribus obijciemus, rosas, uiolas, nymphae, flores, ca-
phuram, & eiusmodi. Nares quoq; ipsas intus, aut frontem
succis prædictorum medicamentorum illinemus. Nam sopi-
re ac stupefacere principem facultatem oportet, cerebrum
nimirum, quod supra modum incaluit, refrigerādo. Si uigiliae
quoq; admodum uigent, quæ somnū conciliare possunt, qua-
lia multa supra commemorauimus, non temerē adhibebun-
tur. Inter alia uerò hoc non parum conducet unguentum,
quod recipit: Vnguenti populeon 31. olei uiolacei 33. se-
minis hyoscyami, corticis radicis mādrag. utriusq; 31. opij
gra. 2. croci gra. 3. aceti parū, ceræ albe quod satis est, fiat un-
guen

Vincula.

Frictiones.
Localia.

Somnifera.

Vnguentū.

Embrochatū, quod tēporibus illinatur. Embrocha etiā hęc tepida cāpiti admouenda, quę accipit: Florum uiolarum siccarum, rosarum rubearum, nymphae, singul. m̄. i. f. hordei excorticati 3 1. seminis papaueris albi 3 2. seminis lactuce 3 3. Decoquātur singula in aqua fontana iustę quātitatis ad tertias, fiatq; embrocha. Sub pulumari etiā calices papaueris, aut po-
Discutien- **ma mandragorę** supponenda. Postremum ubi morbus iam
tia, resedit, mitiorq; factus est, id quod tertio die ut plurimum accidere solet, discutientia medicamenta, quę morbi reliquias dissipare possunt, adhibenda. In quę usum iam commemoratam embrocham admo-
 uere licebit, adiectis tamen antea floribus chamęmeli, anethi, meliloti, alibee, & similibus. Sunt qui hoc tempore gallinas, aut catulos per medium fissos non temerē apponant. Alij calidum arietis pulmonē, uel recēs ex animante acceptum, uel aqua feruenti calefactū admo-
 uēat. Porro si diuturnum iam malum fuerit, in oleo serpillum decoquere conuenit. Galenus quoque libro 11. & 13. Ther. method. castoreo utendum esse (phlegmone iam scilicet inclinante) docet: quod nimirum non continuo locis circa cerebrum, sed oñibus interuenientibus occurrat. Inest autem ei medicamento & partium tenuitas, quod ipsum ijs, (quorum per densa propugnaculū transmitti uim oportet) sit accommodum: ut his de causis castoreum phreniticis etiā magno cū fructu adhiberi ualeat. Phrenici ubi sese recolligēt, ebrietatem, ocium, ciborum corruptiones, & in primis solis æstus cauebunt.

De lethargo. Cap. XXI.

Lethargus
quid,

Ληθαργος malum est phrenitidi contrarium, nempe marcor, & inexpugnabilis penē dormiendi necessitas.
Veternus, Aliqui Latine ueternū interpretantur, Hoc uitio correptis,
 omnium

omnium rerum obliuio accidit, ut uerbis nulla suppedietur materia: hinc etiam nomē nactum est λήθη enim obliuio est ἀπὸν uero captura, uel ἀπὸν iners: ut λήθη ἀπὸν nō sit aliud nisi iners obliuio, aut malum obliuionē inducēs. Causa eius est pituita, quæ frigore nimio, ac humore cerebrum imbuunt, et in somnū impellit. Lethargicos comitatur febris lenta, putrescit enim in hoc malo pituitosus humor, Gal. lib. 13. The. meth. teste, cum profunda in somnū delatione. Pulsus ijs magni rariq; sunt, et undosi. Spiratio ipsa nimis rara et imbecillis. Somnolenti præterea sunt perpetuo lethargici, desidiosii, et ignaui. Vix et tarde quocunq; modo interpellentur, respondēt. Oculos quandocūq; ad uociferationem aperiuūt, et denuō claudunt, ad soporemq; reuertuntur. Obliuiosi, et dementes. Oscitant crebrō, et hianti ore aliquādiu persistunt, tanquam claudere id obliti. Sæpē ad meiendum uocati, porrectam matulā manu tenentes, meiere obliuiscuntur. Deiciūt per aluum magna ex parte liquidiora. Nonnullis cōtrā uenter indurescit. Urinā reddunt iumentis similem. Quidā ex eis tremiscunt, et undiq; sudant. Cubile in quo decumbit aeger, splendidū, lucidum, et tepidū sit. Cibi sint attenuantes, incis-
Causa.
Notæ.
Victus ratio,
Curatio.

dentes, exiccantes, qui cōdiantur apio, aniso, cumino, pipere, cinnamomo, garyophyllis, et id genus alijs odoramentis. Ex auiibus aeger uestatur mōtanis auiculis, pullis gallinaceis domesticis, perdicibus, turdis, merulis, et similibus. Oleribus utatur, porro, asparagis, sceniculo, oreoselino, et eiusmodi. Cremore deniq; ptisanæ aut auenæ, uel alicæ cum oxymelite, uel salibus, uel pulegio. Potus sit hydromeli, aut uinum aquosum, tenue et albū subadstringēs. Ceterū si uires permiserint, et nihil aliorū obstiterit, Gal. lib. 13. The. meth. suadēt, sanguinē statim initio mittere expedit. Sin minus, clysteribus acribus aluus eluenda, quorum formulas in capite De apoplexia

- Localia.** plexia reperies. Deim oxyrhodinum capiti admoüendum: repellendus enim à capite humor est, quisquis is fuerit, eodem Galeno teste. In quem usum etiam frictions cum pyrethro, pipere, sale & aceto, ligaturæq; extremitatum conueniunt.
- Excitatoria,** Odoramenta quoq; excitatoria admoüenda, ut est castoreum, funiculus extinctæ lucernæ, pix humida, bitumē, chalbanum, sulphur, sagapenum, cornu ceruinum, abrotanum, & peucedanum, & succus laserpitij. Extrema cruraq; ungere, nō nunquā pilos etiam in ipsis uehementius euellere oportet, quo excitentur. Licebit etiā in aceto thymū, pulegiū, & origanū, aliq; eius generis incoquere, ac naribus agri admoüere: quo uapor ad cerebrum delatus, humorum crassitudinē dissecet. Palatum etiā ualentibus & acribus medicamentis, uerbi gratia, sinapi cum melle, antidoto mithridati, theriaca, & puluere pyrethri, inungendum. Conariq; oportet, pituitam indidem affixam digitis eicere. Ad ijs uerō etiā sternutamentis utemur: Si admiserint, apophlegmatismorum etiā usus erit. Quod si ijs malum non discutitur, caput radendū, deinde fouendum est sale, milio, & similibus in sacculis adhibitis. Ad hæc sinapismo uti in capite prodest, ex caricis & sinapi ex aceto cōtritis (ut in lib. 3. De comp. medic. monstrauimus) cōfecto. Postea cucurbitulas occipiti affigere cū plurimo igne oportet, circa primam & secundam uertebras, partim leues, partim cum scarificatione. Castorium etiā capiti illinendum. Quinetiā id ipsum, quod docet Alexāder Tralianus cap. 20. libri primi, potui dare cum oxymelite expedit. Nam uno hoc medicamento nonnulli miserrimè toto corpore impediti, sanitati sunt restituti. Præterea ad naturæ excretiones frequenter sollicitare oportebit, tum clysteribus tum ijs quæ urinā mouent. Pubem oleo rutaceo, cui sit adiectum paululum castorij, aspergere conuenit. In potu etiam danda, quæ crassi

crassitiem attenuare, & incidere ualent, ut est apij, fœniculi, adianti, & similibum decoctum. Nam ut deglutiant, crebrius admonendi sunt, eiusmodi potiones: ideoq; ut per bombylium ori saltem instillentur, curabimus. In diuturnis lethargis, ubi uires suffecerint, danda hiera est ex colocynthide, sternutamētaq; ex elleboro albo, struthio, pipere, & castorio, aliaq; (quorum paulò suprà facta est mentio) medicamenta admo- uenda. Porro ubi morbus inclinare inceperit, gestatio statim continua utilis est, & balneum, quod supra modum conferre hoc tempore solet. Siquidē Alexander Trallianus refert se cognouisse quendam, qui grauissimo, lethargo laborauerit, adeò ut se leuari non sentiret. Is post duodeuiginti morbi Historia, dies balneum ingressus, tantum sensit auxilij, ut à somno sta- tim expergisceretur, aliosq; attente intelligeret, & ipse uer- ba expedite faceret, familiares omnes agnoscens. Quòd si uerò balnei aestu propter uires imbecillas ferre haud possit, saltem domi in solio aquæ calidæ lauandus erit. Cauendum tamē, ne aqua caput egrotantis perfundatur. Smegmate au- tem mordaciorē in balneo detergendus, ut uini fece usta, si- napi, pyrethro, pipere, lauri baccis, calce uiua, & similibus, quibus duplum nitri addendum.

De caro. Cap. XXII.

Kαρὸς malū est, quod sensuum, uniuersarumq; motio- Caros qd.
num priuatio, spirandi tamen facultate manente illa-
sa, cōsequitur. Arabibus Subet appellatur. Differt à lethar- Subet.
go, Aëtio teste, quia lethargici interrogati respondent, neq;
omnino muti decumbunt. Caro autem laborantes somni qui- Differētia
dem profunditate occupantur: at si stimulantur, etsi sentiant, cari à le-
nihil tamen dicunt, neq; oculos aperiunt. Præterea, ut Paulus thargo.
annotauit, febris carum præcedit, eaq; uehementior: lethar-
gum

gum subsequitur. Item carus alijs symptomatis superuenit: sæpè enim febrium accessionibus, comitialibus, cerebri compressionibus, nunc quidem osse, hoc est calvaria, coarctato, nunc uerò mēbrana anteriore cerebri uentriculū custodiente, compressa. Lethargus autem propriā quandā consistentiam obtinet. Distat etiam ab apoplexia, quòd in hac spiratio uehementer opprimatur, sicut quispiam etiā magno conatu uix spirare possit. In caro autem spirandi facultas, ut testatur Galenus lib. 4. De patient. locis cap. 2. haudquaquam lædatur. Fit caros ab humore frigido, crasso, ac omnino uiscido cerebrū occupante. Signa ex ijs quæ paulò antè cōmemorata sunt, facillè colligi possunt. Siquidē somni profunditate occupantur, oculiq; in hoc malo ppetuò conuiuent. Ceterum uictus ratio & curatio eorum qui caro laborāt, cum lethargicorū planè conuenit, nisi quòd ad maiore incisionem attenuationēq; declinamus. Stomacho etiam cataplasmata & alia medicamēta, quæ calefaciunt, & corroborant, sunt adhibenda, quòd is pituita, quæ illum refrigerat & humectat, refertus sit. Quorū formulas describemus lib. 3. cap. 1. De uentriculi imbecillitate.

De catocha & catalepsi. Cap. XXIII.

Catocha
& Catale-
psis.
Cōgelatio.

KΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ. Græcis occupatio, detētio & deprehensio Latinis dici potest. Recentiores medicina scriptores congelationē nominant. Est autem subita detentio & occupatio, tum mentis, tū corporis sensu ac motu priuati, egro in ea corporis figura permanēte, in qua fuerit correptus, siue sederit, siue iacuerit, siue clausis, siue apertis oculis perstiterit. Quapropter medium quoddā inter phrenitidem & lethargum malum est. Nam magna ex parte à melancholico humore, ut paulò pòst dicemus, euenire solet. Quare ratione frigiditatis cum lethargo conuenit: siccitatis autem

autem ergo, cum phrenitide. Hinc est quòd hoc uitio affecti, neque planè phreniticis assimilantur, neque etiam lethargicis. Accidit hoc malum nonnunquam ob sanguinis copiam, *Causæ,* ut autor est Aëtius, in caput irrumpentem, ipsumq; impletum. Is idem commemorat, se olim hoc malum conspexisse in sanguineo adolescente, qui quum dies tres exegerato neq; cōnuens, neque ad obiectas minas oculis nutans, neque respondens: quarta autem ingenti sanguinis è naribus eruptione facta, protinus omnes turbulentias recepsisse. Fit etiam frequenter, eodem teste, à melancholico, hoc est, frigido & sicco humore, cerebri posteriora potissimum molestante. Inuadit hoc mali hominem subito, qui uoce sensuq; priuatur, nihil audit, nihil respondet, respiratio nulla ferè apparet, sed quasi mortuus decumbit. Pulsus est exiguus, languidus, & uehementer densus. Alius & urina detinentur, aut certè parum reddunt: idq; non siccitatis prorsus ratione, quod æger humido interdum plurimo abundet, sed propter insensibilitatem. Facies aliàs subrubescit, cùm scilicet à sanguine procreatur: aliàs uerò liuet, quando nimirum à melancholico humore malum ortum fuerit. Porro oculi in hoc malo immobiles planè manent ueluti congelati. Differt autem à caro, quia Galeno lib. 4. De patiētibus locis, cap. 2. teste, ut in hoc palpebræ perpetuò clauduntur, sic in catoche interdum apertæ manent. Distat etiam à lethargo, etsi enim utrumque malum fiat à uehementi refrigeratione, tamen in lethargo, ut testatur Galenus libro 2. Aph. comment. 3. refrigeratio immixta est humiditati, in catalepsi uerò siccitati. Viētus ratio pro causarum ratione uariatur. Aeger uerò interim singulis diebus, interim uno interposito nutriri debet. Quare quum passio hæc uehementer sit periculosa, si aut cibo aut potu erretur, operam dabit medicus, ut se in uia

Notæ.

Discrimen
inter catoc-
chen, & cat-
rum.

Viētus ra-
tio.

clue

Etus ratione adhibenda prudenter gerat. Alimenta autē sint ptisana cremor, & huiusmodi. Aqua uerò pota infectissima est: flatum enim auget, fluctuationes cit, lienem attollit, neque sitim restinguit: potus autē sit mulsa, quæ multum bullierit.

Curatio.

Quod ad rationē curādi spectat, si facies rubescit, atque adeo eger sanguine abundare uidetur, & uires ualidæ fuerint cubiti uenā exteriorē secare ne differas. Postea si caput calidius appareat, ea quæ refrigerant adhibebis. In hunc usum papaueris caliculos in oleo decoquere oportet, ac eo caput inungendū. In reliquis, quibus scilicet facies liuescit, primo clysteribus aluus abluenda est ex floribus buglosi, capno, thymo, epithymo, radice polypodij, folliculis senæ, & ijs similibus compositis, quorum formulas infra in cap. De melancholia producemus. Quod si aluus sic nō obediat, ellebori nigri radicē tum quoque incoquere nō alienum erit. Caput autē oleo in quo serpillum coctum fuerit, aut liliaceo, aut anethino, aut simili inungendum. Idque tum potissimum faciendum, ubi caput frigidius esse appareat. Porro si in urina crassities affuerit, dandum etiā anethi, apij, calaminthæ, & aliorum quibus extenuandi facultas inest decoctum. Reliqua quæ ad curādi rationem necessaria sunt, partim ex capite De phrenitide, partim ex eo quod De melacholia inscribemus, partim etiam ex eo quod De lethargo est inscriptum, petenda erunt.

De comate. Cap. XXIIII.

κῶμα,
sopor.

Kῶμα malū est, quod Latinis sopor, aut grauis & profundus somnus dici potest. Significat autem coma non simpliciter longum somnum, quod nonnulli putauerunt, sed

Galeno libro 1. Aphorif. comment. & lib. 3. Epid. commēt. 3. κῶμα sim autore, δ' υἱὸς δ' ἑγ' ἑρ' οὖν, hoc est, eū à quo quis egre & displiciter. ficulter excitatur. Quare κῶμα simpliciter, & sine alicuius adiectio

adiectione, uel etiam cum adiectione illa ὁπώστες κώμα, eodē Galeno lib. 5. Epid. cōment. 1. autore, est malum, in quo ægri uigilare nequeūt, nec apertos habent oculos, sed conuiuentes, altoq; somno detinentur. Cum hac uerò adiectione ἀγρυπνοῦ κώμα, hoc est, uigilās sopor, Galeno comment. 3. κώμα 2. libri tertij Epid. teste, est malum in quo ægri apertis oculis ἀγρυπνοῦ uigilare nō ualent, sed cōniuent spe somni conciliandi, & uigiles tamē manēt. Hinc ut coma soporiferum à comate uigilante discernamus, necessarium erit. Coma soporiferū, ut te- Causa.
stis est Galenus cōment. primo libri 3. Epid. fit interdum, ubi cerebrum multum irrigatur, ut nonnullis usu uenit ebrijs. In febribus etiā soli uapores calidi & humidi à partibus inferioribus sursum elati cerebrum irrigantes, malum hoc inducunt. Subinde etiā ob solum frigus, quod primum sensitium, hoc est, cerebrum occupat. Est cum ambobus iam dictis, hoc est frigiditati & humiditati succedat somnus grauis & profundus. Vigilans autē coma à pituita cum bile commixta nascitur, magnaq; ex parte propter uirium fit imbecillitatem adeo iam emortuarū, ut apertas palpebras seruare haud ualeāt. Aegri in soporifero comate, Aëtio teste, demissa inferio- Nota.
ri mandibula obdormiūt, ac quoties excitantur, nouo repēte somno capiuntur. In uigilante autē enormia loquūtur, totoq; corpore incompósito iacēt, & partim ea quæ in phrenitide, partim etiā ea quæ in lethargo apparēt signa adsunt. Curā- Curatio.
di ratio iuxta duplex coma uariatur. In soporifero enim eadē quæ in caro & lethargo adhibētur remedia, atq; ut summam dicā, post uniuersi corporis uacuationē, pro frigiditatis aut humiditatis ratione, calefactio uel siccitas intendēda est. In uigilante partim phrenitidis, partim etiā lethargi remedia locū habebūt. Vtrū autē aliud superare debeat, ex humore exuperatē cognoscitur. Si enim pituita superauerit bilem,

f

magis

magis ad lethargi remedia declinandum erit. Sin contrà bilis pituitam uicerit, magis ad phrenitidis præsidia nos conuertemus. Quare auxilia quæ ad comatis curationē sunt necessaria, è capitibus de Phrenitide & Lethargo petenda erunt.

Glandes. Glandes autem potissimum in hoc mali genere conferent sedi suppositæ, quòd irritando efficaces admodum sint.

De memoria abolita. Cap. XXV.

Memoriæ abolitio partim per se, partim etià cum quadam rationis noxa accidit: quemadmodum & rationis noxa per se prius incipit, deinde memoriæ insequitur. Cōtingit autem utranq; pati nonnunquam actionem. Abolentur ambæ in lethargis, cæterisq; soporiferis morbis. Fit etiam, ut prædictis iam solutis obliuio succedat. Quod ubi acciderit, tum frigida omnino intemperies in causa erit, quòd uel perijt, uel grauiter læsa est memoria. Hæc nonnunquam humiditati, nonnunquam etiam siccitati iuncta est. Interdum autem unaquæque prædictarum per se causa mali esse potest.

Causæ. Quapropter causæ diligenter à medico discernendæ sunt. Si itaq; sola intemperies sicca posteriorē cerebri partem perimaciter obsidens causa mali fuerit, uigiliæ frequentes instabunt. Sin humida tantum, torpores, & in somnū propensiones, somnosq; longos & graues efficiet. Si uerò humiditati frigiditas etià accesserit, caros, & lethargos creabit. Eorū itaq; quorū memoria perijt, somnos obseruare oportet, utrū scilicet uehemēter an modicè somnolenti sint, aut omnino nō somnolenti. Sic enim uincētē inuenies intemperiem. Præterea considerandum est, utrum excernāt quippiam ex naribus, uel ab ore quod à capite defluat, ut monet Galenus lib. 3. De patient. locis cap. 5. an aridæ huiusmodi partes sint, quippe ex ijs affectum ipsum coniectura consequi poterimus.

Victus. ratio

ratio pro causarum uarietate mutatur ut ex ijs quæ paulò post dicemus, manifestum fiet. His in eum modum definitis, facile curandi ratio præscribi potest. Nam si propter uehe-
 mentes purgationes, cæterasq; immoderatas inanitiones, aut syncopas, atq; adeò siccitate memoriæ noxa superuenerit, nulla alia re addita, uictu tantum reficiente succurrere oportet. Curatio,
 Corroborato enim corpore, collectisq; uiribus, memoria reparatur. Quæ autè ad eam uictus rationē necessaria sunt, ex capite de hæctica febre petent studiosi. Si ob extremam senectam memoria pereat, frustra laborādū, admotis scilicet remedijs, non est: sed tantum cōueniente uictus ratione contentos esse oportet. Verū si repēte memoria defecerit, cæteris partibus incolumibus, epilepsiā, aut neruorū resolutionē, aut apoplexiā uereri oportet. Quare tum omni studio ac diligētia providēdum erit, ne tale aliquod accadat, quod futurū suspicamur. Quibus enim præsidijs factum morbū repellimus, ijsdē futurum arcebitur. Quòd si uerò ex alijs morbis, ut lethargo & pestilētia, memoria pereat, tum strenuè remedijs contrā eundem. Pestilentia autē sequi memoriæ abolitionem, suprà cap. 20. ex Thucydidis historia, quam refert Galenus in libro De sympt. differentijs, ostendimus. Summa uerò curationis in calefaciēdo cōsistit, si à frigida planè cerebri intemperie malum ortum fuerit. Calefactoria itaq; medicamenta tam extra, quàm intra corpus adhibēda. Extrinsecus autē inunctiones capiti ex oleo calido, idq; æstate, adhibendæ. Hyeme uerò irinum cum aceto acriori, interdum serpilli, calamento, & ijs similibus in eo decoctis. Quidam etiā adijciunt piper, & lauri baccas. Vtile & castoreum cum oleo occipiti illitum. Confert etiā hoc unguentum, quod accipit: Olei è lateribus, de castoreo, utriusq; ʒ ʒ. radicis acori, ph., utriusque ʒ 1. pyrethri, rutæ, utriusque ʒ ʒ. Cum cera quod

satis est, fiat unguentum, quo rasum occipitium inungatur, & subinde sacculus imponatur, qui accipit: Florū rosmarini, melissophylli, lauandule, singul. m̄. f. florum sambuci m̄. i. stichadis 3. nucis moschatae, ligni aloës, maceris, singul. ʒ. i. Cōtusa in sericū dimittātur, formeturq; sacculus. Eius farina medicamēta cōplura è superioribus capitibus petēda erunt. Intrinsecus autē acorus cōditus, saccharū florum betonicae, rosmarini, lauandule, spicae nardi, melissophylli, adiectis pipere, gariophyllis, cinnamomo, & id genus alijs odoramentis. Si uerò à frigidityte et humiditate memoriæ abolitio fiat, hiera picra exhibenda, quæ uacuādo nihil utile secum trahit, sed id tantum quod molestū est, educit. Deīn apophlegmatismi, sternutamenta, & reliqua quæ caput per os & nares purgant admouēda. Simapismus quoq; capiti utiliter applicatur.

Vicius ratio.

Quod ad uictus rationē attinet, alimēta sint quæ calefaciēdi exiccandiq; uim obtineāt. Ab infrigiditytibus omnibus abstinēdū erit, & okribus & fructibus bellarijs, caseo, & lacte, alijsq; quæ flatu gignere possūt, crassioris succi ac humectantibus alimētis. Acrora uerò ex interuallis alimēta offerēda, ut sunt origanum, thymbra, quā satureiā uocant, pulegiū, & eiusmodi. Cauere autem oportet in uniuersum cruditates tanquā rationi infestissimas. Dādum egrotantibus uinum tenue, album, & ualde antiquum: sua enim moderata caliditate cum alia non pauca efficiat, animam etiā tranquillam, festiuamq; reddit, consonos illi motus præbendo. Plurima uerò aque, multoq; magis uini potio pessima est, uehemēter enim humectat caput, ac nihil æquē obliuionē inducit quā humiditas. Somnus sit tēperatus, citra sacietatē. Veneris usus rarissimus: neq; enim totius corporis sanitati, neq; rationis actioni, si immoderata fuerit, cōfert. Balneo etiam, potissimū à sinapismis, locus erit. Hæc procuranda abolita memoria sufficiunt.

ciunt in presentia. Alia enim quæ requiri possunt, ex superioribus petenda erunt.

De apoplexia. Cap. XXVI.

Apoplexia est, ubi patiente cōmuni neruorū principio, ^{Apoplexia quid.} subito omnes corporis particule motum simul & sensum amiserunt. Vel est priuatio sensus & motus in uniuerso corpore, cum functionum à uoluntatis imperio prodeuntium lesione subito superueniēs. Si in altera duntaxat parte obstructio fuerit ^{ἡμιπληγία καὶ παράλυσις} Græcis, resolutio ^{* ἡμιπληγία} Latinis dicitur, ut cap. sequenti clarius docebimus. Fit à pituitoso, hoc est, frigido, crasso lentoq; humore, uentriculos cerebri principalissimos una uice & cumulatim replente, quæ nimie cruditates, crebræq; potissimum ebrietates procreāt. Cōtingit etiā ob casum, aut ictus cerebrū cōcutiētes, atq; ut illuc humores cōfluāt efficientes. Aëris quoq; admodum frigidi occurssu, qui cerebri humiditates & excrementa coarctat, & cōstringit. Præcedit hoc malum capitis cōfertus & acutus dolor, & iugularium uenarum elatio, uertigo, oculorum splendores, & extremarū partium sine ratione refrigeratio, totius corporis palpitatio, difficilis motus, & dentium inter dormiēdum stridores: urinā emittunt æruginosam, nigram, paucā, & farinaceū sedimētum habentē. Qui autē in hanc passionē incidunt, sensu omnino carentes, mortui uiuūt. Quapropter clausis oculis instar dormientium decumbunt. ^{Apoplexie magnitudo} atq; stertūt. Discernitur uerò passionis magnitudo ex noxæ, quam spirationi infert, uehementia. Vbi enim naturalē ordinem, plurimū egre ditur, magnā: ubi autē paulum impedi-
menti est paruam in cerebro noxam esse conijcere oportet. Omnium uerò pessima spiratio putanda est, quæ intermittitur, & magna cum uiolētia trahitur. Id genus passionis senes

Quos potissimum occurrerit,

maximè qui temperatura sunt pituitosiores, & qui simili usi sunt uictu ratione, occupat. At si in iuuetute atq; æstiuo tēpo
 Curatio. re aliquē inuaserit, uehementē necessitatē portendit. Malum hoc nequaquam, aut rarò curatur, neq; enim temere ab Hip-
 2. Aph. 42. pocrate est dictum: Apoplexiā uehementē soluere impossi-
 bile, debilem uerò non facile. Mortem enim minatur celerē.
 Qui eius periculum effugerint, in diuturnā subinde passio-
 nē incidere solēt, aut quibusdā mēbris, aut uniuerso corpore
 Venæ se- resoluti, sēpē etiā ratione uiolata. Qui igitur quoquo modo
 curatio. curationē recipiunt, ijs statim sanguis, ex utrisq; humerarijs,
 modo plenitudo adsit, uiriumq; robur, detrahendus est. Præ-
 Clyster a- terea alius clysteribus acribus ducēdus est, qualis est qui ac-
 crisi. cipit: Saluæ, origani, betonicæ, rutæ, singul. m̄. i. calamenti, hyssopi, pulegij, singul. m̄. f. seminum sceniculi, seseleos (siler montanū nominant) ammi, singul. 3 3. centaury minoris m̄. i. radidis polypodij 3 6. agarici optimi 3 3. medullæ collocynthidis 3 2. Decoquātur in aqua iustæ quātitatis, donec dimidium eius absumatur. Dein recipiātur iuris decocti 3 15. hie-
 ræ picæ, benedictæ laxatiuæ, utriusq; 3 6. compositionis indi 3 3. diaphœnicôn 3 2. mellis rosacei colo transfusi 3 1. f. oleo-
 rum laurini, rutacei, de castoreo, singul. 3 1. salis fossilis saxei (gemme hodie uocant) 3 1. f. Commixtus omnibus, fiat chy-
 ster. Commendatur etiā mirificè usus glandium, quæ ex colo-
 Glandes, cynthide, agarico, elleboro nigro, & similibus cōficiuntur, ut sunt eiusmodi, quæ accipiunt: Mellis cocti & concreti 3 2. colocynthidis, agarici, ellebori, singul. 3 2. salis fossilis saxei 3 1. Redactis ijs omnibus in puluere, cum melle miscē-
 tur, & formentur glandes longitudine sex digitorum, filo appenso, ut pro arbitrio extrahi queant. Post hæc totum corpus oleo copioso calido, cui prius serpillum, calamintum, anethum, aut simile aliquod incoctum fuerit iungendum.

Extre

Extremis etiam corporis partibus ligaturæ, & frictiones Reuulsio,
 uehementes, cum decocto radicis iridis, adhibendæ. Cucur-
 bitulæ quoque humeris affigendæ. Caput denique prius ra-
 sum irrigandum oleo chamæmelino, anethino, rutaceo, aut
 eo in quo prius illa, quæ paulò antè commemorata sunt, de-
 cocta fuerint. Naribus admouenda ea quæ odore suo exci- Odorame
 tare egrotantes solent, uti est opopanax, castoreum, saga- ta.
 penum, galbanumq;. Sternutamentorum quoque ratio ha- Sternuta-
 benda erit, quæ ex struthio, elleboro albo, castoreo, & alijs menta.
 quæ in superioribus dicta sunt, constant. Embrocharum etiã Embroche
 usus conueniet è chamæmeli, meliloti, saluia, pulegij, maio-
 ranæ, origani, calaminthæ, & satureiæ decocto paratarum.
 Præstat tamen siccis uti medicamentis, cuiusmodi sunt sin- Sinapismus
 pismi, qui à nostris hodie emplastra rubificantia uocantur,
 qualis est qui accipit: Olei costini ʒ 1. olei è castoreo & eu-
 phorbio, utriusq; ʒ 3. sinapis ʒ 2. castorei ʒ 1. sagapeni ʒ 1. f.
 euphorbij ʒ 1. aceti ʒ 2. Cum cera quod satis est, ad emplā-
 stri consistentiam coëant. Sartago præterea, Raze autore,
 calefacienda, & capiti calida admouenda. Oportet etiam ori Vomitūs,
 uī aperto digitum uel pennam oleo irino madefactam in-
 ferere, ut ea quæ insunt eijciantur. Porro sedes quoq; ijs me-
 dicamentis quæ flatu educunt, ruta, cumino, nitro, & mel- Vidus.
 le illinenda. Vbi passio remiserit, cibus mollis, distribui faci-
 lis, & succulentus, adiecto serè semper melle, assumendus. Si
 uox nondum redit, & uires permittunt, cucurbitulæ occipiti
 cum scarificatione affigantur. Si fieri possit, etiam hypo-
 chondrijs. Aegri dem uehantur curru, aut lectica, aut pensili
 lecto gestentur. Potus sit mulsa, siue oxymel. Caueant sibi à
 uini potione. Post 21. diem, ægroti balneo credantur. Verū
 de medicamentis, quæ ad reliquam curandi rationem requi-
 runtur, sequenti capite copiosè dicemus.

De resolutione alterius lateris.

Cap. XXVII.

Resolutio.

Π Αράλυσις ἢ πᾶρεσις, quæ Latinis resolutio dicitur, Galeno lib. 3. De patiēt. locis. cap. 10. autore, est, ubi alterum duntaxat latus aut dextrū aut sinistrum, sensum simul ac motum amittit. Interdum etiā in una aliqua tantum. parte (uerbi gratia) manu crure, lingua, accidit. Animaduertēdū autē hoc loco erit, quod resolutio ea quæ sequitur apoplexiam, ut testatur Gale. lib. 4. Vict. acut. cōment. 13. priuatim

πᾶραπληγία.

Græcis πᾶραπληγία nominatur. Proinde paralyxis nomen generalius est quā paraplegia, quod hæc solam eam, ut dictum est, quæ ex apoplexia fit: illa uerò omnem resolutionem ex quacūq; occasione ortam significet. Caterū quum per resolutionem interdum sensus tantum, interdum motus, nonnunquā ambo pereant: neruorum resolutio potissimum dicitur, ubi motus deperditus est. Cur autē nunc dūtaxat sensus, nunc motus tantum, iam uerò uter que simul amittantur, Gale. lib. 1. De sympt. causis cap. 4. copiosissimè explicat, ut nō sit opus hæc à nobis commemorare. Generatur quidē à multis crassis et lentis humoribus neruos obstruentibus, qui ne animalis facultas à principe parte ad membra delabatur, impediunt. Hac sanè ratione refrigeratio ex niue, compressioq; neruorum corporum, resolutionē efficere possunt. Ad eius passionis dignotionē multis indicijs minimè opus est: nemo enim non uidet eam partē quæ motu destituta est, resolutione affectam esse. A qua uerò causa acciderit, partim ex agri relatione, partim etiam ex notis suprā de dolore capitis è pituitosis humoribus orto commemoratis, deprehendere licebit. Victus ratio in uniuersum attenuatoria et siccans esse debet. Versetur itaq; ager in aere calido et sicco, primisq; tribus diebus tenuissimo utatur victu, hoc est, omnimodam

Cause.

Notæ.

Victus.

Aer.

susti

sustineat in ediam, aut solius melicrati usu, aut paucop-
 tisane succo contentus sit. Deinde cibi boni succi, & concocti fa-
 ciles, assiq; exhibendi, montanarum præcipuè auium, & per-
 dicum carnes, oua sorbilia, amygdalæ & pineæ. Inter olera
 utatur ager foeniculo, oreoselino, hyssopo, maiorana, salvia,
 & satureia. Vitet pisces fructus, & omnia frigida humidaq;
 Potus sit exiguus, sitimq; quàm potest maximâ sustineat. Bi-
 bat mulsam, cui salvia, aut cinnamomû incoctû aut admixtû
 sit. Vel utatur potu, qui hodie à barbaris medicis Hippocras
 nominatur, qui accipit: cinnamomi. selecti ʒ 2. zingiberis ʒ ʒ.
 piperis longi, granorum paradisi, acori, (quæ hodie galangâ
 maiore appellât) singul. ʒ 1. cardamomi ʒ 1. & nucis moscha-
 te, garyophyllorum, maceris, singul. ʒ 1. decoquatur in aquæ
 fontanæ lib. 6. donec quarta pars, hoc est, lib. 1. & absumatur.
 Ius decocti refrigeratû colo transfundatur, diligenter ijs quæ
 decocta fuerût expressis, & cum sacchari lib. ʒ. huic dulcedo
 cõcilietur, fiatq; potus. Vino nõ licebit uti, donec malum to-
 tum deficiat. Aut si difficulter tanto tempore à uini potione
 æceri potest ager, detur qdẽ, at nõ nisi modicû, aquosumq;
 & in morbi inclinatione. Motus atque exercitium, si illis uti
 cõceditur, summè cõducunt. Somnû fugiat diurnum. Noctur-
 nus uerò sit mediocris. Gaudeat, & animi perturbationes
 fugiat. Curandi ratio si permiserit ætas, habitus corporis, Curatio,
 anni tempus, & similia, à sanguinis missione aspicienda, po-
 tissimum ubi plenitudinis indicia adfuerint. Oportet tamen Venæ sec-
 tractionem esse moderatam ne corpus refrigeretur, san-
 ctio.
 guisq; à lateribus incolumioribus auferendus. Deinde aliquot Clyster,
 diebus à sanguinis missione transactis, aliis clysteribus irri-
 tanda erit, quorû hæc formula, quæ accipit: Maluæ, altheæ,
 mercurialis, chamæmeli, saluiæ, betonicæ, singul. m. 1. sticha-
 dis ʒ ʒ. rutæ, calaminthæ, utriusque m. ʒ. seminum fœniculi,
 f 5 ammeos,

ammeos, utriusque drach. 2. Decoquantur in aqua, quoad tertia pars absumatur. Deim accipiatur iuris decocti lib. 1. benedictæ laxatiuæ ʒ ʒ. compositionis indi drach. 3. mellis rosacei ʒ ʒ. oleorum laurini, irini, rutacei, singulorū ʒ 1. salis fossilis saxei ʒ 1. Cōmixtis omnibus fiat clyster. Post hæc decocta & serapia pituitosos humores extenuantia, atque expulsiōi idoneos reddentia exhibebis, quorum formulas suprà capite duodecimo recensuimus. Quibus peractis, quæ humores molestantes euacuare possunt medicamenta bibenda propinabimus. Sunt autē præter ea quæ capite iam citato commemorauimus, pilulæ azaieret, arabicæ, foetidæ, quibus nunquā non agaricum admiscendum erit. Neq; semel tantum purgandi sunt ægri, sed sæpius, quatuor uel quinq; semp interpositis diebus. Atq; initio leuius, dein uerò fortius medicamentum exhibendū. Quid multa? paulatim à leuioribus ad uehementiora progrediendū. Sequenti à purgatione die, theriaca, & Mithridati antidotus magna cum utilitate exhibetur.

Purgato iam uniuerso corpore, sternutamentis, apophlegmatismis, gargarismis, odoramentis, & alijs quæ in cap. 12. cōmemorauimus, utēdū. Capiti deniq; unde totius morbi radix exoritur, calida medicamenta illinenda, castoreum nimirum, peucedani radix, menta, bacca lauri, irino oleo, cui parum aceti adiectum sit, incocta. Quare si aëris ambiētis frigiditas haud impederit, caput radendum, totumq; ad frontem usque inungendum. Præterea medicamenta etiam quibus discutiēdi inest facultas, ijs locis unde nerui qui ad latus affectū, sensum aut motum, aut utrunque deferentes oriuntur, admouenda erunt. Id quod Galenus lib. 3. De patientibus locis, cap. 10. Pausaniæ sophistæ exemplo luculenter ostendit. Verū à leuioribus semper auspiciandum, nimirum oleis chamæmelino, anethimo, è spica, liliaceo, & irino: quibus latus quoq; resolutum

Purgantia
medicamenta,

Capitis
purgatio.

Discutiētia

lutum fouebimus. Quod etiā hoc nomine, nempe ut calefiat, linteis, aut pelle uulpina, & similibus operiemus: aut decocto saluæ, maioranæ, chamæmeli, hyperici, stichadis, & rosmarini fouebimus. Deinde ad ualentiora progrediendum, oleum nimirum costinū, uulpinum, rutaceum, laurinū, è uermibus, de castoreo, è lateribus, quod philosophorum etiam hodie nominant, & de euphorbio. His adiiciuntur nonnunquā unguenta aregon, agrippæ, martianum, & alia medicamenta simplicia calefacientia, ut est betonica, saluia, rosmarinus, radix acori, uerbasculum odoratū (herbam paralyfis hodie uocant) ruta, calamintha, pyrethrum, piper, castoreum, & euphorbium. Atq; in eum aut simile modum paratur unguentū, quod accipit: Vnguentorum aregon, martiani, utriusque 3 1. Vnguentū, unguenti agrippæ 3 1. oleorum costini, uulpini, utriusq; 3 5. olei de uermibus 3 1. olei è castoreo 3 1. f. pulueris betonicæ, piperis, saluæ, singul. 3 1. castorei, euphorbij, utriusq; 3 1. Radicis acori 3 1. Cera quod satis est, fiat unguentum, Vel tale, quod recipit: Oleorum costini 3 2. de piperibus 3 1. f. olei Aliud, de euphorbio 3 2. uini (ut uocant) sublimati, aut aquæ uitæ 3 2. f. succorum saluæ, uerbasculi odorati, utriusq; 3 1. f. radicis acori, seu galangæ maioris 3 3. stichadis, rosmarini, utriusq; 3 2. radicis pyrethri, piperis, utriusq; 3 1. euphorbij 3 1. Tusa decoquantur, donec uinum & succi absumentur: dein exprimātur olea, & adiecta cera quātum satis erit fingatur unguentum liquidū, & molle in star linimēti. Ad illorū Ceratum, exemplum componere licebit cerata, in hunc aut simile modum, quæ accipiūt: Baccarum lauri, pyrethri, piperis, singul. 3 2. radicis acori ueri (nam eum semper hoc nomine intelligimus, nō autem uulgarem) 3 1. stichadis, betonicæ, sambuci, singul. 3 1. f. sinapi, nigellæ, utriusque 3 1. euphorbij, castorei, utriusq; 3 1. olei costini 3 1. f. olei de piperibus 3 1. olei de euphorbio

Cucurbitu
12.
Balneum.

phorbio 33. cum cera & resina terebinthina quod satis est, fiat ceratum. Porro membris patientibus cucurbitule sunt admouendæ leues, & citra scarificationem, ut ad ea sanguinem, atque adeò calorem & spiritum trahant. Quòd si imponendis cucurbitulis minus apta fuerint, uicinis saltem applicentur. Post cucurbitulas prædictis unguentis & ceratis, ita tamen, ut prius laborantia mēbra fricentur, utendū. Neque parum conducet laconicum, aut si haberi possint balneæ per se natæ (thermas hodie uocant) sulphureæ, aluminosæ, & sulfuginosæ, quales sunt in Germania nostra Badeniæ, Ferrinæ, iuxta Martianam syluam, & Cellenses, ut in nostra Compendiaria ratione perueniendi ad solidam medicinam copiosè diximus. Præstat tamen ut gestationes in curru, uehiculo, aut lectica præcedant. Hæc pro curatione resolutionis alterius lateris sufficere arbitramur.

De resolutione, quæ vnā aliquam tantum partem obsedit.

Cap. XXVIII.

* $\omega\omega\sigma\mu\omega\varsigma$ $\kappa\upsilon\upsilon\iota\kappa\omicron\varsigma$
Tortura
Oris,

ET si quiuis peritus artis facillè ex ijs quæ diximus superiori capite, eam etiam resolutionem quæ in una aliqua duntaxat parte accidit curare queat: tamen ne imperitiores aliquid desideret, breuiter etiam quarundā partium curationes trademus, auspiciati à spasmo cynico. Est autem $\kappa\upsilon\upsilon\iota\kappa\omicron\varsigma$ $\omega\omega\sigma\mu\omega\varsigma$ musculorum mandibulariorum resolutio, in qua os & nares, atq; omnino media faciei pars in obliquum declinant. Qui hodie faciliant medicinam, Torturam oris uocāt. Huic quidem cum resolutione quam præcedenti capite tractauimus curatio communis est. Nam & sanguinis missio, si nihil impediatur, & purgatio, & chysteres, linimenta, & alia quæ ibidem produximus medicamenta conducunt. Quæ tamē pecu

peculiariter ad hanc pertinet, est sanguinis à uenis sub lingua
 missio, cucurbitule primæ & secundæ uertebræ affixæ, et
 rhina, & apophlegmatismi, quorum hæc sit formula, quæ
 accipit: Seminis staphydis agriæ, mastiches, radices pyrethri, Apophleg
matismus.
 utriusq; 3 1. hyssopi, origani, utriusque 3 1. f. sinapi 3 2. Trita
 excipiantur terebinthina resina, & cera adhibita fiant pa-
 stilli mansiles. Porro ligatura quæ in oppositum ueluti capi-
 strum aliquod partem resolutam trahit, ad moueri debet. In
 hunc usum etiã conducit crebro specula intueri, quo uidentes
 faciei torturam ægri, eam corrigere summo annitantur stu-
 dio. Parti autem patienti, hoc est, neruis à tertio pari ortis,
 medicamenta quæ in præcedenti capite sunt cõmemorata, im-
 ponenda erunt. Sciendum tamẽ hoc loco erit, non eam maxil-
 lam quæ peruersa esse apparet, sed oppositã resolutione in-
 festari. Vbi lingua fuerit resoluta, uniuerso corpore prius ua-
 cuato, uenas sub ipsa existentes incidere oportet, & cucur- Lingux re
solutæ cu-
ratio.
 bitulam mento ad mouere. Apophlegmatismis quoq; & col-
 lutionibus ex sinapi & similibus utendũ. Exercitia deniq; lin-
 guæ nõ negligẽda, occipitiq; & ceruici uniuersæ acria unguẽ
 ta & linimẽta illinẽda. Cerata quoq; & sinapismos impone-
 re nõ negliget medicus. Vesica resoluta, siue urina detineatur, Vesicæ re-
solutæ cu-
ratio.
 siue præter uoluntatem excernatur, imo uentri & interfoe-
 mineo medicamenta communia applicanda sunt. Sedi immit-
 tendum oleum rutaceum, nardinum, è spica, aut oleum in quo
 eryngij radix, ruta, aut cuminũ, aut anethum, aut simile ali-
 quid decoctum fuerit. Vtiliter etiam ijs butyrum, castoreũ,
 galbanum, uel opopanax admiscebis. Vesicæ quoque hæc
 per colem transmissa ualde profecerunt, uel sola etiam suffe-
 cerunt. In primis itaq; qui nihil urinae reddunt, per urinariã
 fistulam (quã cathetera uocant) urina elicienda erit: dein me-
 dicamenta quæ modò diximus, in uesicam per angustissimũ
 tubũ

94. DE MEDENDIS MORB.

tubulū paruo utri insertū, ut catheteri apte coherere queat, infundenda. Dictū enim mirabile est, quanta ex huiusmodi iniectionibus post urinae excretionem sequatur utilitas. Bene faciunt etiam medicamenta urinam cientia potui data, consimiliter castoreum. Præterea laxantibus insidebunt ægri, & Colis resoluti cura- cataplasmata inde conficiemus. Cole resolutio seminis, non tio, urina, excretio, & cōcubitus impeditur. Oportet igitur iisdem præsidijs (quæ in uesticæ resolutione commemorauimus) uti. Priuatim autem lumbis & coxarū uertebri calefactoria adhibenda, & ea quæ uirgam intendere ualent, de quibus suo dicemus loco, usurpanda medicamenta. Præter reliqua uerò, Aëtio autore, cerui pudendum scemori tanquam cingulū illigatum, eiusdemq; carnes comestæ, & ex auibis sturni, sic affectis plurimum cōducunt. Castoreum autem tum huic, tum alijs omnibus resolutionibus efficacissimè accommodatur. Vitare autem præcipue oportet sic laborantes, cibos & potus refrigerantes. Harum partium exemplo facile reliquas etiam curabit peritus medicus.

De epilepsia. Cap. XXIX.

Epilepsia, **E**pilepsia nihil aliud est Grecis, Galeno lib. 3. De patiē-
tibus locis cap. 5. teste, quàm cōuulsio uniuersarum cor-
poris partiū, nō perpetua, sed quæ ex temporū accidit inter-
uallis, cum mētis & sensuum oblesione. Sic autem dicta est,
Comitialis quòd sensum capitis, atq; mentem pariter apprehendat. La-
palsio, tini hoc malum comitiale nominauerūt, quòd co laborātes,
in comitijs manifestabantur, comitiāq; quo die aliquis concis-
diffset, interrumpebātur. Tres sunt eius mali differentie: quas
Tres epilepsie diffe- ubi cōmemorauerimus, causas simul explicabimus. Gignitur
rentie, enim primū hoc malum, ubi cerebrum primogenia passione
Causæ, laborat: id quod acidit si crassus lentusq; pituita, uel atræ
bilis

bilis humor spiritus meatum in cerebri uentriculis obstru-
 xerit, neruorum principio seipsum quatiente, quo id quod no-
 xium est excutiat. A crasso autem humore hoc malū induci,
 argumēto est, quod subito fit, & confestim soluitur. Secundò
 fit propter consensum oris uentriculi male affecti, quum sci-
 licet cerebrum excutere nititur, quicquid à uētriculo sursum
 fertur. Sic Galenus lib. 5. De patient. locis, Grammaticum
 quendam iuuenem fuisse tradit, qui quoties uel uehementius
 doceret, aut cogitaret, aut mediā sustineret, aut irasceretur,
 comitali passione corripiebatur: idq; non alia ratione, quā
 quod os uentriculi, utpote quod exquisito sensu präditum
 erat, primaria ratione pateretur, ac deinde per consensum
 ipsum quoq; cerebrum, ut nihil mirū sit totius corporis con-
 uulsionem postea cōsecutam esse. Tertiò accidit epilepsia, at-
 rarò admodum, cum à parte aliqua ueluti quēdam frigida
 aura, agro idipsum etiam sentiente, ad cerebrum usq; ascēdit.
 Hoc genus passionis comitalis, Galenus lib. 3. De patientibus
 locis cap. 7. scribit se uidisse in puero, qui decimum tertium
 etatis annum agebat. Quum enim is adolescens etiamdum,
 cum optimis eius tempestatis medicis conuenisset ad idoneā
 inueniendam curationem, audiuit tum narrante puero, ma-
 lum ipsum à crure initium capere, mox illinc rectā ascēdere
 per fœmur, & imminentes illi lumbos, ac per latera ad cer-
 uicem, donec ad cerebrum perueniret: quod cum primum
 tangeret, ipsum haud quaquam sibi constare. Præcedit hoc Notæ.
 malum corporis animiq; status minimè uoluntarius, tristi-
 tia, eorum quæ perceperunt obliuio, turbulenta somniorum
 imagines, capitis dolor, eiusq; plenitudo continua, in ira-
 cundia potissimum, pallor faciei, & lingue inordinatus mo-
 tus. Nonnulli uerò eam mordent. Quamprimum autem in-
 uaserit malum, ægri concidunt, conuelunturq; , stertunt,
 ac inter-

ac interdum uociferantur. Nonnulli tremunt, atq; circūagū-
 tur. Sed peculiaris admodum nota mali est, oris spuma. Non
 desunt, quibus etiā urina & stercus præter uoluntatem ex-
 cernitur, nonnullis genitura. Quibus ab ore uentriculi uitiū
 oritur, palpitatio ipsius præcedit, turbatio, & erosio, & ex
 media, aut cibo tardius sumpto affligūtur. Corripit hoc pas-
 sionis genus maximè pueros, eosq; adhuc paruulos: quod ui-
 delicet humidioris cerebri temperamento præditi sint, qua de
 causa *παιδικός*, hoc est, infantilis seu puerilis nominatur,
 Deinde adolefcētes, & ætate cōsistentes, minimè uerò senes
 & decrepitos. In quibus acutissimum est malum, statim iu-
 gulat, & crebris accessionibus, & symptomatum uehemen-
 tia. Plerisq; diuturna esse solet. Proinde si non pubertate, uel
 menstruorum initio, uel dum uterū ferūt solutus fuerit, sæpè
 usq; ad mortis diem prorogatur, nisi congruā medici cura-
 tionē fuerit affecuta. Id quod Hippocrates etiā testatur, qui
 sic scriptum reliquit. Quibuscūq; passiones comitiales fiunt,
 ante pubertatem mutationem accipiunt: quibuscunq; autem
 uigesimo quinto, commoriuntur. Coarguit autem & indicat
 comitali passione laborātes, ex bitumine, aut gagate lapide,
 aut cornu caprino suffitus: comestum item iecur hircinum,
 aut odor costæ iecinoris. Porro hoc malo correptis uictus ra-
 tio, quæ incidit & extenuat utilis est. Aëris itaq; constitu-
 tio, in quo æger uersatur, calida & sicca sit, potissimum si à
 pituitoso humore fuerit excitatum malum. Fugere oportet
 carnes omnes, demptis auium montanarū: item legumina, pi-
 scees, & uinū, præsertim antiquū, crassū, & copiosum. Potus
 autē sit mulsus, aut uinū aquosum, tenue, & dilutū. Capparis
 esus mirificè prodest. Exercitia conferūt, & frictiones: sed
 capiti post omnes reliquas partes adhibite. In balneo mora
 diuturna obest. Deuitandus coitus liberalis, moderatus uerò
 prodest

Quos po-
 tissimū cor-
 ripiat.

Puerilis
 passio.

5. Aph. 7.

Victus ra-
 tio.

prodest. Somnus sit nocturnus, & mediocris, impense caueat diurnum. Abstineat allijs, cepis, sinapi, & eiusmodi euaporantibus. Potum etiam statim à balneo, uini potissimum meracioris, fugiat. Cæterum si infans hoc malo laborauerit, nõ Curatio in
fantium. admodum medicamentorum præsidijs (Paulo teste) subuenire studebimus. Nam ætate ad calidorem sicciolemq; statum uergente, & uictu moderatiore, sua sponte plerunq; passio finitur. Quod Hippocrates confirmat, inquit: Quicumq; 2. Aph. 4 1. iuuenes passione comitiali laborant, mutatione maxime ætatis, & temporum, & locorum, & uictuum quoq; liberantur. Oportet autẽ solius infantum, & nutricum uictus rationem habere. Quapropter nutrix boni succi cibis utatur, si infans nondum ablactatus fuerit. Præterea ante cibum exercitetur, coitum fugiat: à uiri si quidẽ cõsuetudine lac odoris gratiam in deterius mutat. & humidius efficitur, menstruaq; eliciuntur. Quid multa? paulo antè præscripta uictus ratione calida & sicca utatur, ut lac scilicet calidius, tenuiusq; efficiatur. Capita autem infantum assiduè oleo anethino, & irino, adiectis puluisculis, cyperi, iridis, adianti, maioranæ, & similium, iniungenda. Nunquam tamen aqua calida uel frigida lauanda, multo minus tota immergenda, aut irriganda. Dato etiam ad lingendum mel despumatũ, Commendatur Ecligma. etiam à multis hoc ecligma, quod accipit: sacchari candidissimi 3 2. olei de amygdalis dulcibus quod satis est, ad iustam ecligmati inducendã consistentiã. Detur infanti lingendum. Sunt qui admiscunt uiscum quercinum, & unicornu, neq; sine magno pueri ægotantis cõmodo. Collo etiam radix pæonie uiridis suspendenda. Quantum enim hæc ipsa ad sanandum hoc malũ conferat, ex historia Galeni, quã narrat libro 6. De simpl. medic. facul. capite De pæonia, satis liquet. Puer enim totis octo mensibus à passione comitiali ex eo tempo-

re quo radicem gestabat, liber fuit, sed poste aquam quod à collo suspēsum erat decidisset, protinus conuulsione denuo correptus est: rursus suspēso in locū illius alio, inculpate

Curatio
adulterorū.

postea egit. Porro qui post annos pueriles in hāc passionē prolabūtur, eorū partes cōuulsas ac distortas inungere, irrigare, & in rectū dirigere oportet. Deinde os aperiendū, cuneusq; dētibz interponendus, ac penna oleo irimo illita, pituite extrahēda gratia, uomitus prouocādus. Odoramentis etiā sensum excitare cōuenit, ut pucedano, ruta, bitumine, & silphij succo. Perseuerāte uero exacerbatione, medicus audacter & uiolēter illorū maxillas diducat, infundatq; in os castoreū, aut laserpitij succū cū oximelite. Clysterem etiā acrē, iam excitatis, iniicere oportet. Cuius quidē formula ē superioribus petēda. Qui cōualescunt, uiribus antea recreatis, hiera Galeni, aut alio cōueniēte medicamēto, quorū formulas iā sēpe diximus, purgādi sunt. Hęc quidē recentis

Curatio
passionis
comitialis
inueteratę.

& acutę passionis comitalis curatio est, quare deinceps quomodo inueteratę sit succurēdū, trademus. Oportet igitur laborātes diu aquā bibere, atq; initio curationis, nisi qđ prohibeat, sanguinē ex uena poplitis mittere, quod Galeno testē, in libro De ratione curādi per sanguinis mīssionē, ex

Præpara-
tio.

cruribus potius qui comitali passioni obnoxij sunt, euacuādi sint, quā ex cubito. Interpositis dein quatuor aut quinque diebus corpus reficere, ac medicamēta extenuātia propinare expedit, serapia ex absinthio, de hyssopo, ē stichade, oxymeli scilliticū, decoctū hyssopi, radice pęonię, & alia quę

Purgatio.

suprà cap. 12. cōmemorauimus. Postea purgantibus medicamētis, uacuādi sunt, nēpe pilulis cochijis, de agarico, et simil. loco iam citato nominatis: idq; si pituitoso ex humore malum ortū fuerit, faciendū. Sunt qui in colocynthidē extracto semine, ac medulla tantū relictā, uinū dulce cōijciūt, totaq; nocte

nocte sinunt, dein mane excolant, & tepcfactū propināt. Si uerò ab atra bile cœperit hæc paffio, ea quæ humorem hūc uacuare poffunt, exhibēda, quorū formulas in capite De melancholia reperiēs. Licebit tamen aridi ellebori nigri corticem terrere & cribare, ac ex mulfa circiter drachmam unā dare: aut cum melle coctō, adiecto modico pipere, in pilulæ redactum assumere. Vbi fatis purgatus eſt æger, ad balneum ducendus. Tertio die hypochondrijs & ſcapulis cucurbitæ cū ſcarificatione affigendæ ſunt. Deinde cōpluſculis diebus interpoſitis corpus reficiendum eſt, & rurfus hiera Galeni purgandū. Poſtea capiti & occipitio cucurbitulæ admouēda. Sequēti die panis in mulfa coctus, additis amygdalis amaris, cōtritīs, aut ſerpillo, aut calamintha, aut mēta, aut ruta, cataplaſmatis inſtar capiti applicādus. Atq; hoc tribus diebus faciendū. Mox caput deaſis capillis peucedani ſucco in aceto diluto, in quo ſerpillū, aut iris incocta ſit, perungendū. Rurfus interea corpore recreato, purgādus erit æger tribus tantū hiære drachmis oblatīs. Quibus peractis, ſternutamenta, apophlegmatifmos, & ea quæ per nares purgant medicamēta exhibēda. Tēpore interpoſito, ſi neceſſariū eſſe uidebitur, clyſtere aliuſ eluenda erit. Tandem unguenta, linimenta, & emplaſtra, quibus diſcutiendi uis ineſt applicanda, quorum in capite 27. mentionem fecimus. Sunt quædam medicamenta, quæ naturæ quadam proprietate, atque adeo à tota eſſentia huic malo aduerſantur, ut eſt radix pæonia, niſcus quercinus, cornu ceruinum, offa humana combuſta, & alia multa, quæ lubens prætereo: quod copioſe à recentioribus omnibus ſint expoſita. Porrò ſi ob primariam uentriculi paſſionem epilepſia accidat, ut æger probè cōcoquat prouidendū. Panis igitur diligenter elaboratus, ex uino anti quo tenui & albo, mediocriter adſtringente, circa horam

Diſcutien-
tia medica-
menta.

Curatio
epilepſiæ
ex ventri-
culi uitio.

Si à parti-
cula quadā
oritur ma-
lum.

tertiam aut quartam dici assumendus. Dare autem expedit singulis annis, maxime si ob biliosi humoris inibi generatio-
nem malum oriatur, bis ter'ue hieram picram, ut bilis quæ
uentriculum grauat, caputq; tentat, uacuetur. Si autem à pi-
tuitoso humore oriatur uitium, agarico purgandus æger erit.
Neq; parum prodest scelis radix & semē, uel aristolochia
rotunda trita, & ex aqua pota. Confert & mirum in mo-
dum assidua crurum scarificatio. Cæterum ubi ex particula
quadam passio hæc inuadere percipitur, siue ea manus, siue
pes fuerit, fune fortiter excipi debet pars quæ superposita
est. Cum remittit malum, peracta totius corporis inanitione
prius iniunctionibus excalfacere corpus oportet. Deinde me-
dicamenta quæ rarefaciunt, & malam temperaturam par-
tis unde malum oritur, emendant, apponēda, ut est lepidium,
& similia. Succedente etiam tempore sinapismis locus irri-
tandus. Post omnia cōmemorata theriace, & naturalia bal-
nea locum obtinēt. Per totum uitæ curriculum cauenda cru-
ditas, & ante concoctionem alterius cibi assumptio, alimēta
crassi succi, diutinam cibi intermissione, commotionem tur-
bulentam, uinum largius potum à balneo, ut dictum est, odo-
ramenta acria, & quæ caput replent. Fixis præterea & in-
conuiuentibus oculis ex alto prospectum, diurnam in bal-
neo moram, & capitis à sole uestionem.

De conuulsione. Cap. XXX.

Conuulsio

Σ τὰς μὲς Græcè, cōuulsio uerò Latine, est malum, in
quo nerui atq; muscoli præter uoluntatē conuellun-
tur, in eumq; affectum ueniunt, quem etiam in motibus se-
cundum arbitrium factis assumpserunt. uelaliter, ueluti de-
finit Galenus libro 2. De sympt. causis, capite 2. Conuulsio
est, quæ neruos musculosq; ad eundē cogit affectum, in quem
ab ani

ab animali facultate, quum naturalem habitum seruarent, ducebantur. Eius autem tres sunt species seu differentie. Prima Græcis τέτανος dicitur, distentio Latinis, Celso rigor. τέτανος. Est, quum ceruix unà cum reliquo immobilis manet, & in neutram partem inflectitur, sed iuxta in utramq; partem recta intenditur. Altera ἐμπροδόνος Græcis nominatur, ἐμπρό- Latinis tensio ad anteriora. Accidit enim ut in ea caput, ceruix, reliquumq; corpus in pectus contrahatur. Tertia ὀπίδόνος dόνος Græcis, Latinis tensio, ad posteriora appellatur: ὀπίδόνος in ea enim caput in dorsum ac scapulos conuellitur. Quod vñ. ad huius mali causas attinet, animaduertendum Hippocrate causas. duas duntaxat statuiffe, πλῆρωσις & κένωσις, hoc, est plenitudo 6. Aph. 39. Plenitudo & inanitio. enim uidemus lora & chordas extendi, ubi aut multa madent humiditate, aut uehemētius exiccantur: sic & in corporibus animantium neruose partes conuulsione corripiuntur, uel nimium humectata, atq; adeò impleta, uel uiolentius exicata, ut copiose Galenus libro 3. De patient. locis, capite 5. Et lib. 2. De sympt. causis, capite 2. docet. Verum Hippocrates ipse de cōuulsione, ut primogenia passione, loquitur. Præter hanc autem alia est, quæ per consensum partis alicuius accidit: & hæc fit, ubi aliquid à parte primo patiente ad cerebrum ipsum effertur, quod ut à se expellat. huiusmodi motu concutitur. Iuniores medici barbaram sectantes medicinam, spasmus non proportionatum ad materiam uocant: Spasm⁹ nō quod scilicet nō accidat ob materiā quæ implere possit neruofas partes, neq; ob inanitionē materiæ, sed à qualitate quādā, alteratis per cōtinuationē partibus: aut substantia, uel spiritali ueluti aura uel fluida ad neruorum principium delata: Notæ conuulsionis à repletiōe, sicut contingit ijs, qui à scorpione aut alia uenenata fera icti sunt. Quod si aliquē sanum, Gale. 2. Aph. commēt. 2. 6. teste,

repentè & statim ab initio, uel non multò post morbi prin-
cipia conuulsio corripit, à repletione haud dubie originem

Ab inanitione & sic-
cirate.

ducit. Vbi uero post plurimos sudores, aut uomitum, aut alui
deiectiones, aut sanguinis eruptiones, aut uigilias, aut famē,
aut motus tum multos tum uehementes subsequitur, inanitio

Per cōsen-
sum.
Vicus.

& siccitas in causa est. Conuulsio per cōsensum facile ex re-
latione ægri aut assidentium cognoscitur. Viçtus ratio in
conuulsione, quæ fit à plenitudine, eadem est ei quæ in capite
de resolutione est perscripta, nempe calida & sicca. in ea ue-
ro quæ ab inanitione fit, humidā esse oportet. Nutriendi igi-
tur sunt ægri sorbitiõibus, & iuribus pinguibus, et carnibus
cōcoctis facilibus, probeq; nutriētibus. In potu uino utātur
tenui & aquoso, quod facile per omnes corporis partes di-
stribuitur: nisi febris affuerit, tunc enim ptisanæ cremor uti-
lis erit, aut pro uino dandum cinnamomi decoctum. Somnus
etiā accersendus erit. Vitanda exercitia, & omnia quæ cor-
pus inanire possūt. Quid multa? uicçtus in uniuersum talis sit,

Curatio cō-
uulsionis à
plenitudi-
dine.
Vênæ se-
ctio.
Clyster a-
cris.

qualis est eorū qui hectica laborant febre. Curatio cōuulsio-
nis, quæ à plenitudine orta est, statim à sanguinis missione au-
spicanda, modò nihil sit quod eandem fieri prohibeat. Libe-
raliter autē sanguinem auferre conuenit, modò id non con-
fertim fiat, sed pluribus uicibus. Mittendus uerò sanguis ex
cubiti uena media. Post sanguinis missionē, acri clysteri, si ita
ex re esse ægri uisum fuerit, alius eluēda. Partes autē quæ cō-
uelluntur, ualenter continendæ sunt, & inordinatis motibus
omnino resistendum. Oleo quoq; rutaceo, aut irino, aut alio
quodam ex hoc genere perfricandæ: aut lanis iam dictis oleis
imbutis contegendæ: aut uesica lata calido impleta oleo, ijs

Si à pitui-
tolis humo-
ribus ori-
tur malum,

superimponenda. Quod si uero à pituitosis humoribus con-
uulsio euenerit, tum ijs primum omnium extenuandi & in-
cidendi erunt, atq; ut ad expulsionem idonei sint præparādi.

Præpa

Preparati subinde confestim medicamentis pituitā purgantibus, quorū multa in capitibus de epilepsia & resolutione cōmemorauimus euacuādi. Cucurbitulas etiā cū scarificatio ne adinouere prodest: leues enim ledūt. Si crura cōtrahūtur, coxis & postremæ uertebrae. Si manus conuelluntur, dorso & primæ ipsius uertebrae, tum ei quæ humero superiacet. Caput præterea apophlegmatismis: gargarismis, & simili-
 bus medicamentis purgandum, procedente tempore balneo Capitis purgatio.
 uti confert. Singulis itaq; diebus bis aut ter in aquas sulphureas, uel aluminosas, uel salvas descendat: non tamē diu, ne uires deficiāt, ijs immoretur. Vel si naturalium nullus usus esse potest, laconico uti licebit, aut aqua cui incocta sint folia lauri, abrotanum, pulegium, absinthium, ruta, salvia, hypericum, maiorana, & betonica. Conuulsæ quoq; partes pellibus luporum & uulpium uestiri debent. Inunctiones etiam, quæ in capite De resolutione diximus, adhibeā. Frigidæ superfusione, cuius Hippocrates meminit, non temerē utatur medi-
 cus, nisi singula, quæ idem ille requirit adesse, cognouerit, ne pro remedio mortem adferat. Cæterum calida medicamenta, qualia sunt theriaca, antidotus Mithridati, & eiusmodi, sæpe sunt assumenda. Omnium tamen securissimum & optimum est castoreū dilutum ad cochlearis parui, hoc est, drachmæ unius mensuram datum. Verum id ipsum nō tantum haustum, sed etiā extrā illitū conducit. Porro conuulsio quæ ex inani-
 tione & siccitate accidit, maximum sanè malū est, & prope modum insanabile. Eos autē qui sic cōuelluntur, oleo, uel hydreleo calido fouere oportet. Ad lauacrum etiā deducere cōuenit, temperatoq; solio uti, frictioneq; cum oleo leuissima. Conuulsio nis ab inanitione curatio
 Et in uniuersum ferē curandi sunt ut hectici. Si ab ictu alicuius feræ uenenatæ, atq; adeo per consensum, conuulsio acci-
 dit, annitendum initio erit, ut uenenum extrahatur ad quod Cū alio cōuulsiois ab ictu feræ uenenatæ,

Theriaca.

efficies, uulnus latius faciēdo, locumq; totū in circuitu scarificando, superimpositis cucurbitulis. Vulnus etiā latioribus cauterijs ignitis inurendū. Postea porri semina, cum sale trita, aut allia, aut cepas illinire oportet: et post crustæ casum usq; ad dies quadraginta, aut sexaginta uulnus à cicatrice arcebis. Ad quā si festinabit rursus uitis aut ficulneæ cinere ulcus aperies. Cōfert et marrubij, et anagallidis folia illinire. Locus etiam oxalidis radicis decocto fouendus est. Nam eam mirificè Aëtius cōmendat. Cōducit etiam theriaca cum rosaceo diluta, et ulceri apposita, eo quod uenenum, aut eius qualitatem à profundo attrahat atq; euacuet. Hæc enim alexiteriorum, teste Galeno lib. 5. De simpl. med. facul. capi. 17. actio est. Priuatim uerò ea actioe esse præditam theriacā, idem Galenus in libro De theriaca ad Pisonem testatur, ubi sic scriptum reliquit: καὶ ὁλως καὶ δὲ πρὸς τὰ παλαιώνσιον φάρμακον ἢ θηριακὴ καὶ ἔξωθεν ἐπιτίθειν, καὶ πινόμεν τοῖς λυσοςδικεῖς ἀκεχῶς βοῦε. Quod est: In summa, theriaca et extrinsecus imposita, et epota, rabiosorum moribus præsentanei medicaminis cuiusdā inftar exactè auxiliatur. Vt hinc constet, toto cælo errare Gentilem, et qui huius placita sectantur, eò quod theriacam extrinsecus admotam intro et in profundum pellere uenenum asserunt. Plura ad institutum nostrum facientia reperiēt studio si in curatione ictus canis rabiosi.

De incubone. Cap. XXXI.

Incubus.

πνιγ-
λίωρ.

Causa.

Εὐιάλις Græcis, Latinis uerò incubus et incubo, est malum, ubi aliquis noctu se grandi mole opprimi, inuaditq; ab alio credit. A Themisone πνιγλίωρ, nimirum à suffocando nuncupatur, siquidem præfocari in ea egrotantes uidentur. Oritur id uitij ex crapula, et continua uentri-

culi

culi cruditate, unde uapores crassi & frigidi eleuati, cerebri uentriculos replent, prohibentes facultates cerebri per *nera* Notæ. uos diffundi. Comitatur eo detentos difficilis motus, torpidus in somno sensus, suffocationis imaginatio, & ueluti ingruentis alicuius detentio. Ad hæc uox supprimitur, aut incerta, indiscretaq; editur. Quidam ita manibus imaginibus afficiuntur, ut se opprimentes audire credant. Cum plurima tandem anxietate attenuato spiritu, & discusso, atq; apertis meatibus, repente excitantur. Occurrendum huic malo per *Huic malo* initia: nam perseuerans, & assidue inuadens, grauius aliquod *cur per initia occurrē dum.* malum, ut apoplexiam, morbum comitiale, aut maniam prænunciat, ac inducit, crasso humore in uentriculis cerebri sensim collecto. Victus sit tenuis, & qui flatus minime generet. *Victus.* Vino non utatur, nisi aquoso. Somnum fugiat diurnum, nec statim à comestione cubitum eat: & (ut summam dicam) tota uictus ratio talis sit, qualis est eorum qui comitali passione laborant. Curandi ratio, si plenitudo *Curatio.* affuerit totius corporis, à sanguinis missione aspicienda. Cubiti autem uena exterior secanda est. Sin cacochymia *Vene sectio.* aderit, purgationibus corpus uacuandum. Et si pituita reducta uerit, humores extenuantibus medicamentis ad purgationem præparandi sunt. Vniuerso purgato corpore, localia *Localia.* ad mouere medicamenta oportet, quorum omnium formulas ex superioribus petent studiosi. Succurrit autem ijs potissimum pæoniæ semen nigrum. Danda uero sunt grana quindecim trita ex aqua. Caput quoq; fouendum oleo anethino calido, & pileo tegendum, dum cubitum eunt. Intra corpus exhibenda, quæ caput corroborant, aromaticum rosarum uocatum, diamoschi dulcis antidotus, diambæ, dianthôn, pleres archigou, plurisarcoticon barbari nominant, & eiusmodi.

De mania. Cap. XXXII.

Mania.

Mania malum est, quod Latini insaniam vocant, & furorem. Hoc enim detenti ferarum instar redduntur effrenes et furunt. Differt à phrenitide, quod in ea sit febris,

Causa.
Sanguis
multus.Biliofus.
Calida ce-
rebris intē
peries.
Notæ.

mania uero citra febre[m] accidit. Oritur Aëtio autore, plurimo sanguine incorrupto ad cerebrum fluente, interdum temperato & multitudine tantum ledente, ut in ebrijs accidit, interdum bilioso. Galenus lib. 2. De sympt. causis hæc à mordacib. & calidis humoribus, qualis est maximè flaua bilis, uel à calidiori cerebri intemperatura nasci tradit. Præcedit maniā capitis debilitas, aurium tinnitus, splēdoresq; præ oculis obuersantur, ingentes uigiliae, cura sibi inuicem succedētes & extraneæ, grauedo uibratioq; capitis. Procedēte tēpore hæc omnia increbrescunt, rabidioresq; appetitus in illis excitantur, & in uenerē promptitudo. Præterea nocturnæ pollutiones iugiter fiūt, excauantur oculi, ac minimè nutant.

A sanguine
solo.

A bilioso.

Ceterum à solo sanguine maniam ortam comitatur risus astiduus, ridiculis quibusdam uisis ante oculos occurrentibus. Vbi uero flaua bilis sanguini cōmiscetur, iracundiā reddens tanquam ab ipsa stimulatō interius cerebro & membranis, iracundi, audacesq; euadūt. At si flaua bilis etiā superassetur crassefcātq; cerebrū ac membranas stimulas & diuellēs, fer-

6. Aph. 53

Vicius ra-
tio.

“Desipientiæ quæ cū risu fiunt, securiores. Quæ uero cū studio, periculosiores. Vicius sit tenuis, sorbilis, liquidus, citra satietatē bonū aluum facientē, & qui nihil aut minimū san-

Curatio
maniae à
sanguine
copioso.
Venæ se-
ctio.

guinis generet, uinumq; omnino prohibere oportet. Curatio à sanguinis missione, ubi à sanguine malum accidit copioso, ordiēda. Cubiti autem exteriorē uenam incidere conuenit, aut si non apparuerit, mediam. In mulieribus malleoli

uena secanda, eo enim delapsu frequenter menstrua prouocantur. Tantum autem sanguinis detrahendum, quantum uires tolerare possunt. Sedato enim seruire, cōfestim recreantur, simulq; reliquis præsidij locus relinquitur. Verum quū nonnulli prima quidem ablatione strenuè manitionem ferāt, in sequentibus autem animo linqui consueuerint, expedit ijs in prima statim ablatione detrahere quantum usus postulauerit: ita enim simul euacuātur plurimū flatuosi, uaporosiq; spiritus. In sanguinis itaq; effluxu assidue pulsus tangendus est: qui si conciderit, cōfestim de repetitione cogitandū. Post stridie reparatis iam uiribus repetitio molienda. Porro post Localia, sanguinis detractionem caput rosaceo & aceto fouendū, aut succo polygoni, aut melino oleo. Deinde succida lana oleo madefacta syncipiti applicetur, assidueq; noua mutetur. Post inanitionem sanguinis uespere somnus concilietur: euacuato enim sanguine, si uigiliae successerint, ægri immaniores euadunt. Quare medicamentū soporiferum Diacodion uocatū, cū succo ptisanæ aut cū aqua audacter exhibendū: ita enim iucundus somnus allicietur. Et plurimi quidē ipsorum sumpto soporifero omnino resipiscunt. Quapropter ubi prima die post medicamentum satis dormierint, una die interposita, rursus diacodion propinandum. Consueuit enim à sanguinis missione cōuenienti uictu adhibito, exactā curationē perficere. Obseruandū tamen ne postea ulterius offeratur. nam sensus stupidos reddit. Vsum eius aliorūq; soporiferorum medicamentorū monstrauius lib. 1. de comp. medic. capite 4. Probatur etiā oleum uiolarum cum lacte scemina. Item Embrocha è uiolis siccis, floribus nymphaeæ, salicis, et rosarū, fo

Embrocha

His

His peractis, ex uenis etiam è fronte, ab ea potissimum quæ media in fronte est, sanguinem, si res postulauerit, detrahemus. Vel hirundines capiti circulatim, sincipiti præcipuè, ad mouebimus. In ijs quibus biliosior sanguis fuerit, ex hiera picra, & alijs medicamentis bilē uacuantibus, purgatio prius molienda erit. Si uerò delirantes purgantia medicamenta bibere renuēt, interim ut facilius fallantur, cibis, buccellis, uel ficibus pinguibus, uel palmulis admiscenda sunt. Vnicè autem ipsos iuuat hippomarathri radix, semenq; ex aqua potum. Declinante morbo æger ad balneum ducendus, ac reliquæ medicamentis discutientibus dissipandæ. Plura si quispiam requireret, is ad caput sequens, De melancholia, sese conferat, atq; ea quæ ad institutum faciunt excerptat.

Curatio in
anix a san-
guine bi-
lioso.

Balneum.

De melancholia. Cap. XXXIII.

Melancho-
lia quid.

Causæ.

Melancholia, est mentis alienatio, seu desipientia, sine febre, ex melancholico maximè humore mentē occupante, ac temperaturam suam immutante, nata. Fit uerò id ipsum trifariam. Interdum enim uniuerso in uenis corporis sanguine melancholico affecto, ob cōmune uitiū, cerebrum quoq; ipsum simul læditur. Nonnunquam uero reliqui corporis sanguis prorsus innocuus est, solus autē is qui in cerebro est alteratur: idq; bifariā accidit. Aut enim aliunde in ipsum deriuatur, aut in ipsomet genita est, cum uidelicet internus calor aut flauā bilem, aut crassū atrūq; sanguinē superasfauit. Interdū etiā ob inflāmata & malè affecta circa uentriculū hypochondria melancholia prouenit, quæ modò auram exhalationem uel quandam maligniorē ac melancholicā, modò substantiæ humoris partē ad cerebrū sursum trāsmittūt. Quemadmodū enim nōnulli frequēter eleuata à uentriculo fuliginosa quadā aut fumosa exhalatione, aut omnino crasso uapo

uapore quidpiā suffusioni simile præ oculis obijci sentiunt: sic ascendēte ad cerebrū malācholica exalatione tanquā fuligine aut fumo, melancholica symptomata circa mentē ceniunt. Quare tres sunt in uniuersum melācholiæ species, seu differentiæ. Vna, cum totum corpus melancholico sanguine redundat. Altera, quando is sanguis ipsam duntaxat cerebrum occupat. Tertia, quādo hypochondria ipsa primum malè affecta, in consensum subinde cerebrum rapiunt. Hæc melancholiæ species Græcis *φυσώδης* & *ὑποχονδριακή*, hoc est flatuosa & hypocondriaca nominatur. Communia omnium signa sunt, metus, tristitia, odium, & auersio hominū, iuxta hanc Hippocratis sententiā: Si timor & mæstitia longo tempore habentes perseuerent, ex eo atra bilis significatur. Priuatim uero melancholicorum uariæ sunt imaginationes. Alij enim credunt se bruta esse animalia, & uoces ipsorum imitantur. Sic Gale. lib. 3. De patiēt. locis, cap. 6. narrat fuisse quendam, qui se gallum esse putauerit, ideoq; gallos cantare audiens, ut hi alarū sic ille brachiorū plausu latera quaties, gallorum sonum imitatus est. Alij uasa fictilia, ut idem eodē in loco testatur, et testas se esse arbitrantur, atq; idcirco obuiantib. ne collidantur, cedunt. Præterea hi mortem expetūt, atq; adeò non rarò sibi mortem consciscunt: illi eandem expauescūt. Talis fuit, de quo Gale. scribit, qui timuit ne Atlas qui mundū sustinere dicitur, grauatus sub tanto onere, ipsum a se excuteret, atq; ipse cum illo collideretur, ac nos quoque cum ipso periremus. Nonnulli semper ridēt, Democritumq; agunt: alij Heraclitum, nunquam non lachrymantes. Quidā se numine afflatos esse existimant, & futura uaticinantur, quos *ψευδαισυχὸς* priuatim Græci nominant. Sunt aliæ in finite eorum imaginationes, quæ singule connumerari non possunt. Porro peculiare illorum hæ sunt notæ. Qui ex totis

Tres melancholiæ species.

Notæ.
6. Aph. 23.

Varie melancholicorum imaginationes.

Signa peculiaria melancholiæ.
Ex totius corporis consensu.

tius

tius corporis consensu melancholia laborat, ijs corporis ha-
 bitus est gracilis, niger, hirsutus & ex toto melancholicus,
 uel natura uel acquisitus per solitudines quasdam, aut uigi-
 lias, aut prauorum ciborum esum, aut hæmorrhoidum, aut men-
 struorum suppressionem. At qui ex hypochondrijs uitium con-
 traxerunt eos sanè cruditates, quas plurimi flatu cōsequun-
 tur, acidi ructus, ardor, & grauitas hypochondriorum, ar-
 guunt. Hypochondria quoq; sursum cōuelluntur, & nōnun-
 quam inflammatione conflictantur, idq; potissimum circa mali
 exordium. Ventres etiā desiccantur, somnus exiguus fit, som-
 nia turbulenta & enormia, saltus diuersi in singulis corporis
 partibus, uertigines capitis, & in auribus flatuum sonitus.
 Deinde ubi malū accreuerit, atræ bilis comitantur sympto-
 mata, quæ utiq; concoctione, uel excretionē, uel multis flatu-
 bus, uel uomitu, uel ructu leuantur. Victus ratio eiusmodi sit,
 quæ atrā bilē minime possit pcreare. Versandū itaq; in aëre
 calido et humido. Cibis utendū boni succi, humidis & tēpera-
 tis, pane in clubano cocto, ac probè cōfecto: carnibus capo-
 nū, gallinarū, perdicū, phasianorū, piscib. saxatilib. & eius-
 modi. Cōtrā deuitet cibos oēs qui melancholicū humorē ge-
 nerāt, quos ordine & copiosè Gale. lib. 3. De patient. lo. cap.
 6. recēset. Vinū aeger bibat tenue, album, neq; ualde antiquū.
 Crassum uerò & nigrū uitet. Exercitiū sit mediocre, equita-
 tio aut deambulatio per loca amœna & uiridia, aut nauiga-
 tio. Aeger etiā balneo aquæ dulcis, quo se uno præsidio cū ui-
 ctu humido Galenus malū hoc ubi nodū in longū effct pro-
 tractū, curasse scribit, frequenter utatur. Somnus illi supra
 modū cōfert, ueluti etiā coitus, at moderatus. Gaudeat & le-
 tetur, in hocq; habeat, q̄ cautu aut alijs musicis instrumētis
 hilaritatē exc. tēt. Cæterū ubi uniuersum corpus sanguine me-
 lancholico abundauerit, medēdi initium à sanguinis missione au-
 spicari

Hypochō-
driacæ.

Victus.

Cibivtiles

Balneum
aquæ dul-
cis.

Curatio
melanchol-
icæ à san-

spicari expedit. Secunda uerò (Galeno loco iam sæpius citato guine me-
lancholico,
 autore) cubiti uena: præcipuè aut media. quæ scilicet cõmunis
 est ei quæ humeraria nominatur, & ei quæ per axillâ ad ma-
 num fertur, iecorariâq; dicitur. Vbi uero solum cerebrũ san- Venæ se-
ctio,
 guinem melancholicũ continet, æger sanguinis detractiõne,
 non indigebit, nisi fortè multum sanguinis sit, ac præserua-
 tionis gratia uenam incidamus. Quum itaq; ex primaria ce-
 rebri passiõne melancholici efficiuntur, frequentibus balneis,
 uictu boni succi & humido, minimeq; flatuoso, unâ cum de-
 centi animi delectatione, sine alio potètiori remedio curandi
 sunt: humor enim qui molestat, ob temporis breuitatem ut
 excernatur, nondum contumax esse potest. Malum autem si
 aliquandiu durauerit, ualentiora magisq; uaria medicamẽta
 requirit. Siue igitur ex totius corporis cõsortio, facta prius Purgatio,
 ut diximus, sanguinis detractiõne: siue solius cerebri prima-
 rio affectu melancholia orta fuerit, medicamẽta quæ per in-
 ferna purgant exhibere oportet. Interpositis tamẽ aliquot à Decoctum
præparans
 uenæ sectione diebus, in aurora quotidie æger bibat hoc de-
 coctum, quod accipit: Florũ buglosi cirsiij, uiolarũ, singul.
 m̃ i. uuarum passerũ detractis uinaceis ꝛ i. hemionitidos m̃
 i. fumarie m̃ f. corticum radicũ capparũ, tamaricis utri-
 usq; ꝛ i. radicum fœniculi, petroselini, glycyrrhizæ, singul.
 ꝛ i. thymi, epithymi, utriusque ꝛ f. Decoquantur singula in
 trib. libris aquæ, donec tertia pars absumatur, deinde colo-
 transfundantur, & saccharo adiecto ius decocti dulce red-
 datur, alboq; oui purificetur, & addantur serapij è fumaris,
 de epithymo, utriusq; ꝛ i. & fiat potio. In eundẽ usum hodie
 propinant serapiũ uiolaceũ, è buglossa, admixtis aquis still-
 laticijs hemionitidis, lupi salictarij, intubi hortensis latifolij,
 & buglosi. Verum cum stillaticiarũ aquarũ usus uentricu-
 lo non admodum conferre uideatur, præstat prædictarum
 herba

herbarum decoctis uti, cōmixtis serapijs in hunc uel consimilem modū. Serapij ē buglossō ꝛ 1. serapij de epithymo ꝛ 5. Decocti hemionitidis, fumarie, & intubi hortensis latifolij

Potio. ꝛ 3. Cōmixtis omnibus fiat potio. Posthæc corpus purgetur antidoto hamech appellato, & diasenæ, catapotijs mais, è la

Decoctum
purgans
melancholiam.

pide armenio, & similibus. Proderit autē huius etiā decocti purgantis usus, quod recipit: Florū buglossi, uiolarū, rosarum, singul. m̃ 1. uuarum passarum detractis uimaceis, oxyphœnicōn, utriusq; ꝛ 1. myrobalanorum cæruleorum, luteorum, empeliticorum, beletzicorum, singul. ꝛ 5. folliculorum senæ, polypodij, utriusque ꝛ 6. prunorum damascenorum numero 10. Coquantur in aqua iustæ quantitatis ad tertias, dein colo transfusis, adiecto prius saccharo, iuri decocti dulcedo ac suauitas inducatur, de quo in aurora ꝛ 4. exhibeantur. In ijs, si nō satis purgent, licebit: dissoluere cōpositionis diasenæ ꝛ 2. Mirificè quoq; cōducit dilutū epithymi,

Dilutū epithymi.

in eū paratū modū. Epithymi ꝛ 5. Maceretur horis 24. in feri caprimi lactis ꝛ 4. Dein ualidè exprimatur, & colo trāsfundatur, atq; in aurora propinetur. Valet etiā dilutū foliorū senæ, quod sic parari potest. Foliorū senæ ꝛ 2. prunorū damasce. nume. 12. cōtusa macerētur in sero lactis ca-

Dilutū foliorū senæ

Puluis purgatorius.

primi horis 24. deinde exprimātur, & colo trāsfundantur, atq; in aurora, ut antea est indicatū, bibātur. Licet etiam hoc uti puluisculo, qui accipit: Epithymi ꝛ 5. lapidis armenij, agarici, utriusq; ꝛ 2. scāmōniæ preparatæ ꝛ 1. garyophilorū nu. 20. Redigātur omnia in puluerē, et singulis septimanis ꝛ 1. uel ꝛ 1. 5. pondere dentur. Vtile est etiā lactis sero uētrē subducere. Verūtamen id nō sit quod ex caseo fuerit expressum. Melius est enim id, quod p decoctionē, Aëtio teste, ex lacte separatur. In ollā enim nouā inijciendū lac, & uirgulto ficus mouendū: cumq; ter quaterue deferbuerit, aceto mulso

Serum lactis ut parandum.

mulso irroretur: dein excolatum potui exhibeatur, à prin-
 cipio quidē admixto melle, cum uerò uentris subductio in-
 ceperit, non misceatur mel. Neque temerè quis à purgatio-
 ne, interiectis quibusdam diebus, clysteribus utetur, ut qui à
 capite auertere admodum queant. Sunt autem eiusmodi, qui
 accipiunt: Fumariæ, lupi salictarij, thymi, singul. m̄. 1. epi- Clyster.
 thymi m̄. 5. senæ, polypodij, utriusque 3 6. cartami 3 5. se-
 minum anisi, sceniculi, ammeos, cumini, singul. 3 1. Coquan-
 tur usq; ad tertias. Dein accipe iuris decocti lib. 1. casie fistu-
 laris recens extractæ 3 1. cōpositionis aë senæ 3 5. oleorum
 uiolacei, chamæmelini, utriusq; 3 1. 5. salis vulgaris 3 1. 5. Mi-
 sceatur singula, & fiat clyster. Præterea si hæmorrhoidibus
 aut mensib. suppressis malū fuerit concitatū, horum quoq;
 purgationē moliemur. Id quod facere nos monet etiā Hip- 6. Aph. 11.
 pocrates, inquit: Atra bile uexatis, hæmorrhoides super- 6. Aph. 21.
 uenientes, bonū. Et rursus: Insanientib. si uarices, uel hæ-
 morrhoides superuenerint, insanie solutio. Danda quoque
 sunt medicamēta, quæ animi tenebras abigere, atq; adeo læ-
 titiam parere ualent, uiresq; reficiūt, ut est saccharū buglos-
 si, intubi hortēsis latifolij, uiolaceū, rosaceū, letificans Gale-
 ni uocatum, dianthōn, & cōplura alia. Nulla deniq; ratio- Balnea.
 ne, quod antea etiam monuimus, balneorū aquæ dulcis usus
 est negligendus. Embrochas quoq; caput humectare poten- Embrocha
 tes adhibere oportet, qualis est quæ accipit: Maluæ, altheæ,
 uiolarum, singul. m̄. 1. 5. chamæmeli, stichadis, utriusq; m̄. 1.
 florū nymphææ m̄. 5. seminis lactucæ 3 1. seminis intubi hor-
 tensis angustifolij 3 1. 5. Buliant in aqua iustæ quantitatis,
 & iure decocti caput rasum irrigetur. In eundem usum con-
 uenit adhibere inunctiones ex oleo uiolaceo, nymphææ, &
 similibus. studiosè postremū annittendū, ut imaginationes
 absurde, falsæq; & immensa mœstitia, quacūque fieri po-
 h test

test ratione, propulſentur. Huius rei memorandum exemplū extat apud Alexandrum Trallianū, qui lib. 1. cap. 22. mulierem quandam hunc in modum se ſanitati reſtituiſſe ſcribit.

Historia. Mulier (inquit) melancholiæ malo correpta, inter dormien-
 dum anguē ſe degluſiſſe putabat. Ciens itaq; ei uomitum, an-
 guem extinctum pelui, qua uomitionem excipiebat, clande-
 ſtine inferui: quem ſimulatq; conſpexiſſet melancholia, ea
 uomuiſſe rata, omnē falſam ſuſpitionē poſuit, & ſalua eua-
 ſit. Porro ſi ob hypochondriorum offenſionem paſſio cō-
 ſtiterit, utendum aſiduē potu decocti pulegij, nō ſolum ante
 medicamentorum purgantium exhibitionē, uerum etiā poſt.
Hypochō-
driacæ me-
lancholiæ
curatio.
Abſinthij
decoctum. Similiter & centaury decocto. Deinde quoq; abſinthij de-
 coctum iugiter exhibendum, utile enim eſt ſtomacho & uen-
 triculo, plurimiq; ſtatus generationē in uentre impedit, neq;
 extremē uentrem cōpeſcit, ſed urinam mouet, optimamq; co-
 ctionem præparat, adeo ut hoc ſolo remedio plurimi ſanati

Diurctica ſint. Exhibēda etiā ea ſunt, quæ urinam mouent, ut aniſum,
 daucus, aſarum, ſmirnion, hypomarathri ſemen ac radix,
 & chamædrys. Horum enim quodlibet aqua decoctum ſu-
 mitur, uel in puluerem reductum, potuiq; inſperſum. Vtile
 etiā fuerit, ut hypochondriorum curam habeat medicus.

Fomenta. Foueuntur itaq; ruthæ, anethi, abſinthij, pulegij, agni ſemi-
 nis, baccarum lauri, ſerpilli, artemiſiæ, & ſimilium decocto.
 Hæc enim dolores leniunt, ſtatuſq; diſcutiunt, maximē ubi
 oleo incocta malè affectæ parti cataſmatis inſtar appli-
 cantur. Inſtatibus autē ſtomachi cum punctiōe, cuminum,
 aceto decoquentes, & pulegium, ſtomachum foueimus.

Cataſma-
tata. Cataſmata autem habeant in oleo decoctum aniſum, aut
 apium, aut cuminū, ſmirnium, & ijs ſimilia. Cum admo-
 ues, plurimo tempore tam ieiuino ſtomacho, quā poſt cibum
 adherere permittes. Cumq; cataſma auferitur, contegen-

da hypochondria sunt lana latiori, uel leuissima ac pura pelle agni, locum prius oleo nardino illinentes. Utendum etiam appositione cucurbitularum leuium, hoc est, citra scarificationem. Videbitur enim tibi praesidium hoc, Galeno lib. 12. Thera. meth. teste, in huiusmodi malo incantamenti cuiuspiam simile quid efficere. Illico enim admota cucurbita, qui spiritu flatuoso cruciantur, tum à dolore liberi, tum omnino sani redduntur. Ad phlegmonas autem & durities, cucurbitulis cum incisione utendum. Quibus uitiū diu durauerit, praesentissimum est remedium per uomitum purgatio. Non tamē ualidis uomitorijs utendum est, talia enim infesta sunt stomacho, ac uentri anxietatem afferunt. Cōcitetur igitur uomitus cum aqua tepida, cui oxymeli sit admixtum. Quod si tamen neque hoc modo possunt euomere aegri, digitos aut pennas in os demittēdo irritare oportet. Proderit autē ijs unice uomitus, qui per elleborum fit album, in eum modū: Accipe ellebori albi 3 1. Concidatur in minutas particulas, & raphano satis magno infigatur. Transactis trib. diebus, iterū eximatur, raphanusq; deinde fortiter exprimatur. Postea accipe succi de raphano expressi 3 6. aquae calidae 3 4. oxymelitis 3 1. & cōmixtis singul. uniuersum calidum aegro propinato. Vel confice uomitorium in eum modū: Accipe ellebori albi optimi 3 3. & raphano prius perforato infige, ac ibi noctē unam integrā dimitte. Postridie ubi in raphanum uires ellebori migrauerint, amoto elleboro, raphanus in minutas partes diffecetur, & in oxymelite propinetur, diligenter cauēdo, ne quidpiam ellebori in raphano relinquatur.

Cucurbitularum appositio.

Vomit⁹ ut concitandus.

De tremore. Cap. XXXIII.

MAlū quod Græcis τρεμος, Latinis uerò tremor dicitur, ex duob. perficitur motibus: uno qdē, dū cogitur

Tremor,

h 2 membr

membrum ob morbum atq; gravitatem ad inferiora repere: altero, dum sursum à facultate fertur. Malum hoc in uniuer-

Causæ. *lām testatur. Priuatim uerò plures aliæ causæ ipsum efficiūt: nempe frigidius naturæ temperamētum, frigide potio, præ-*

Notæ. *sertim in febrīb. intempestiuè assumpta. Frigidi præterea, crassi, & lenti humoris abundantia, uiniq; multi meracioris*

Victus. *usus, senectus, atq; timor. Signa neq; ad mali, neq; causarum dignotionem ulla sunt necessaria, quod scilicet partim uisu, partim etiā ex ægri sermonib. atq; corporis cōstitutiōe de-*

Curatio. *prehēdi queāt. Victus ratio sic cōstituatur, ut causis plūnè sit contraria. Cibus uerò facillimæ distributionis offeratur: primū sorbilis, mox uolatiliū, & pisciū molli carne prædito*

rū. In crassorum lentorumq; humorū redundātia, ijs uti cōuenit quæ incidendi & extenuandi uim obtinēt, de quibus in præcedentib. sæpe dictum est. Vitanda uerò in uniuersum omnia, quæ nervos offendere possunt, uini maximè meracioris potio. Bibendum uerò dilutum & aquosum, aut hydromeli.

Quod ad rationem curandi attinet, qui ex erroribus cōmis-

sis manifestè tremunt, à noxijs prorsus abstineant. Quid igitur ex uini potione tremunt, ijs uinum circuncidendum est, quoad in totū morbo fuerint liberati. Bibāt interea hydro-

mel, cū decocto saluæ aut betonicæ. Si à frigidis et crassis hu-

moribus tremor accidit, curandi ratio erit adhibenda eadem,

quæ resolutioni & cōuulsioni à plenitudine ortæ, sanguinis

dūtaxat missione excepta. Extremæ autē corporis partes o-

mnibus calefaciētibus præunctæ, lanis mollibus cōtegātur. Dem

cucurbitulæ citra scarificationem à priori uertebra, usq; ad

spinā lumbosq; affigātur, ut scilicet crassi & lenti humores

uertebraarū foramina obstruentes, ad cutis extimā superficiē

trahantur, atq; adeò subinde facilius discutiantur. Proderit

etiam

etiam, ut eger quotidie piperis grana quinq; ex mulsi cyatho, hoc est $\frac{3}{4}$ libat. Sunt præterea quedam alia medicamenta simplicia, quæ præsumpta trementes adiuuant, nempe castoreum, altheæ radicis, & eupatorij decoctum, & ex animalibus desumptum leporis cerebrum. Quid multa? medicamentis, unctionibus præsertim, ad resolutionis curationem conscriptis, in huius generis malo utendum.

Simplicia
medicamē
ta tremēti-
bus cōdu-
centia

De ophthalmia, siue lippitudine.

Cap. XXXV.

Ophthalmia Græcis, lippitudo Latinis, nihil aliud est, quam tunica uel membrana adnata, quam barbaram se etantes medicinam Coniunctiuā uocant, inflammatio. Adnata uero hanc dixerūt propterea quod alijs quæ oculum ipsum constituunt tunicis forinsecus adnata sit, ligamentum existēs toti oculo ad circumiacentia ossa. Hinc est quod ambientes oculorum partes ad malas nonnunquam in uehementiori lippitudine simul attolluntur. Fit hoc malum uel ex plenitudine uniuersum corpus grauante, ob quam adnata etiam humoribus referta tenditur: uel ab influentium humorum acrimonia uehementer erodente: uel propter crassorum humorum, aut flatulētorum spirituum intensiōe. Dignoscitur, si adnata oculi, quæ natura cādida est ob sanguinis cōfluxū rubea esse uidetur, & ex oculis lachrymæ resudant, atq; in maioribus oculi angulis sordes quedam aceruantur. Locus in quo decumbit eger, obscurus & tenebrosus sit, & pro causæ diuersitate aut frigidus, aut calidus. Si in propatulum egreditur eger, lintheum atrum, aut ceruleū, aut uiride oculis obducatur: siquidē ij colores uisum morbo affectū, aut fatigatū corrigunt ac recreāt, ut testatur Galenus lib. 1. De sympt. causis, ubi ex professo de ijs quæ oculos aut molestant, aut tri-

Lippitudo
quid.

Adnata cur
appellata.

Causæ.

Notæ.

Victus.

h 3 stant,

stant, agit. Tenui autē prorsus utendū uictu, ac cibo parcio-
re. Deuitet carnes, lactisq; usum. Vino, præsertim inter ini-
tia, abstineat, bibatq; decoctū cinnamomi, aut hordei, donec
uigor prætereat. Quod si tamē crassiores humores tensio-
nem procrearint, hydromeli, aut uinū tenue & aquosum bi-
bere cōuenit. Exercitari haud prodest, sed quiescere. Pertur-

Curatio
Ophthal-
miæ à ple-
nitudine.

Venæ se-
ctio.

Ophthal-
miæ à ro-
dentibus,
aut cras-
sis humori-
bus cura-
tio.

Purgatio

Reuulsio,

Adstringē-
tia & re-
pimentia.

Liquores
mitigantes

bationes animi procul absint. In curādī ratione animaduuer-
tendū, num ex plenitudine fuerit contracta inflammatio: id
quod cognoscitur, ubi cū ingēti dolore oculos affligēte plu-
rima tensio, rubedo, renitētia, & calor affuerit, feruidarūq;
lachrymarū copia defluerit: tum enim à missione sanguinis
hæc ipsa auspicāda erit. Venam autem secare oportet cubiti
exteriorē, quā humeralem uocant, atq; cā quæ ē directio est.
Et ubi uehemēs fuerit inflāmatio, ad animi usq; deliquiū au-
ferre cōueniet. Si uerò à rodētib. aut crassis humoribus lippi-
tudo orta fuerit: id qd' lachrymæ tenues, falsæ, acres, calidæq;
aut cōtrariæ monstrabūt: atq; adeo totū corpus cacochymū
fuerit, prauisq; abundauerit humoribus, quæ noxios hu-
mores uacuare & purgare possūt medicamēta propināda:
quæ certè pro redundantū ac infestātium humorū uarieta-
te immutāda ueniunt. Corpore uacuato, humorū, qui ad ocu-
los feruntur impetus deorsum, & ad alias corporis partes,
ignobiliores, infernarum partium frictionibus, ligaturis ar-
tuum, & cucurbitulis reuellendus erit. Post hæc adhibenda
sunt medicamenta repellentia, quæ non exasperant, hoc est.
non uehementē sunt sortita adstrictionē: & quæ tum pro-
pria sua substantia sunt moderatiora, tum lenientis liquo-
ris admixtione adhuc magis talia sunt. Lenientes autem mi-
tigantes uel humores sunt, Galeno lib. 13. Ther. meth. capite
ultimo teste, potissimū oui candidum, fœnogræci decoctū,
& ad hæc amplius ipsum lac. In quo sanè prouidum esse me-
dicum

dicū oportet, ut iuuēcula simulq; boni succi fœminæ existat, uberibus ipsius in cotē, in qua collyriū teritur expressis, quo calidum adhuc oculis infundatur. Hoc uerò præcipue in ijs qui uehementi dolore affliguntur, uel propter inflāmationis magnitudinē, uel ob influentium humorū acrimoniam, faciēdum. Fronti itaq; illinendi succi rosarū, plantaginis, solani, foliorū salicis, aut eorundē liquores stillaticij, cū oui albo & aceto. His admiscere cōuenit bolum armenia, thus, acatiam, santala rubea, balaustia, & similia, ex quibus adiecto oleo rosaceo, & farina hordeacea, cataplasma aut emplastrum cōponatur. Emplastica uerò & anodyna, hoc est, dolores sedantia, ut est cerussa lota, amyllum, & cicuta, nō sunt temerē adhibēda. Hæc enim etsi maximē reprimere quod influit, & simul sensum torpescere possunt, tamē (ut testatur Galenus 6. Aph. cōmēt. 31.) uehemētes fluxiones nō reprimūt, sed potius excerni prohibēt. Quare si humores cōfluētes acres fuerint, corneam erodi continget. Si uerò multi, magis irritari, & uehementer extendi. Præterea uehementer stupefacientia, nisi maxima doloris necessitas urgeat, non sunt admouenda: quòd scilicet facultatem uisoriam offendāt, adeo ut desinente inflammatione, uel obscure & debiliter, uel nihil omnino uideant. In principio itaque medicamenta quæ refrigerant, adstringunt & repellunt, admouenda. In incremento morbi, repellentibus nonnihil ex ijs quæ discutiūt, admiscenda. At in uigore, mitigatoria applicanda. In inclinatione, ea quæ discutiendi tantum facultate pollent. Vbi igitur concocta iam phlegmone ipsa fuerit, & simul corpus uacuum, tum utique lauationes ijs in balneo sunt aptissimæ. Nam ut Galenus loco paulo suprā citato scribit, & dolorem statim sedant, & fluxionem quæ ad oculos fertur sistunt, maxima quidem eius parte inter lauandum per totum

Emplastica & refrigerantia uehementer non temere adhibenda,

Stupefacientia non temere admouenda.

Balneum

- Fomētum** corpus excreta, reliquo autem contemperato. **Fomentum**
discutiens. insuper omnino adhibendum est ipsis oculis per spongiam si
quidem mediocris sit dolor, semel aut bis in die. Si uerò ue-
hementior fuerit, præstat ter aut quater, & sæpius uti, in
longis præsertim æstiuis diebus. Fiat uerò fomētum per me-
lilothi, & fœnogræci decoctū. Est enim hoc medicamentum
maximè omnium quæ oculis admoventur, sine offensa discu-
tiens. Lauādum tamen prius curiosè fœnogræcum, ne quid
illi uel pulueris, uel sabuli adhærens clām lateat. Aloë etiam
per se, uel succo aut liquore stillaticio fœniculi & rosarum
Fœnogra-
cum. diluta, mirabiliter confert. Poteris itaque hoc uti collyrio,
Collyriū. quod accipit: Liqueoris stillaticij rosarū fœniculi, & euphra-
giæ, singul. ʒ. i. aloës ʒ. i. pompholygis lotæ ʒ. ʒ. Commisce-
antur singula, fiatq; collyrium liquidum.

De pterygio. Cap. XXXVI.

- Pterygion** **quid.** Π Τόρυγιον neruosa est adnatæ mēbrane eminentia,
quæ ab angulo maiori quidē oritur, sed usq; ad coro-
nā seu irim oculi progreditur. Quū uerò augetur, pupillam
etiam obtegit. Latini unguem appellant, barbari ungulam.
Vnguis
Vngula. Oritur magna ex parte ob scabiem, aut continuū humorum
Causæ. crassorū & lentorum defluxū. Signis quibus malū deprehē-
Notæ. ditur nullis est opus, cum oculis ipsis sit manifestissimum.
Victus. Victus ratio talis sit, quæ crassos & lentos humores exte-
nuet: quæ qualis sit, ex superioribus faciliè cognoscitur. Ceterū
Curatioma quod ad curandi rationē attinet, animaduertendū, quod ma-
gni & diu-
turni pte. gna & diuturna pterygia sola chirurgia amoliuntur: quam
rygij. copiosè tradit Aëtius libro 7. capite 60. & Paulus libro 6.
Recentioris cap. 18. Recentiora, & magnitudine mediocria, præsidijs
& medio-
cris. dissipātur abstergetibus, sic tamen, ut uniuersum corpus pri-
mum à crassis & lentis purgetur humoribus. Initio itaque

ea quæ crassos & uiscidos humores extenuant, & incidunt medicamēta: deinde uerò quæ eosdē purgēt & euacuēt, sunt propinanda: quorū omniū materiam & formulas è præcedentibus petent studiosi. Neq; enim necessariū, neq; etiam decorū esse iudicio singula repetere. Corpore uniuerso purgato, pterygion primū cum decocto maluæ, altheæ, chamæmeli, semine lini, & similiū foueatur, deinde quæ extergunt repurgant uel medicamēta admoueātur: qualia inter simplicia æs ustum, chalcantū seu attramentum sutoriū, squama aris, chalcitis, mysi, & fel porcinū. Pumex præterea torrefactus nō inutiliter uino leuigatus illinitur. Fel quoq; caprinum cū succo artemisiæ, & melle mixtū inungendū. Est & hoc efficax medicamentū, quod accipit: Attramēti sutorij. 3. gummi 3 i. f. leuigata uino illinātur. & hoc, quod recipit: Attramēti sutorij, gummi, salis ammoniaci, singul. 3 i. Hæc trita in aceto, in collyria digerātur, ut cū usus expostulat, adhibeātur. Aliud laudatū. Calcitidis usta, donec in prunā cōuersa sit. ʒ. f. croci ʒ. i. Tertio & exicato, & utere, hoc nimirū puluere unguē affricās. Præstantissima enim sine liquo re detrita, siue instar pulueris inspersa & affricata collyria. Mirifice etiā cōducūt testæ sepiæ cū sale ammoniaco tritæ, & applicatæ. Hæc collyria commemorasse sufficiat, quod quisq; possit sibi tā è Græcis quā Arabib. autorib. cōplura eius generis medicamēta citra laborem comparare.

Localia.
Fomentū,

Collyria.

De phlyctænis. Cap. XXXVII.

Φλυκταῖναι pustulæ sunt exigue, ueluti quædā bullæ supra corneā potissimū tunicā eminētes: quales ijs potissimum accidunt qui ex anthematis affligūtur. Sic dictæ ἀπὸ τοῦ φλύειν, hoc est, ab ebullitione & feruore. Barbari uescicas nominant. Color phlyctænarum uariatur, prout in

Phlyctæ-
næ.
Vescicæ.
Color phly-
ctænarum
quare va-
riatur,

h s super

- superficie, aut profundo cornea fiunt. Nam cum cornea tunica ex quatuor ueluti membranulis tenuissimis cōstet, fit ut interdum sub prima phlyctæna oriatur membrana, unde etiā colore nigrior apparet. Interdum sub secūda aut tertia, quæ & cālidior spectātibus offertur, quoniā in profundo occultatur: natiuus enim phlyctænæ color niger est, cornea uerò
- Causæ.** tunica ueluti cornu pellucida est, & candicat. Quanto igitur phlyctæna profundior fuerit, tanto candidior apparebit
- Notæ.** magisq; dolorifica, & molesta. Notis ad mali cognitionem nihil opus est, quod aperto oculo satis appareāt phlyctænæ.
- Curatio.** Quod ad curandi rationē attinet, ægri parum loquātur, euitentq; sternutationes, iram, spiritus detentionē, nimium splendorem: deinde cibo & potu utantur exiguo. Si plenitudo fuerit totius corporis, etasq; & alia permiserint, uena humeraria superior secanda erit, potissimum si phlyctæna magna fuerit, & rubor accesserit. Aliū quoq; clystere acri citabimus, ut humorum defluxus deorsum uertatur. Alius etiā cū iure galli, aut cnici cremore, aut aloë, aut alio quopiam simplicium aluum ducentium mouenda. Vehementiora uerò medicamēta purgantia, præsertim quæ stomacho aduersantur, euitanda. Ligamēta quoq; & linteorū lanæ uel applicationes ab eisdē remouebimus: sunt enim hæc infestissima non eis tantum, sed omni quoq; lippitudini ab acribus humoribus orta.
- Localia.** Locus igitur initio illinendus est, quādo inflammatio obsederit, leuibus qdē rebus, sed aptè adharētibus. Sumēda enim linteola tenuissima & molliissima, super quibus extends medicamenta, quæ instar fomenti aut cataplasmatidis adhibebis, & toti oculo appones cōplectendo malam, supercilium, & tempora: ac tamdiu permittes, quādiu humida fuerint. Vbi uerò aruerint, statim auferes, nouumq; rursus simili modo appones. Eligere autem oportet illa, quæ ad inflammationes
- conue

conueniunt, hoc est, quæ reprimunt, roburq; oculo adijciunt, atq; adeò ne malum latius serpat prohibeant, ut sunt ouorum uitelli, cum croco, & opij portiuncula, sapaq; & pane subacti, poma cotonea decocta & malicoria in aqua elixata. Obseruandū tamē unicè, quod antea quoq; monuimus, ne oculus arctè uinciatur: id enim aduersissimum est: imò sedata inflammatione cataplasmata & fomēta, utpote quæ grauitate sua ledunt, remouebis. Quare alij malunt liquidis collirijs uti, quale hoc est, quod accipit: Licij, croci, utriusq; 3 f. 4. Collyrium catiæ 2. liquoris stillaticij rosarū 1. Commixtis omnibus fiat collyrium, de quo guttatim in oculum instilletur. Si fomenta applicantur, obseruandū erit ut principio tepida sint: calidiora enim inflammationē exacuunt. Transacto initio balnea, ceteraq; calefactoria conceduntur, quæ reliquum discutere ualēt. Quare non inutiliter oculus decocto fœnograci, Fomentū seminis lini, meliloti, & similium fouetur, aut de eo guttatim in oculum instillatur. Toto curationis tempore à uino abstinendum, & decoctum cinnamomi potandum, cibiq; molles, & qui faciliè concoquantur, assumēdi. Quod si phlyctæna ob multitudinem rumpatur, aut propter acrimoniā erodat, ut inde membrana ulceretur, peculiare curandi rationē requireret, quam sequenti capite docebimus.

De ulceribus oculorū. Cap. XXXVIII.

VUlcerata nunc in adnata mēbrana, nūc in cornea, interdum etiā in palpebris, & angulis oculorū fiunt. Accidunt nonnunquam à causa externa, ictu nimirum, concussione, & ijs similibus. Magna uerò ex parte ab interna causa, puta acriū humorū erosione. Si à causa externa, quā primitiuam hodie nomināt, ulcus exoritur, facile ē sermonibus Causæ Signa ægri cognoscitur. Si uerò ab acribus humoribus, ē pruritu, dolore

Quæ vice dolore, ac punctione, promptè sciri potest. Caterum ulcera
 ra periculo in adnata mēbrana oborta, non ita sunt pernicioſa periculoſiora.

Curatio. Siue autē in adnata, siue in cornea, siue in palpebris, siue in
 angulis, siue in quacūq; oculi parte ulcus fieri contigerit, cō-

Venæ se-
 ctio. Porcio. Reuulsio. muni consilio curabitur, quemadmodum reliqua totius cor-
 poris ulcera. Corpore itaq; pleno existente, à uenæ humera-
 lis eiusdem lateris sectione curationē auspicabimur. Si uerò
 ab humorum acrimonia ulcus fuerit exortū, purgantib. me-
 dicamētis utemur, & clysterib. aluum eluimus, atq; humorū
 defluxum ad inferiora auertemus. In quem usum, inferiorum

Localia. etiā membrorum frictio plurimū conferet. Quod ad localia
 attinet medicamenta, ob partis affectæ naturā quā leuissi-
 ma adhibenda sunt. Si itaq; inflammatio adhuc circa oculum
 existat, aut quisspiam etiā dolor, oculo per initia collyriū al-
 bum muliebri lacte detritum, immittendū erit. Oculus etiam
 oui albumine irrigandus, & illimēdus linimēto, quod ex ouo
 simul cum uitello ac rosaceo, & uino tepesfacto conficitur,
 excipiturq; lana & applicatur. Subsequētibus diebus foue-
 bis rosarum aut meliloti decocto, instillabisq; lac mulieris
 cum ouo tepesfactū. Linimentis præterea utēris, quæ ad in-
 flāmationes descripta sunt, præsertim quod ex capitibus pa-
 paueris, meliloti: & pane præparatur. Leuia tamē sint lini-
 menta, & superior tantum palpebra illinatur, ut commodè
 aperiatur oculus ad defluendas lachrymas excernendas. At
 si ulcus sordidū fuerit, mulsæ mediocriter aquosa, & fœno-
 græci decocto utemur per se, aut adiecto quopiā mellis. Fœ-

Fœno-
 ci succus, quem bar- nogræcum autē prius diligentissimè purgari oportet, dein-
 de plurimū ablui, postea in aqua dulci purissima die ac no-

cte

ste malefactū in fictili exactè decoquitariq; in decoctione
 uas aeneū. Postero die effusa priori aqua, & alia pura effusa,
 ad ignē splendidum fumo carentem decoquito. Ideo uerò pri-
 mam & secundam aquam abiicimus, ut omnis inde amaritu-
 do eximatur. tertio igitur purissima aqua adiecta, & exqui-
 sitissimè operata, hanc ad liquidioris mellis consistentiā de-
 coquito, inde per linteum excolabis; scēnogræcū nequaquam
 exprimens, sed eo tantum succo cōtentus, qui sponte defluet,
 quem ad sordes depellendas seruabis. Seruari autē in alterā
 diem, uel quā longissimè in tertiam potest: ulterius enim
 moratus acescit. Vbi ulcus satis purgatū fuerit à succo scē-
 nogræci abstinebis, & ea quæ glutinandi ac incarnandi uim
 obtinent, admoueabis. E quorum numero est hoc è thure col-
 lyrium, quod accipit: Ammoniaci, sarcocollæ, utriusq; 35.
 thuris 310. croci 3.2. Omnia leuigata, ac scēnogræci succo
 excepta, in collyria digerantur. Vlceribus iam incarnatis, &
 ad planiciem (quoad fieri potest) redactis, collyria quæ ad
 cicatricem ducunt, admouēda erunt. quale est, quod accipit:
 Pompholygos elotæ 33. plumbi usti 32. croci 31. squamæ
 æris 32. gummi 33. omnia leuigata, & aqua pluuiali ex-
 cepta, digerantur in collyria ad usum.

Collyrium
è thure.

Collyrium
ad cicatri-
cem ducēs.

De cicatricibus & albuginibus oculorum

Caput XXXIX.

POST curationē ulcerū oculorum, dum continui eorum
 solutio restituitur, cicatrices illis innascuntur quæ alio
 nomine albugine uocantur. Hæ autem duplices sunt. quædā
 enim in summa oculi superficie consistunt, & hæ quidem
 Græcis νεφέλαι & ὄλαι, Latinis autē nubecule, & cicatri νεφέλαι-
 ces, & albugines tenues dicuntur. Quæ uero radices aliis α-
 λουκώ-
 γūt, hæς αλουκώματα Græci, albugines crassas Latini uocāt. ματτα.

Cicatrices
oculorum
siue albu-
gines.

¶Ceterum

Albugines *Ceterum hæ oculi cicatrices rectè albugines dicuntur, omnes*
vnde dicitur *enim cicatrices in nigro oculi candidæ uidentur: densata enim*
cornea tunica subiectus cæruleus color nō amplius transpa-
Victus, *ret, eminētes uero precipuè albescunt, planæ minus cādicant,*
cauiores parti nigræ oculorū quodāmodo assimilantur. In exa-
terēdis aut cicatricibus unicè opus est cōgrua uictus ratioe,
ut cōtemperata materia, probusq; succus per totum cor-
pus diffundi possit. Ab omnib. igitur acribus, salsis, & crassi
succi, ac uini copia abstinere oportet, maximè uero conco-
ctioni studere. rebusq; boni succi mediocriter uesti. Locus
autē malè affectus illinēdus est ante cibū, hesternæ cœna exa-
ctissimè concocta, perceptaq; capitis & uniuersi corpo-
ris leuitate, aluoq; exonerata. Neq; statim inungēdus est qui
Curatio, *modò à lecto surrexit, neque ante cœnam. In curandi ratio-*
ne in primis sunt euitanda medicamenta quæ cicatricem exa-
coriant. Nam ex illorum acrimonia defluxus concitantur,
& inflāmationes, atque interdū dissolutus cicatricibus pro-
fundantur ulcera. Eligenda igitur sunt medicamenta expur-
gantia & extergentia, mixta cum ijs, Aëtio teste, quæ mode-
ratè adstringunt. Inter ea autem medicamenta quæ recentes
cicatrices abstergunt, laudatur equinum lac cum modico
melle assiduè illitum. Anagallidis item cæruleum florem
ferentis succus, cum melle oculo instillatus. Mentæ etiam
succus mirum in modum confert. Minoris centaurij suc-
cus cum melle, Vetiustiores æs solum, aqua tritum modo
collyrij, extenuat. Iisdem butyrum priuatim illitum extre-
mè conduxit. Rumicis quoque domestici, & plantaginis se-
men in fictili crematum, tritumq; exactissimè. Item sepie te-
sta cōbusta, & cū melle in pollinē redacta. Valet & hoc ad
albugines exterēdas, quod accipit: Chelidonij sicci, & succi
eiussdē exiccati, utriusq; 3.3. seminis ameos, sacchari, utriusq;

Collyrium
aridum,

3.2. Terantur omnia, fiatq; pulvis subtilissimus, oculisq; inspergatur. Præstat tamē ijs adijcere aliquid adstringentiū, ut est sarcocolla, aut thus. Cornu autē cerui & caprarū, cōbusta, sine omni erosionē abstergūt. Aloë uero mixtæ cuiusdam facultatis est, sicut & rosa: inest enim illis quedā amaritudo qua extergūt, inest & adstrictio, qua unire possunt, & ad cicatricē perducere. Adijcianus iā dictis collyriū adhuc unū Aliud, aridū, quod recipit: Osium sepiæ, sarcocollæ, aristolochiæ, rotundæ, myrrhæ, spumæ, nitri, sacchari, singulorū 3.2. Tritis omnibus fiat pulvis. Hæc commemorasse sufficiat, quia plura alia apud diuersos autores conscripta reperiuntur.

De sugillatis. Cap. XL.

Υπόσφαγμα & ὑπόπυον dicitur, quando propter ictum aliquē fractis aut contusis uasis, intra tunicas oculorū sanguis colligitur, & in extima parte ueluti sanguinis pūcta apparēt. Latini sugillationē & sugillata uocāt. Recentioribus medicis macula oculi appellatur. Cause ex iam præmissa descriptione satis patent. Signa etiam nulla requiruntur, quod malum uisui statim se manifestet. Porro cū sanguinis effusio ē uenis facta est, accidit ut progressu temporis liuescat & denigretur, exiguis nimirū grumulis ex sanguine in multas oculi partes disperso coactis. Quare meritō ad eius curationem statim festināt medici, priusquā denigrescāt, eō sanē curationis consilium dirigentes: ut sanguinem dissipēt: nō ignari, quod sanguis qui in grumos coërit, egere rimē possit discuti. Quia uero tunica uenularū, ex quib. sanguis exilit, cōtūditur ac rūpitur, parū qd ex adstringētibus ad discutientia admiscetur. Si enim solā discussoriā facultatem haberet medicamentum in principio admotum, non solum quod effusum est discuteret, sed & per fissuras aliquid

ὑπόσφαγμα.
ὑπόπυον)
Sugillata,
Macula
oculi,
Cause
Signa,

Curatio,

Localia.

aliquid sanguinis qui in contusis uenis continetur, extraheret. Postquam uero in naturalē statum redierint uenula, citra adstrictionem ad discutientia medicamenta uenire tempestiuū est. Quare uenæ sectione, si opus fuerit, aut purgatione, si ita uisum fuerit, præmissa, statim sanguis palūbi uel columbæ, ex teneris præcipuè alis expressus, aut lac muliebres, cui thuris paululū sit adiectū, instillandū. In eum quoq; usum albumen oui tepesactum oculo infundendum. Atq; amplius lana munda exceptum, & superimpositum. Rectè autē ualet & luteum oui tosti, cum uino illitum: aut melilotū coactum ex uino eodē modo impositū. Insuper rosarum folia & flores seorsim, & cum uino trita, tenuiq; polenta, aut brassicæ folia illita profunt. Recens etiā caseus, & qui salem nuper accepit, eò quod mixtam facultatem, emplasticā & obturantem per se, & discutientem & aliquantulum adstringentem ex sale habeat, initio illitus confert. Huius generis sunt, crocus, melilotum, & rosa. Hæc autē antequam admoueantur, oculus decocto meliloti & scænochræci fouendus erit. Conducit autē bis in die medicamētum applicare, ac simul prius decocto iam dicto calido per spongiam mollem fouere. Vbi uerò iam sine inflammatione oculus fuerit, & sugillata uetustatem contraxerint, ex solo scænochræci decocto oculi fouendi erunt, & discussoria citra ea quæ adstringendi facultatē obtinent medicamenta, sunt admouenda. Inueteratis uerò sugillatis, & quā nigrescunt, cōuenit raphanus applicatus. Discutiens etiā medicamētum est myrrha, hyssopum, scænochræcum, chamæmelum, folia lilij, & alia quæ in libro primo De compos. medic. recensuimus. Ex ijs studiosi parabunt medicamenta idonea, quorum etiam copiam apud Galenum lib. 5. De compos. medic. secundum locos inuenient.

De

De pure sub cornea. Cap. XLI.

ΠΥΩΣΙΣ ἢ ὤφτις malum Græcis fit, quando πυῶσις pus sub cornea nunc altius, nunc in summa superficie colligitur humani unguis specie. Hinc est quod idem malum Græcis etiam ὀφθαλμία nominetur. Aliqui interpretes ungulam, barbari saniem intra corneam uocant. Fit interdum ab ulcere, interdum etiam sine ulcere si capitis dolor, aut lippitudo, seu inflammatio præcesserit, ob cuius ingentem inflammationem disruptis uasis sanguis effusus suppuretur. Signa partim nunc dicta sunt, quibus accedit pulsatorius dolor, ac circa uniuersum oculum rubor, & temporum dolor. Initio curationis, si inflammatio affuerit, aluus clysteri abluatur, & inaniatur. Dein, ubi nihil obstiterit, sanguis à superiori cubiti uena, quam humeralem uocant, mittatur, & cucurbitule occipitio, aut sanguisugæ temporibus affigantur. Quibus peractis, medicamentis ad inflammationem idoneis, & antea commemoratis, utendum. Inflammatione sopita: aut nulla penitus existente, locum spongijs, primo moderatè, deinde adiectis quibusdam, decocto nimirum fœnogræci & similium, paulatim progrediendo, magis ac magis fouebimus. Ad curationem autem huius mali mediocriter discutientia medicamenta, ut est aqua mulsa, fœnogræci succus, & huiusmodi, utilia sunt. Quæ enim uehementius discutiunt & exiccant, statim quidem ea quæ tenuia sunt, euacuant: reliquum uerò crassius redditum, cogunt atque exiccant, ut uix extirpari queat. In summa, si malum citra ulcerationem consistit, ualent medicamenta, quæ suprâ in capite De pterygio dicta sunt. Si uerò cum ulceratione, tunc ea quæ mediocriter discutiunt, quorum multa in superioribus recensuimus, magis conueniunt.

Sanies intra corneâ
Causâ.

Notæ.

Curatio.

Discutientia.

De suffusione. Cap. XLII.

ἰσώχου - **Y** Γόχουα καὶ ἰσώχους Græcis, suffusio Latinis, ca-
 ταράχῃ barbaris dicitur, estq; humoris lenti & gla-
 Suffusio. ciei modo cōcreti, inter corneam & crystallinum humorē
 Cataracta. affusio, quo uisus eatenus saltem impeditur, ut nō possit di-
 Causæ. scretas rerum species & colores oculus apprehendere. Eius
 mali causa est, ut ex iam dictis constat, humor crassius iuxta
 pupillam inter corneam & crystalloidē collectus. Fit etiam
 Pau. lib. 6. cap. 21. autore, ob frigiditatē & imbecillitatē spiri-
 tus uisorij: atq; idcirco senibus, & ijs qui longis morbis labo-
 rarunt, magis euenit: ob uiolentū deniq; uomitum, & ictum.
 Notæ. Inchoante malo tanquam pusilli culices, uel alia lucentia,
 caliginosaq; corpuscula assidue præ oculis obuersari uiden-
 tur. Quibusdam ueluti lanarum filamenta, & tele aranea-
 rum quibusdam circa lucernas circuli offeruntur. Aucto ma-
 lo, symptomata quoq; augētur. Hæc autem nonnunquā pro-
 priæ noxæ oculi, nonnunquam uentriculi passioni feruntur
 accepta. Quare inter hæc duo discrimen habendum est. Si
 enim uisa ob humorum in uentriculo contentorum uitium
 oborta fuerint, utrique oculo similiter accidunt. Quæ uerò
 per propriam passionem apparent, neque incipiunt simul
 in utroque, neque similiter apparent. Deinde ex tempore
 quoque ipso distinguuntur. Si enim tribus quatuor ue, aut
 etiam pluribus mensibus suffusionis symptomata apparue-
 rint, contemplantiq; tibi pupillā, nihil tenebrosum uideatur
 ab ore uentriculi passionem procedere inuenies. Si uero non
 ita multum temporis intercessit, querendum est imprimis,
 utrum ex quo incepit malū, singulis diebus perpetuò huius-
 modi apparitio perseuerauerit, nullo scilicet interueniente
 die, qui omni querela caruerit, an diebus quibusdam laborās
 exactē

exactè uideatur cõualuisse. Nam assiduitas suffusionem por-
tendit. Intermissio uerò, quod uitium à uentriculo prodierit,
suspicionem excitat. idq; magis, si ubi quis perfectè conco-
quens, nullum sibi uisum apparere fatetur. Sed multo ma-
gis, si quum apparuerāt uisa, mordicus in ore uentriculi do-
luit: maximè uerò, si post hæc uomendo, eiecta re mordente,
mitigata fuerint symptomata. Vbi uero altera pupilla tene-
brosior, aut turbidior, aut nō exactè pura uidetur, suffusio-
nis esse iniuiū censendū est. Victus ratio in hoc malo sit atte- Victus
nuatoria, & exiccatoria. A uino abstineat in tota medica-
tione æger, & pro eo decoctū cinnamomi, aut aquā mulsam
bibat. Euitet omnia caput replētia. A balneis sibi caueat, nisi
uel lassitudinis, uel cruditatis caussa sint necessaria: atq; ne tū
quidem in aëre balnei diutius immorari, neque in solio per-
sistere, sed sensim quidē ingredi, cōfestim uero egredi oport-
et. Fugiat pisces, fructus, & quicquid corpus humectare po-
test. Curadi ratio, nisi qd obstat, à sanguinis missione inchoā-
da. Vena autē cubiti secanda exterior, seu humeralis. Acribus Curatio
etiā clysteribus, & purgationibus utendū, quorū formulas è Venæ se-
superioribus petent studiosi. Neq; negligenda sunt medica- tio.
menta extenuantia, tam simplicia quā composita, qualia Acres cly-
multa recēsuimus in superioribus capitibus. Inter cætera ue- steres.
rò hoc potissimū confert, quod accipit: Oxymelitis scylliti- Purgatio
cij ꝯ i. mellis rosacei ꝯ ꝑ. liquoris stillaticij sceniculi, betoni- nes.
cæ, maioranæ, singul. ꝯ i. Cōmixtis omnibus fiat potio. Inter Mecicamē
ea quæ purgant, non postremum esse hoc in malo uidetur tum exte-
illud, quod recipit: Catapotiorum cochiorum, lucis, sine nuans.
quibus esse nolo, singul. ꝯ i. agarici in formam pastilli reda-
cti ꝯ ꝑ. cum stillaticio liquore sceniculi fiant pilulæ. Post
uniuersi corporis purgationem cucurbitulæ cum scarifica-
tione occipitio sunt affigendæ, utendūq; per interualla apo-

phlegmatismis, & ijs quæ per nares purgant, quorum formulas in præcedentibus capitibus & in libro secundo de cõ-
 Cauteriũ pos. med. posuimus. Cauterium quoq; quale est quod capite
 19. descripsimus, occipitio, aut post aures apponendum erit.
 Oculis autem medicamenta tum simplicia, tum composita,
 quibus discutiendi uis inest adhibenda: ut est mel, fœniculi suc-
 cus & liquor stillaticius. Inter composita uerò hoc potissi-
 mum conducit, quod accipit: Liquoris stillaticij fœniculi ꝑ
 Collyrium 2. liquoris stillaticij chelidoni maioris, euphrasie, utriusq;
 ꝑ 1. ꝑ. sagapeni 3 1. pompholygos 3 2. misce, fiatq; collyrium.
 Præterea omnia fellis genera per se, aut cum fœniculi succo
 illita prosunt. Myrrhæ quoq; & piperis partes æquales cū
 melle. Atq; ea quæ nunc commemorauimus præsidia, suffu-
 sionem recentem, & quæ nondum radices egit, curare pos-
 sunt. Vbi uerò uetusta & perfecta fuerit, sola chirurgia sa-
 nabitur, quam Paulus loco antea citato abundè docet.

De dilatatione & diminutione pupillæ.

Cap. XLIII.

μυδρίασις *σις.* **M**ΥΔΡΙΑΣΙΣ Græcis, dilatatio aut effusio pupillæ Lati-
 nis, est, quando pupilla colore quidem nihil euariat,
 sed multo quàm cõsueuit latior fit, ut interdum iridis circulo
 appropinquet, quæ interdum omnino uisus impeditur, inter-
 dum permultum, ut uideat quidẽ æger, sed obscure. Contra-
 rium huic malũ, in quo pupilla angustior, obscurior, rugo-
φθίσις. *causæ.* siorq; fit, Græcis ΦΘΙΣΙΣ. Latinis tabes & diminutio pupillæ
 uocatur. Recentiores cõstrictionẽ pupillæ nominant. Dila-
 tatio accidit ob humore excrementiciũ, qui cõfertim uel sen-
 sim affluens uueam extendit. Diminutio uerò, propter den-
 sationẽ à siccitate ortam. Hinc est, quod magna ex parte pe-
 riculosas imbecillitates ab inanitione factas, & uehemen-
 tissimos

tiſſimos capitis dolores comitetur. Signis ad mali dignotio- Notæ.
nem nullis eſt opus, quod uiſui expoſitum ſit. Præterea qui
dilatatione pupillæ laborant, ijs omnia quæ uident, propter
uiſilis ſpiritus diſperſionē, minora apparēt. Cōtrā qui dimi-
nutione eiſdem afficiuntur, ijs propterea quod cogatur ac
denſetur ſpiritus, uiſilia ueris maiora eſſe uidētur. Viſtus.
Viſtus ratio in dilatatione ſit extenuatoria, aluoq; emolliendā idonea.
A uino uſque ad exactam ſanitatem prorsus abſtinendum.
Deambulationes lenes ac longæ in obſcuro factæ cōducunt.
Ad balneum crebrò accedendum non eſt: atq; ubi acceſſerit
eger, capitis lotioni parcendū. In diminutione utendū uiſtus
ratione hume etante, nimirū ſorbtionibus boni ſucci, uinoq;
flauo & odorato. Cibū ſomnus mox ſequatur. Balnea quoq;
profunt, & capitis cum calida aqua irrigatio. Qui dilatatio- Curatio di-
ne pupillæ infeſtantur, ijs primū ſanguis à uena cubiti ex- latationis.
teriore mittendus, aut purgantia medicamenta propinanda.
Quæ ſi fieri nequeunt, uenas in angulis oculorum diuidere
oportet: deinde cucurbitulā occipitio admouere. Omni præ-
terea ſtudio annitendū, ut materia ad inferiora trahatur. Ma-
rina quoque aqua frontem & oculos perſundere conuenit:
hyeme quidem tepida, æſtate autem frigida. Imò & facies
tota in eadem aqua mergenda eſt, ibiq; apertis oculis aliquo
tempore detinenda. Quod ſi deſit marina, dulci aquæ quid-
piam ſalis adiſcito, aut poſcam aquoſam ſumito. Cæterum
medicamētis utendum ſubadſtringentibus ſicut roſa, croco,
thuris cortice, pompholyge, acacia, & ijs ſimilib. Vehemē-
tiora enim & acriora humorum copiam attrahunt, atque
adeò membranas diſtendunt, latioremq; pupillam efficiunt.
Vehementer autem adſtringentia, & nimium refrigerantia
membranas indurāt: emplaſtica uero eaſdem craſſiores red-
dunt. Pupillā autem plus æquo cogere & coarctare omnino

- inutile est: nam ita tandem diminutionem incurreret. Ex medicamentis itaq; moderatè adstringentibus & exiccantibus collyria huic malo idonea parantur. Tale autem est, quod
- Collyriū.** recipit: Croci, aloës, myrrhæ, singul. 3 2. pompholygis lotæ, licij, utriusq; 3 1. uini optimi 3 2. mellis 3 3. Crocus primū ex uino modico teritur, deinde aloë, myrrhæ, & alia. Vbi crassitudinem acceperint, mel additur. Vnita in uitreo uase reponuntur ad usum. Diminutioni contrariam adhibere oportet curationem, superiora membra exercendo, humeros scilicet & brachia, cum spiritus detentione, caputq; & faciem diligenter fricando, extremisq; digitis oculos contrectando, ac calida faciem fouendo, deinde caput unguento aliquo eorum
- Collyriū.** quæ moderatè calefaciant, sicut irino unguendo. Tum palpebris paululum diductis illinendū erit oculo acre & rarefaciens medicamentum, quod humores possit attrahere, quale hoc est, quod accipit: Ammoniacy 3 1. licij 3 3. croci 3 2. æruginis 3 1. Tritis in aqua, & subactis utitor.

De visus obscuritate. Cap. XLIIII.

- ἀμαύρωσις.** **A**μαύρωσις Græcis, obscuritas uisus Latinis dicitur. Est autē omnimoda, uel maxima ex parte uidendi interceptio, sine manifesto pathemate circa oculum apparente: pura enim undiq; pupilla cōspicitur. Hæc interdum paulatim irrepit, interdū etiā repente ingruit, ut perquā modicum, uel nihil omnino cernatur. Obscuritatis itaque sensim irrepētis causæ plurimæ sunt. uel enim spiritus crassescit, uel tunica densantur, uel humores oculorū nō crassescunt tantū, sed etiā lentiores fiunt. Longus præterea ac diuturnus morbus, & ingens moeror, ob humorū dissipationē, quam ueluti oculi corrugatio sequitur, uisus obscuritate efficiūt. Repentina uerò nerui uisorij, propter crassos lentosq; humores
- Causæ obscuritatis sensim irrepentis.**
- Repentine obscuritatis causæ.** confer

confertim in ipsum incidentes, obstructio, uel eiusdem resolutionis causa est. Præcedūt hoc malum assidue cruditates, uim meri potio, moraq; sub sole, capitis calefactio aut refrigeratio, post cibum continuæ lectiones, uel balnea, uomitus, cōcubitus importunus & immoderatus, uiolenta spiritus detentio: quod tubicinis frequentissimè accidit. Hæc atq; ijs similia si fuerint moderata ἀμβλυωπία, hoc est, hebetudinem ἀμβλυωπία efficiunt: immoderata uerò, obscuritatē. Porro accidit nonnunquā obscuritas ob uehementē capitis percussione, aut casum à sublimi loco, neruo uisorio resolutio aut contuso: uel quæ omnium benignissima est, ob ingentem cōcussione delapsa humorum multitudine, & neruum uisorium obstruente. Neruo resolutio aut tardè, aut nihil mouetur oculus. Si uero propter uiolentum capitis ictum, uel casum à cerebri cōnexionē abscindatur, primum quidē oculus redditur prominentior, postea etiā excuatur, & nō aliter. At ubi propter crassorum lentorumq; humorū multitudine, absq; alia causa nerui cavitās obstruatur, grauitas capitis præcipuè in radicibus oculorum cōsequitur. Si igitur repente inuaserit aliquem uisus obscuritas, & æger plenitudine laborauerit, cuiusbiti uenam anteriorem, aut mediam secare oportet: tūc enim expeditissimum præsidium sanguinis missio est. Aliquod deinde diebus interiectis, iubet Aëtius, fasciam collo neccentes cōstringere uenas, ijsdem tumefactis iterum soluere, & idem tertio repetere ad spiritus agitandos, & humorum obstructiones uiolenter cōcutiendas. Postea à tumefactis angulorū naso adiacentium uenis utrinq; sanguinē copiosè mittendum esse præcipit: aitq; se quādoq; tres heminas ab ijs ipsis uenis eduxisse. Quibus omnibus peractis, cucurbitulā cum scarificatione occipitio affigere oportet. Cōtingit enim plerūq; ut cucurbitula adhuc in hærente, homo repente respiciat.

Notæ.

Curatio re
penting o
bscuritatis
visus.
Venæ sec
tio.

Cucurbitu
la.

- Hirudines.** Hirudines etiam in hunc usum ad mouere temporibus conuenit. Neq; iam dictis praesidijs tantum contenti erimus, sed totum corpus quoq; purgabimus medicamentis, quae crassos & lentos humores educere possunt. Postea apophlegmatismis, sternutamentis, & id genus alijs medicamentis caput expurgandū, qualia multa supra, ubi de capitis egimus dolore, produximus. Sinapismi etiā usus in capite nō erit alienus, & adurentia medicamenta, *κρυπτα* Græcis dicuntur, occipitio admota. Collyria deniq; è succis aut stillatitijs liquoribus foeniculi, rutæ, chelidonijs, melle, pipere longo, aloë, pōpholyge, myrrha, ammoniaco sale, & similibus parata, cōducūt.
- Obscuritas visus,** Si uero uisus obscuritas sensim accidit, itidē sanguinē ab articularibus uenis mittemus. Et si ager pauci fuerit sanguinis, id protinus ab initio facere oportet. Sin multi, ex humerali primū sanguis auferendus. Deinde cucurbitula cū scarificatione occipitio affigenda. Purgare etiā corpus conuenit. Perseuerante quoq; morbo caput per errhina, & alia paulo antē cōmemorata purgabimus. Illitio autē oculorum primo quidē simplicioribus iam recensitis fiat, postea ad cōposita transeundum, quale est quod accipit: Liquoris stillatitij betonicae, rutæ, uerbenacæ, chelidonijs, euphrasie, foeniculi & rosarū, singul. ʒ i. piperis longi ʒ i. aloës ʒ i. myrrhæ ʒ i. pompholygis ʒ i. Arida terantur minutissimè, & formetur collyrium. In uictus ratione in utroq; sanè malo concoctionis curam unicè habere oportet. Enitendum etiam, ut alimentis præcipuè aluū emolliamus. Exercitio inferiorum partium, ut humores deorsum trahantur, utendū: pluribusq; deambulationibus in obscuro loco. A uino abstinendum, & aquæ potio uiriliter toleranda. Omne crassioris succi alimentum, assiduumq; cōcubitum, & capitis insolationē, balneaq; & meridianos somnos uitare cōuenit, neq; à cibo nimis agitari,

tari, neq; legere, aut scribere. Animi perturbationes, ira, & curæ ingentes, timores, & eiusmodi fugiendæ, præsertim à cibo. Vitandæ etiam assiduæ uomitiones. Confert autem quotidie frigida, præsertim pluuiâli aqua faciem abluere.

De nyctalopis. Cap. XLV.

NΥΚΤΑΛΩΠΙΣ Græcis, nuscitiosi Latinis, sunt qui interdiu quidem uident, sole uerò occidente obscurius, sed noctu omnino nihil. Plinius & alij Latini malum ipsum nocturnam cæcitudinem uocant. Accidit ob capitis imbecillitatē, præsertim propter uisoriij spiritus, reliquorumq; humorum, ac tunicarum oculi crassitudinem. Malum ex egrotantis querimonia innotescit. Victus ratio in uniuersum sit extenuatoria. Curatio, si æger boni habitus fuerit, à sanguinis missione auspicanda. Incidēdæ uerò in cubito humeralis, et in angulis oculorum uenæ. Si uitioso succo abundauerit, idoneo medicamento purgetur, aut per clysterem alius inanietur. Post totius corporis uacuationem apophlegmatismos adhibebis, ac per nares materiâ attrahes, sternutationesq; cōcitabis. Præter autē alia medicamenta, quæ suprà cōmemorauimus, unicè hoc confert, quod habet: piperis, staphysagriæ, utriusq; ÷ 2. sinapi ÷ 4. Terito & cribrato, deinde cum succo radicum betæ ad mellis liquidi consistentiam excipito. Hæc ubi simul subegeris, naribus admovento, iubeq; ut per nares attrahantur, idq; diebus quinque aut septem efficies. Insuper ante cibum hyssopus, origanum, ruta uel potui detur. Si ijs præsidij morbus nō propulsabitur, iterum purgationem moliemur. Commendat autem unicè Aëtius hoc quod habet: Scammonij 3 ℥. castorij ÷ 1. salis 3 ℥. idq; in robustioribus. In imbecillioribus uerò scammonie ÷ 1. sufficit. Hæc purgatio, ut idem testatur, sæpè repentinam sanitatem

ΝΥΚΤΑΛΩΠΙΣ.

Nuscitio si.

Nocturna cæcitus.

Causa.

Signa.

Victus.

Curatio.

Venæ sectio.

Purgatio.

Errkinon.

Purgatio iterata.

Acrida me-
dicamenta
assidua es-
se non de-
bent.

tatem restituit, aut morbum magna ex parte leuauit. Post dies paucos iterum exhibendum medicamentum, quod pituitam simul & bilem euacuet. Oculis autem mel despumatum illinendum, & ad iniectum humorem retinendum oculi claudendi. Alumen etiam cum melle tritum illines. Vel cyclamini recentis, uel ceparum succum cum melle, aut lacte mulieris. Acridum tamen medicamentorum assiduus usus remouendus est: sicut antiquissimum oleum nunquam omitendum. Traditur à multis conferre sic laborantibus iecur hircinum assum, & cum sale absq; oleo feruens comestum. Quidam & sanie seu aquoso humore à iecore dum torrefit effluente, illinendos iubent. Alij idem iecur elixantes, apertis oculis uaporem hinc eleuatum excipiunt. Elaterium quoq; è melle per interualla illitum prodest. Præterea fel perdicis, aut hirci inunctum iuuat.

De expressione oculi. Cap. XLVI.

ἔκπρσις - **E**ΚΠΡΣΙΜΟΣ, hoc est expressio oculi, est malum, in quo sic exprimuntur oculi, ut exerti perseuerent. Recitio = Exitus oculi, res exitum oculi appellant. Accidit ijs præsertim, qui in athleticis certaminibus suffocantur, aut qui aliam ob causam strangulantur. Mulieribus etiã nimio pariedi dolore afflictis. Ob plurimum etiã defluxum confertim à capite irruentem. Signa. Vbi à strangulatu, aut doloribus partus euenit malum, è sermonibus agri cognoscitur. Si uerò propter humorum copiã, capitis aderit grauitas, & pupilla auctior erit. Porro si ob strangulatum oculus exprimat, cubiti uenam incidere oportet. Sin ob humores multos acciderit oculi expressio, purgante medicamento utendum erit. Quod si ob pariendi laborem exprimi oculos cõtigerit, uteri purgationes superuenientes, frequenter malum sanant: ijs igitur opitulari conue

conuenit. In uiris autem, si post sanguinis missione, aut purgationem malum non remiserit, cucurbitulam occipitio defigere commodum est. Oculo uero lana melle illita cum modico croci apponenda est, linteolumq; duplicatum supra suauiter illigandum. Confert ijs aqua marina frigida fronti superfusa. Item quaecunq; alia, quæ reprimere & contrahere possunt, ut est polygonon, balaustiū, rhu obsoniorum, sidia, galba, & ijs similia, quæ in libro primo De compositione medicamentorum, cap. 7. commemorauimus.

Cucurbitula.
Localia.

De ægilope, Cap. XLVII.

Aιγίλω, Galeno lib. 5. De compos. medic. secundum αἰγίλω
 locos teste, est exiguum quoddam abscessui simile tuberculum inter nasi os, & magnum oculi angulum ortum, quod ruptum si negligatur, in fistulam abit, usq; ad os ipsum progredientē. Fit a uitiosis humoribus, in eam corporis partem delatis. Malum ex descriptione satis notum, ideoq; pluribus indicijs nō eget. Vitiū hoc propter corporum tenuitatem, & subiacentis ossis putredinē curatu difficile est. Non solum autem ob id ægrè curabilis est passio, sed & propter ea quod quum multa liquida medicamenta in experimentum adsumi possint, ea tamē nō tolerat pars ipsa: necessariō enim ex eis in oculū quid influit. Neq; ullo modo adherere eiusmodi possunt, nisi deligatura totum oculum cōplectatur, quam impossibile est tot diebus aliquē perferre posse, quot ad mali curationem requiruntur. Inchoante itaq; inflammatione, si corpus plenum fuerit, uenæ humeralis ē directo partis affectæ sectione utendum. Deinde repellere enitemur ijs medicamentis, quæ ad hoc institutum sunt idonea, quorum multa in præcedentibus commemorauimus. Si uero inflammatio perseuerauerit, discutientibus medicamentis, minimè tamē acribus

Causa.
Notæ.
Curatio.

Venæ sectio.
Repellentia.

Discutientia.

bus & mordacibus, succurrendum erit. Ab acrioribus enim medicamentis oculus simul infestatur & afficitur, inq; ipsa parte malè habente inflammatio augefcit. In hūc itaq; usum probè faciunt glaucium & crocus unā cum perdicij (parietariā hodie uocant) succo leuigati & impositi. Crebrò autē permutare hoc remedium oportet: etenim statim immutatū uim suā amittit. Scribit Alexāder Trallianus, se huius medicamenti subsidio usum adhuc inchoante agilope, & nondū in suppurationem conuersa, non solum puris generationem impediuisse, sed integræ sanitati restituisse. Præterea alica in aceto cocta, & probè trita, non solum incipientes, sed etiam in pus mutatos persanat, rumpitq; & ad os usq; descendit. Ruta satiuā unā cū lixiuio, quod primo distillauerit, cōtrita coctaq; & imposita, egregiè huic malo medetur. Mordax quidem inter initia, postea ocysimè mitescit, & ad os usq; permeat. Atq; illud mirandum, quod uel nullā planè, uel non turpem aut euidentē cicatricē post se relinquat. Porro cochleas cum testis suis tritas imposito: interdū aloë, uel myrrha admista, præsidium enim hoc antequā in pus uertatur, & postquā ruptus etiam fuerit, agylopern desiccet. Hæc si non

Chirurgia, contulerint, ad manus opera cōfugiendum. Chirurgicā itaq; curandi rationē ab Aëtio & Paulo petes. Hoc in loco malorum quæ in oculis accidunt curationi finē imponemus: reliqua enim ferè omnia eorundē uitia chirurgiam exigunt, quā attingere in his de medendi ratione libris non est consilium. Eam itaq; ab autoribus iam citatis petent studiosi.

De aurium dolore. Cap. XLVIII.

Causæ.
Refrigeratio.
Balnea frigida.

AVrium dolor aliquis ex refrigeratione, in peregrinatione à uentis frigidis excitatus: accidit. Aliqui etiam ex frigidis balneis, & ex medicatis aquis, in quibus nonnulli frequen-

quenter voluptatibus indulgentes lauant oriuntur. Nonnulli ^{Intemperies calida.} ex intemperie calida. Fit & auris dolor ex inflammatione, interim quidē si lius circa meatum auditorium cutis, interim etiam in profundo, quādo uidelicet auditorius neruus ad inflammationis affectum peruenerit. Qua autē ratione ^{Inflammatio.} inflammatio, particulas inflammas distendēs dolorē parit, eodem modo etiā flatulentus spiritus aut humor crassus & lentus ^{Flatus, vel humor crassus.} transitū non habēs, dolorē efficit. Saniosi deniq; ac serosi humores in corpore aurium generati, cōsimiliter ut mordaces ^{Saniosi ac serosi humores.} humores qui extrinsecus illabuntur, dolorē cōciliant. Auriū dolor qui frigiditati fertur acceptus, de egri sermonibus facile cognoscitur: & inde, quod dolor altē, citra grauitatem, uel distentionē, uel ardorem fixus sit. Qui ex calida intēperie ^{Feruidi.} ortus est, ex eo quod in illo feruoris cuiusdam sine grauitate ^{Inflammationis.} seu tensione sensus est, deprehēditur. Sim grauitas, distentio, simulq; calor & dolor pulsabilis, aut etiā febricula oboritur, inflammatione autē laborare censeto. Sola citra grauitatē ^{Flatus.} distentio spiritū flatulentiū, cui exitus nō patescit, indicat. Si ^{Humoris crassus.} uerō capitis ipsiusq; auditus grauitas affuerit, præcessitq; uictus ratio similis, crassi glutinosiq; humores dolorē faciūt. Victus ratio iuxta causæ diuersitatem, facile ex ijs quæ in superioribus dicta sunt, constitui potest. Quare nō est cur hāc ^{Victus} speciatim hoc in loco prosequamur. Caterum curandi ratio ^{Curatio.} pro causarū uarietate mutatur. Si enim dolor à sola refrigeratione oboritur, calefacientibus præsidijs quā celerrimē ^{Doloris frigidi.} curabitur, nempe oleo rutaceo, laurino, nardino, cicino, anethino, liliaceo, de euphorbio, & spicato. Quod si rutā quoq; oleo communi incoquas, uel piper, uel castoreum, magnum adferes præsidium. Oleum etiam in quo allium decoctum sit, uel cepa, instillatum mirificē confert. Sunt qui prægrandes cepas exculpentes, deinde oleo replentes, & inferuente cinere

cinere moderatè calefacientes, auribus infundant. Galenus lib. 3. De cōpos. medic. secundum locos, euphorbij perquam exiguam portiunculā plurimo oleo ueteri commixtam mirificè cōmendat, quod nimirum hoc medicamentum ex frigore cōtractos aurium dolores strenuè adiuuet. Manifestū uerò omnibus esse arbitramur, quod quicquid adhibetur, medicriter calidū esse oportet. Porro ubi aqua medicata circa auditorium meatū continetur, oleum quod sit tenuiū partiū assiduè infundere oportet, quo ipsum eluamus: deinde lana molli extergere, rursusq; infundere. Mitigat ipsos admodū oui candidū: item lac muliebre. Plurimū etiā prodest adeps anserinus, atque item uulpinus. Verū ad aquam copiosam euocandā nihil præstātius, quàm oris exuētio, quæ etiam per calamū canalem uel exugi & extrahi potest. Si quis etiā alteri pedi innixus, eiusdē lateris cum aure affecta capite parū per decliui saliat, aquā facillè excutiet. Quum à calida intemperie dolor obortus fuerit, tum cōtrarijs medicamētis propulsandus erit. Mirificè itaq; cōfert oleum rosaceum in aurē instillatum, uel acetum rosaceum, uel album oui, aut lac muliebre, aut solani succus, aut tale quod accipit: Olei rosacci 3 1. succi solani 3 2. aceti rosacei 3 1. f. Misce. Si uerò à crassissimis & flatibus humoribus, aut flatibus dolor excitatus fuerit, medicamētis quæ obstructions auferunt, & incidunt, utendum: cuiusmodi sunt omnia amara, quæ sine erosione expurgāt, exterguntq;. E' quorum numero est iris Illyrica, aristolochia omnis generis, amygdala amara, uitis albæ radix, centaurei minoris coma, polium, & cinnamomum. Item oleum amygdalinum, & alia quæ citra molestiā meatus expurgant, abstergunt, & obturata disijciunt dissecantq;. Ex ijs itaq; auricularia medicamēta confici possunt, & usu postulante instillari. Præter cætera uerò cremorē porri tepidum auribus

Ex aquis medicatis.

Calidi.

Ab humoribus crassissimis, & flatibus.

ita adflctis instillare conuenit. Vel ceparum succum melli permixtum. Quod si ab inflammatione dolor cōcitatus fuerit, statim sanguis ex humerali uena eiusdē lateris mittendus est, clysteribusq; defluxus humorum in contrariū auertendus, potissimū ubi alius sua sponte nō deiecerit. Deīn oxyrhodinum tepefactum instillandū, aut adeps anserinus, aut gallinaceus cum rosaceo. Se solis enim nō influente etiā mū humore magis cōueniunt, idq; duabus rationibus, quia doloris symptoma leniunt, mitigant ue, & inflammationis affectum curāt. At si uehementior fuerit inflāmatio, ad sedandos dolores, albumen oui cum lacte mulieris tepidum instillatur. Prodest etiā tum medicamentū, quod habet: Succī semperui ui 3 2. olei rosacei 3 1. aceti 3 1. f. Cōmixtis omnibus, & agitatīs, auri dolenti instillantur. Extrinsecus uerō ea quæ dolorem leniūt, materiāq; impactā cōcoquunt, admouētur. Vrgente autē dolore, qui (Hippocrate teste) quū uehēmēs grauisq; fuerit, periculum minatur: nam & mentem turbat, & hominem rapit: necessarium est etiam ijs, quæ leuiter sensum stupefaciunt, uti. Neq; enim mediocre, ut diximus, periculum est, ne cerebrū neruo, per quē facultas audiendi distribuitur, uicinum per cōsensum afficiatur. Miscetur autem tum pauculum opium lacti muliebri, & oui candido, quæ & ipsa per se frequēter aurium inflāmationibus congruunt. Iam & castoreo opium temperatur, oportetq; hoc longē ante mixtum, uel æquali pondere, Galeno autore, uel duplicato castoreo preparare. Ad uehementissimos quidē dolores: æquali: ad minores, duplicato. Liquor uerō quo prædicta medicamenta diligēter prius trita, & leuigata, diluuntur, sapa est: quippe hæc multò magis dolores lenit, quā uina dulcia. Est autē sapa mustum ad tertiam mēsuræ partē decoctum. Sunt qui opio rosaceū & uiolaceū miscēt oleum, in hunc modū.

Ab inflam-
matione.
Venæ se-
ctio.
Auerſio.

3. Progn. 15.

Stupefaciē
tium vſus.

Sapa quid.

Opij

Opij 3 i. oleorum rosacei & uiolacei, utriusq; 3 i. f. Philonis quoq; antidotum crebrò sic laborantibus profuit, dissolutum lacte muliebri, & instillatū. Extrinsecus uerò aurē assiduē olei cōmuni, siue ex calido fomēto oportet fouere, la-
namq; hoc imbutā in aurē conijcere, sed ita ut partes inflā-
matione laborantes quā fieri potest, minimē attingantur.
Quo autē pacto quis cōmodissimē auribus uehementer do-
lentibus medicamētā inijcere queat, tradit Galen. lib. 3. De cō-
pos. medic. secundū locos, cap. 1. Et huic sanē præcepto eius,
ceu maximo in curatione aurium, mentem adhibeat medicus.
Porro ubi iam dolor inueterauerit, & in suppurationē cō-
ueriti cœperit, medicamēto ex lini seminis succo utitor, quod
unā cum rosaceo, aut chamæmelino solutum instillabis.

Defonitu aurium. Cap. XLIX.

Aurium sonitus, quem Græci ὀρυσις & οὐλοισμός, re-
centiores uerò tinnitum uocant, plerunq; à flatuoso
Causæ. spiritu, aut à crassis glutinosissq; humoribus generatur. Nō-
nunquam etiam propter exquisitam audiendi sensus acrimo-
niam. Generatur quoq; malum hoc ex partium imbecillitate,
ubi scilicet ex morbis iam conualescentibus incidit, humore
neruorū auris assumpto. Nasceitur etiā à causis externis, fri-
gore, æstu, ictuq; capitis. Si à causis externis accidit malum,
facile ab ægroti sermonibus dignoscitur. Iam quod sonitus
paulatim, aut una uice, aut confertim irruat, idipsum quoq;
ad inuentionē affectus conducit. Si enim ex certis interuallis
accedant, quieuerintq; sonitus, euidentissimum argumentum
est, quod flatulentus spiritus exitū non habēs interclusus est,
qui prosilire magno nixu cōtendēs edit sonitū: præsertim ubi
cibi inflatuium habentes præcesserint, & cruditate labora-
uerint, frequētius ægotantes. Si uerò huiusmodi aurium so-
nitus

Signa soni-
tus a causis
externis.

A flatulen-
to spiritu.

nitius non repente, sed sensim ingruant, & grauedo quædam ponderis instar sentitur, & uictus ratio, quæ crudos humores procreat, antecesserit, tum crassus ac lentis humoribus malum acceptum referas. Sin suspicio alicui fuit, ex spiritu flatulento qui transitum non habet, aut crassis humoribus malum prouenisse, ac medicamentis quæ incidunt, extenuât, & discutiût adhibitis, nihil proficit, simulq; apophlegmatismis, usus est, & toto capiti prospexit: is magnam occasionem habebit referendi sonitum ad sensus audiendi acrimoniam, præsertim si æger acuti auditus fuerit. Eius etiam hoc certissimum esse indicium putatur, si tempore famis & inedia increuerit, crapula uerò & repletionis remissior fuerit. Curandi ratio pro causarum diuersitate uariatur. Si igitur à crassis & uiscidis humoribus, aut flatibus aurium sonitus ortus fuerit, caput initio catapotijs coccijs, aut id genus similibus purgetur: prius tamē ijs exhibitis potionibus & medicamentis, quæ incidendi & extenuandi uim obtinēt. Deinde apophlegmatismis, errhinisq; utendum. In aurem subinde instillandum oleum amararum amygdalarum, aut oleum in quo castoreum fuerit tritum. Aurem quoq; ad uaporem aquæ, cui stichas, absinthium, maiorana, mentastrum, & origanum incocta sint, opportunè inclinabis. Succus rutæ coctus in cortice mali graminati, mirificè confert. Sacculi item ex betonica, stichade chamæmelo, maiorana, & alijs paulo antè commemoratis, compositi, si calefacti auribus imponantur, conducunt. Si propter sensus auditus acrimoniam sonitus aurium accidat, tum ea quæ sensum stupefaciunt sunt usurpanda. In ijs tamen adhibendis prouidentia magna opus erit. Incipiendum itaq; à leuioribus, & si necesse fuerit, ad ualidiora progrediendū. Commendatur unicè oleum rosaceū, adiecto uno aut altero grano opij. Galenus mandragoræ succum, & papaueris liquorem hoc in

A crassis humoribus
Ab audienti sensus acrimoniam.

Curatio.
Si à crassis humoribus vel flatibus.

Fotus.

Sacculi.

Si ab exquisita audiendi acrimoniam.

Si à febris loco laudat. Caterum si in febribus, aut harum iudicatio-
 bus et morbis alijs, nibus sonitus aurium eucnerit, nullum ei negotium faceffe-
 re oportet: quippe statim magna ex parte finiuntur. Si au-
 tem post morbum, uel capitis dolorem perseuerauerint, ab-
 sinthij decocto aures foueri debent, acetum & rosaceum in-
 fundendum, aut raphani succū cum rosaceo, aut aloē opti-
 mam ex mulso solutam. Quod si hæc nihil contulerint, ue-
 ratro nigro ex aceto contrito utendum.

De surditate, & graui audi-
 tu. Caput L.

κώφωσις **Q**Uum afflicta aure non solum grauius sed omnino ni-
 hil quis audire cœperit, malum hoc Græci κώφωσις
 Latini surditatem nominant. Grauem uerò audi-
 tum βαρυνσία, & δισκουσία appellant. Surditas inter-
 dum à primo statim ortu hominē comitatur, interdum etiā
 Surditas. posteaquā nati sumus accidit. Quod quidem uel ob biliosum
 Cause. humorē sursum uergentē cōtingit, uel propter crudos cras-
 sosq; humores auditū obturātes. Nonnunquā etiā ob sordes,
 Signa. aurīū meatus obturantes. Indicia quibus causæ & dignoscū-
 tur & discernūtur, facili ex ijs quæ nūc sæpius à nobis dicta
 Ab iliosis sunt sciri possunt. Si enim à biliosis humoribus accidat gra-
 humorib⁹. uitas auditus, uel surditas, post febres maximè, recurrēte bile
 ad cerebrū, de repente in festare solet. Facies etiam & totus
 A crassis habitus corporis biliosam temperaturā præ se fert. Si à cras-
 humorib⁹. sis humoribus oritur, grauitas capitis, et alia quæ pituitosos
 humores ostendunt, adsunt. Quæ à generatione statim, aut
 etiā postquā nati sumus, sed longissimæ & perfectæ surdita-
 Curatio. tes cōsistunt, immedicabiles existūt. Quæ uerò non absolutè
 Si ob bilio- quidē, sed diuturnæ tamē: & ipsæ curationem non recipiunt,
 sum humo- aut certè difficilimè curātur. Quæ ob biliosum humorē sur-
 rem, sum

sum uergentē nascuntur uacuationibus per medicamentabilem ducentia ex facili abolentur. Quidam etiā sua spē malo liberantur, bile inferius descendente: Quod Hippocrates 4. Aph. 28 etiā ijs uerbis cōfirmat: Quibus bilioſe accidunt deiectiones, hæ superueniēte surditate cessant: & quibus surditas fit, hæc superuenientibus biliosis deiectionibus cessat. Et iterū: Qui 4. Aph. 60 bus in febribus aures obsurduerunt, alius turbata soluit morbum. Si uerò ex crudis crassīsq; humoribus prognata fuerit surditas, uel grauis auditio, uenæ sectione, aut omnino purgatione ex hiera, et catapotijs cochijs, alijsq; similibus curabitur. Antea tamē oxymeli, & alia quæ crassos & lentos humores incidere ualent medicamenta propinanda. Corpore uniuerſo purgato, pituita apophlegmatismis, errhinis et ster nutamentis ex capite elicienda. Præterea caput siccandū, & omni modo corroborandum. Balneis itē sua spē scaturientibus, uel aqua marina utendum. In ipsam uerò aurem iniicienda medicamenta, quæ diuidunt, inciduntq; crassos & uiscosos humores, qualia multa ad sonitus antea sunt tradita. Priuatim uerò confert rutæ succus cū melle, aut castoreum cum oleo anethino. Fomentis quoq; utendū est, quæ per spon- Fomenta. gias fiunt, & ijs quæ uapore per calamos perforatos uentriculo cibis non distento accommodantur. Oportet autē alterū calami arundinis' ue extremum cōcauitati auriculæ adaptari, alterū ollæ, quæ operculum perforatum habeat, & undequaque obturata sit, incumbere. Sit autem in olla absinthium, mentastrum, maiorana, origanum, stichas, aut simile aliquid aqua decoctum, ut uapor inde sublatus ad auditoriū meatum perferatur. Aceti insuper uapor in hunc modum in aurem acceptus, mirificè confert. Victus autem ratio in Viçus uniuerſum sit tenuis.

De parotidibus. Cap. LI.

παρανο-
δδ. **Π** Αρῶνοδδ sunt inflammationes, quæ in glandibus
Causæ. quæ auribus adiacent, emergere solent. Fit ex copio-
 so atq; calido sanguine, qui uel biliosus, uel pituitosus, uel me-
 lancholicus existit. Oritur autē interdum ex capite, humo-
 ribus uidelicet ei impactis: interdum à reliquo corpore per
Signa. morbos, febres maxime, illuc impetu morbi per decretorium
 cōuerso. Signis nullis ad mali cognitionē opus est, oculorum
Plenitudi- enim iudicio subiacet. Parotides autē quæ seruētis sanguinis
nis- plenitudini adscribuntur, dolores uehementissimos pariunt.
Biliosis san- Quæ uerò bilioso sanguini erysipelata referre magis uidetur
guinis. nullaq; grauitate locum male affectū excruciant. Quæ me-
Melanco- lancholico sanguini acceptæ referūtur, ne modicè quidē ru-
lici. bent, neque uehementi dolore torquent, sed duriusculæ sunt.
Pituitosi. Quæ ex pituitoso natæ sunt sanguine, fastigiata in tumore
Victus. existunt. Victus ratio talis, qualis ferè in alijs inflammatio-
Curatio. nibus constitui debet. Curatio à uenæ sectione, si ætas, aliq;
 permiserint, auspicanda erit. Incidenda uero uena humeralis
Topicis in eiusdem lateris, propter rationes alibi dictas. Porro non uti-
hoc affectu mur in parotidibus, quæadmodū in reliquis inflammatio-
quomodo bus, inter initia reprimentibus, sed cōtrā attrahentibus, et si
utendum. nihil notatu dignū effecerint, etiā cucurbitulas affigemus, aut
 fomēta assidua adhibebimus. Nā humorē noxiū ex profundo
 ad cutē euocare, naturæq; opem ferre conamur: præsertim
 ubi in capite sit firmatū malū, humoribus in eo pertinaciter
 hærentibus. Quinetiam quum citra capitis affectū in feбри-
 bus acutis natura superuacuos humores deponit, ex uasis, in
 regionē quæ intra cutē et corpora subiecta habetur, effun-
 dens, quando etiam glandula ex humoribus effusis opplētur,
 satius esse tunc quoq; uidetur naturæ opitulari, febribus per
 humo

humorum decubitum, seu ex loco in locū impetuosum illa-
 psum medenti. Quum uerò uehemēti impetu influxus irruit,
 nihil nos tentabimus, totum naturæ permittentes, iuxta hoc
 Hippocraticum: Quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, ^{1. Prog. 20}
 neq; mouere, neq; nouare aliquid, siue medicamētis, siue aliter
 irritando, sed sinere. Hæc ille. Si enim uel cucurbitulā, uel me-
 dicamentum aliquod humores ex alto ad cutē attrahens ad-
 mouerimus, uehemens dolor hominem apprehendet, ut hinc
 & uigiliæ suboriantur, febres intendantur & uires exoluan-
 tur. Proinde tunc mitigare, non humorum impetū ac influ-
 xum promouere oportet, per cataplasmatum maximè leniē-
 tū usum. Eligēda uerò quæ cū humiditate moderata, calorem
 habeāt, doloribus mitigādis sanādis'ue, atq; influentibus hu-
 moribus cōcoquendis & maturandis idoneū: ueluti est quod
 ex frumentacea, aut hordeacea, aut lini seminis farina cum
 mulsa, aut scœnogræci, aut althææ, aut chamæmeli decocto pa-
 ratur. In eundem usum, locum assidue butyro illinemus, adie-
 ctis ouorum uitellis. Suillum quoq; adipem cum butyro li-
 quantes cera exigua addita, ut molliissimum ceratū fiat, appli-
 cabimus. Ceterum mitiores parotidas, in quibus neq; humo-
 rum in particulas copia irruit tanta, ut uehementes dolores
 excitet, neq; caliditas humori adest, facillè curantur fomētis
 è muria, & cataplasmatibus, & medicamentis exquisitissimè
 discutiētibus, quale est, quod dyachylon, hoc est, è succis uo-
 catur. Neq; enim ad suppurationē festinant, neq; dolorē in-
 ducunt ualidum. Si uero parotides discuti haud possunt, sup-
 purantibus medicamētis utendum est: nempe farina triticea,
 cum caricarum decocto, & oleo. Item quod ex polline &
 fermento constat medicamentum. Vbi uerò iam suppuratæ
 fuerint parotides, tūc uel cutæ ferro discissa pus excernetur
 ulceriq; ut in eiusmodi omnibus moris est, medeatur: aut sanè

Dolor qui
 bus mitigā-
 dus.

Mitiorum
 parotidum
 curatio.
 Discutien-
 tia.

Suppuran-
 tia.

acri

acri medicamēto rumpetur abscessus, quale est quod ex allio constat, & similibus. Aut tentandū, ut ipsum per medicamēta, quæ attractoriā simul & extenuantē vim obtinēt discutiāmus, bis quotidie auferentes, fouētesq; , donec aliquid remittant, laxēturq; dolores, maiori parte puris discussa: tūc enim iam primum quidē semel soluere & fouere, deinde uerō ne hoc quidē facere ex re est, sed ipsis medicamentis permittere oportet, ut si quid reliquum in profundo hæreat, id ipsum discutiāt. Quod si durities adsit, ea ipsa quoq; emolliēda est. Quare per hoc tempus medicamenta mixta facultate cōponentur ita, ut emollientia attractorijs admisceantur, ut est adeps uitulina, hircina, medulla cerui, bdellium, styrax, ammoniacum, & id genus alia, quæ alibi commemorauimus.

De ozænis. Cap. LII.

- Ozænis.** **Οζάναι** Græcis ulcera narium sunt profunda & putrida, ex quibus ingratus & foetidus exhalatur odor
- Causæ.** Sic uerō à graueolentia & foetore dicta. Ex acrium putrido rumq; humorum, qui ad nares commeant, illuue generātur. Quod si acres tantum existant, ulcera curatu difficilia solēt procreare, nō tamē grauiter olentia. Indicij ad mali dignotionem non est opus, ex dolore enim, & ægri narratione, imò etiam uisu, facile in naribus ulcera deprehenduntur.
- Signa.** **Ozænarum** curatio in hoc potissimum consistit, ut principio caput exiccetur, eiq; robur adiiciatur, quod nimirum constet has ob malignorum humorum redundantiam, qui ex capite naribus influunt, prouenire. Roborandum uerō atque exiccandum totū caput erit, ne quicquam ex ipso superuacuum in nares, aut alias infernas partes influat. Quemadmodum igitur alijs topicis ac localibus, nisi uniuersi corporis uacuatione præmissa, uti non licet: ita hic non nisi toto capite
- robo

roborato, naribus admouenda remedia erunt. Robur autem ^{Caput quō} capiti ad hunc modū adijciendum est. Tondere primum ca=^{roborādū,} put oportet, deinde confestim quæ adstringunt imponenda, qualia sunt oleum rosaceum, alumen, gallæ immaturæ, folia salicis, acetum, & ijs similia. Hæc capiti perpetuis nouē diebus imponenda, ac illinenda. Vbi itaq; illis caput ualidū robustumq; reddideris, naribus medendis accingere, eò consiliū tuum dirigens, ut particulā affectam medicamentis mixta facultate præditis, repulsoria scilicet & discutiente, ressicces. Repellunt igitur, austeræ nimirum & acerbæ, quæ cō ^{Repellen} munem adstringentibus appellationem sortiuntur. Discu=^{tia.} tiunt autem calida & sicca facultatibus. Ad oxenæ igitur ^{Discutien} sanandas calamint hæ succum instillare oportet, aut ipsam ^{tia.} aridam per fistulam insuffla. Vel melle in nares stillato, post aliquod spaciū adhibito sternutamento crustas excutito, quæ tribus quatuorue diebus excidunt. Vbi uerò exciderint, adipe anserino & butyro cum rosaceo curantur. Vlcera etiam in naribus mali punici succo in æreo uase usq; ad dimidias cocto perline. Aut malum punicum dulce integrum uino incoctum terito, & forinsecus imposito. Confert & ^{Puluis,} hoc quod habet: Aluminis scissi 3 1. f. myrrhæ 3 1. malicorij, rhois, salis fossilis, croci, thuris, singu. 3 f. Trita insuffla. Quod si hæc ulcera dolor comitatur, utere unguento, quod accipit. Olei rosacei, myrtini, utriusq; 3 1. Plumbi usti, lithar ^{Vnguētū,} giri, utriusq; 2 1. cerussæ, boli armenia, balaustiorum, singulorum 2 1. cere albæ quod satis est, fiat unguentum.

De sanguinis ex naribus profluuio. Caput. LIII.

Profluuij sanguinis è naribus, causse partim sunt ex=^{Causæ.} ternæ, partim internæ. Externæ sunt, casus ex alto, Externæ i
k 4 ictus

Internæ. ictus, exercitium uehemens, & mora in sole. Internæ, copia
Harū cau- sanguinis, uel eiusdē tenuitas. Caterum omnes eius causæ sub
sarum capi ijs tribus complecti possunt. Siquidem sanguis profluit ex
ta tria. naribus, aut reſerato uenarum uel arteriarum, quæ in capite
 & naribus sunt, ore, aut tunica earundem rupta ac diuiſa,
Primum. aut ſudoris inſtar tranſcolatus. Reſeratur autem uenarum
 & arteriarum os propter tum uasīs imbecillitatē, tum ſana
 guinis qui ad os earum impetu ruit copiam: ad hæc acrem
Secūdam, quampiam, quæ illi extrinſecus incidit, qualitatem. Diuiditur
Tertium, uerò tum ex uulneratione, tum contuſione, tum ruptione,
 tum eroſione. Sudoris inſtar tranſmittitur, tunica quidē ipſa
 rarefacta, ſanguine autem tenuato. Indicijs multis ad mali,
Signa. eiꝯq; cauſarum dignotionem nihil opus eſt. Externæ quidē
 cauſæ de ſermonibus ægri cognosci poſſunt. Copia ſanguinis
 ex facie, oculisq; quæ rubent, dolore capitis grauatiuo, &
 alijs quæ dicta ſunt cap. 10. huius libri deprehēditur. Decre-
 torium ſanguinis ex naribus profluuiū, quod curatione haud
Viſtus. eget, ē morborum qui præceſſerunt conſtitutione agnoſci-
 tur. Ratio uiſtus ſit eiꝯſmodi, quæ inſrigidare & incrāſſare
 ſanguinem ualeat. Tenuem quoq; eſſe oportet. Aer itaq; ſit
 frigidus, cibus boni ſucci, & concoctu facilis. Sanguine ſer-
 uente, æger ueſcatur lactucis, intubo ſatiuo utroq; , pyris, ma-
 lis cotoneis, pullis gallinaceis aſiis, aut cum omphacio elixis.
 Bibat uinum crāſſum & rubeum. Contrā, album & tenue
 deuitet. Vel ubi aſſueuit per bonam ualeitudinem, utatur in
Decoſtum potu aqua frigida, aut decocto cinnamomi. Per quod paſſim
cinnamomi in ijs noſtris de medendi ratione libris intelligo aquā, in qua
quid, parum cinnamomi decoctum ſit, ne ſcilicet ſua frigiditate
 imbecillum plerunq; uentriculum offēdat. Parum loqua-
 tur, omnemq; corporis motum, animi quoque perturbatio-
Partes ca. nes: iram potiſſimum fugiat. Partes præterea capiti ſubie-
 ctas,

Etas, sublimes habere cōuenit. Situs enim partis, ex qua san- piti subie-
guis profluit, in contrarium fluxionis tendere, & inclinari diz vt ha-
debet. Hac enim ratione sanguis in cōtrariā sui motus partē bendz,
impellitur. Sic Galenus libro 5. Ther. meth. omnem particu-
lam, unde sanguis manat, sursum spectare oportere tradit.
Ita Hippocrates quoq; 6. Epid. Par. 7. Aph. 3. inter ea quæ
sanguinem promanantem sistunt, figuram aliò tendētem re-
censet. Quare curandum unicè, ut caput in profluuiū san- Caput quò
guinis nariū deorsum spectet: id quod fiet, si partes illi sub- cōponēdū
iectæ sint sublimiores. Curandi ratio ab ijs, quæ sanguinem Curatio.
ad alias corporis auertunt præsijs exordiēda. Primū igitur Venæ se-
si corporis plenitudo adsit, & etas permiserit, ægerq; ctio,
adhuc non sit resolutus, uena in cubito secanda est, quæ pro-
fusione sanguinis ex naribus è directo respondet. Sic enim ut
faciamus suadet Galenus, qui in libro de curandi ratione per ”
sanguinis missionem ita scriptū reliquit: Porro reuulsionis ”
causa, si uenā seces, indirectè quidē oppositis sanguinis eru- ”
ptionibus, citissimè conspicuā uidebis utilitatem. At si cōtrā
seces, nihil profuerit. Hæc ille. Vbi paululū detraxeris, mox
unam horam intermittens, rursus detrahes, post iterum atq;
iterum pro laborantis uiribus. Præterea infernarū partium, Frictio,
brachiorum uidelicet, manuum, fœmorum, inguinum, ac pe-
dum, potissimum per ea medicamenta quæ calefaciūt, frictio
mirificè conducit. Vincula etiam ualentius iniecta, ijs reme- Ligaturæ.
dijs quæ reuellunt adnumeranda sunt. Sanguinem denique è Cucurbitæ
naribus erumpentem, retinent magnæ in hypochondrijs de-
fixæ cucurbitulæ. Infigendæ autē sunt, si ex dextra nare pro-
fluit sanguis, super iecinere: sin ex sinistra, super liene: si ab
utraq; nare, super utroque sunt imponendæ uiscere. Sca-
pulis etiam cum scarificatione applicandæ sunt. His sic per-
actis, medicamenta quæ refrigerant & adstringunt, intra & Adstringē
tia medica
menta,

Exterius extra corpus adhibenda. Extrinsecus quidem apponenda
admonenda, fronti & commissuræ coronali epithemata è succo plantagininis, lactucæ, oxalidis, pastoriæ, ceræ, polygoni, aut eorundem stillaticijs liquoribus parata. Mirificè autem conducit linæteolum in aceto madefactum frigido, iterum atque iterum fronti & ceruici admotum. Frons etiã spongijs ex aqua frigida fouenda. Porro proderit hoc epithemate fronti & iccino-
Epithema, mori imposito uti, quod habet: Liqueurum stillaticiorum rosarum solani, oxalidis, singul. ʒ ʒ. Specierum diuriasantælon, diarhodon abbatis, singul. ʒ ʒ. boli armenia, eboris usti, lapidis hæmatitis, singul. ʒ ʒ. Commixtis omnibus, fiat epithema. Naribus præterea medicamenta sanguinẽ sistẽtia in-
Optimum denda, quale est quod Galenus lib. 5. Ther. meth. inter omnia
medicamẽ alia optimum esse tradit. Recipit autem thuris ʒ 2. aloës ʒ 1.
tum ad si- Redacta in puluerem cum oui candido subigantur, donec ad
stendũ san- mellis crassitudinẽ redeant: dehinc leporis mollißimo pilo
guinem, excipiantur, & admoncãtur naribus. Licebit etiam linamẽtum cõtortum, hoc medicamento imbutum, naribus indere. Menta quoq; trita in nares coniecta, haud parum prodesse creditur. Item spongia in acre ac feruens acetũ demissa, profluentibus naribus extrinsecus imponenda, atq; comprimenda specillo, donec impellatur. Præstat autẽ spongiæ initium deligare filo per acum deducto, ut faciliẽ extrahi possit. Extrahito autem quũ opus suũ perfecisse existimaueris. Quod si inarescat spongia, intusq; agglutinetur, auriculario chylistere aquã frigidã immittito, ac infundendo humectato, atq; ita extrahito. Itẽ hoc quoq; medicamentũ non inter postrema habetur, quod accipit: Putaminis cui ʒ 2. gallæ immaturæ ʒ 1. Trita linamẽto tortilli aqua aut aceto madefacto excipito, & nariũ foraminibus indito. Itẽ frontẽ et nasum gypso albumine oui irrigare integrẽ non parũ cõfert. Aurẽs quoq;
ualidẽ

Paratu fa-
cilia medi-
camenta,

ualidè linteis & cera obturare, & in ore aquam pluuialem frigidam continere. Succus etiam foliorum urticæ linamēto exceptus & impositus, sanguinem ex naribus erumpentem reprimit. Idē quoque met ipsa folia illita possunt. Caudæ in super equinæ succus, aut ipsamet folia trita & applicata in sistendo sanguine magnā obriment efficaciam. Cochlearum deniq; caro cum aceto trita, aut eadē cum suis domicilijs ustæ tritaq; fronti ac naribus ex aceto admotæ non parū utilitatis adferunt. Supra omnia cōfert sanguis, qui ex egroti naribus profluxit, si scilicet in uase figulino tostus. ac deinde tritus fuerit. De eo accipe 33. boli armenia, gypsi, utriusq; 31. caphuræ 31. cum oui candido, & exiguo aceto reducantur ad mellis crassitudinē, & fronti imponantur, naribusq; immittantur. Necesse est ipsa urgente, grana duo, aut tria opij adijcere licebit. Ab essentia totius proprietate steracus asinū exiccatū, & in puluerē redactū, cōducere apud omnes in cōsebo est. Idem etiā fimus porcinius potest. Intra corpus adhibenda ea quæ infrigidant & adstringunt medicamenta, ut sunt serapia rosaceum, myrtinum, nymphaeæ, & è papauere. Saccharum rosaceum, oxalydis, & nymphaeæ. Pastilli de lemnia terra, de succino, & id genus alia medicamenta. Porro si qd interea sanguinis in uentrē aut alia corporis loca defluxit, ipsum si multus ac copiosus fuerit, per medicamēta grumos dissoluētia & educētia, uacuare oportet. In uentre enim & intestinis in grumos, coactus sanguis, incensionem facit. Quæ autem sint eiusmodi medicamenta, suo dicemus loco.

Optimum.

Stercus asininum.

Fimus porcinius

Introsumenda. Si sanguis in ventrem aut alia corporis loca defluerit.

De destillatione, grauedine, & rauitate. Caput LIIII.

KΑΤΑΨΘΟΣ & ΚΑΤΑΨΥΣ Græcis, destillatio Latinitur dicitur. Fit autem Galeno lib. 3. De sympt. causis testetur, Catarrhus. Destillatio, ubi

- Grauedo.** ubi ad os & fauces humor delabitur. Grauedo uerò, quæ *νόσος* α. Græcis *νόσος* α uocatur, dum ad nares decumbit humor, **Rauitas.** accidit. Rauedo, quæ *βράχυς* Græcis appellatur, ubi ad *βράχυς* asperam arteriam destillat humor, cōtingit. Defluxus humo-
Causæ. ris causa est cerebrum, quod qui iē à frigore ad frigidam in-
Frigus. temperiē deducitur, quod ijs potissimum accidit, qui aperto capite sese statim ambientī frigido exponūt: ab aestu uerò ca-
Calor. lesit & repletur. Frigiditas etiam humores quæ in cerebro sunt, constringens, perinde atq; manus spongiam imbutam aqua, defluxum eorundē in partes subiectas conciliat. Sic nō rarò calor ambiens humores cerebri dissoluens, destillationem creat. Præterea omnia quæ ultra modum caput replere possunt, defluxum humorum in partes inferiores excitant. Sic uinum utiq; immoderatus ingestū, balnea calidiora, & **Cruditās.** largior perfusio capitis ex aqua calida, maximè si alias calidius caput existit: & cibus sanè qui in uentre crudus perseuerat, neq; infrā excernitur, item ea quæ sursum euaporāt, in **Vaporosa.** caput impetū facere cōsueuerunt. Externæ causæ ē sermoni **Signa.** bus agri cognoscuntur. Qui ex calore defluxu humorum ex capite laborāt, ijs caput incalescit, acris tenuisq; humor de-
Caloris. stillat tum per nares, tum per os. Facies deniq; rubescit, & nāsus. Hos etiam magna ex parte febris comitatur. Qui **Frigoris.** contrā ex frigore, ijs caput undiq; & frons distenditur, meatusq; qui in osibus sunt, quæ ethmoidea nominantur, Anatomicis clauduntur, ita ut ne uox deorsum per nares transmeare queat. Pituita quoq; & crassus humor ē naribus stillat. Fugiant acrem impense calidum & frigidum, præsertim à balneo: uentos austrinos, & aquilonios: laconicum, & omnia quæ aut constringere, aut dissoluere humores in cerebro possunt. Utantur cibus cōcoctū facilibus, & boni succi. Deuident eos qui uaporum copiam ad cerebrum transmittunt,

tunt, nempe cepas, allia, sinapi, raphanum, & odoramenta supra modum calida. Præterea qui destillatione laborant, minus in cœna quàm prandio comedant. Potus sit aqua mulsa, aut hordei uel cinnamomi decoctum. Fugiendus somnus diurnus, & nocturnus supinus. Quod ad curandi rationem attinet, cōsultum est, caput, ueluti mali fontem, sanare. Vbi itaq; calida intemperie caput uexatur, ijs pugnandum præsijs, quæ dolori capitis è tali causa contracto conueniunt. Præsentissimum autem remedium capitis, cum aqua copiosiore calida irroratio & persusio. Hæc enim generatos in capite uapores calillos discutere ualet. Oportet deniq; sic laborantes balneis multis tepidis dulcium aquarum cōsolari, & temperamentum omne in melius mutare. Qui uerò caput uehementer calidum, & perustum habet, atq; ob id assidue destillationibus uexatur, ijs melius est hora æstiuæ ex rosaceo ungi. Quod si frigida intemperies infestet caput, calefaciētib; ac tenuibus oleis, irimo scilicet, rutaceo, & similibus perungendum erit. Iri- num autem non solum illinitur, sed etiā naribus instillatur. Alia præterea quæ supra de capitis dolore ex frigore orto dicta sunt, adhibenda ueniunt. Si autem calidus humor à capite distillauerit, simulq; febris inuasit, et totius corporis plenitudo fuerit, sanguis è uena exteriore cubiti, quæ humeralis uocant mittendus erit. Sin sanguinis missione propter iustas causas uti non liceat, clysteri aluius eluenda, atq; à capite exuperantes humores deorsum trahendi: aut medicamentum bile per inferna ducens propinandum, ut sunt catapotia aurea, alephangina, azaiaret, & similia. Auertendi quoque à capite sunt humores frictionibus extremitatum, ligaturis, & cucurbitulis scapulis admotis. Intra corpus adhibeantur, quibus alterandi, & feruore bilis extinguendi facultas inest, neliuti est serapium uiolaceum, nymphaea, è papauere, item eorundem sacchara.

In destillatione cœna prandio parior esse debet.

Curatio. Si calida intemperies,

Si frigida,

Si calidus humor,

Auerfio.

Alteratio.

Embro

Embrochæ etiam & odoramenta supra in capite De dolore capitis commemorata applicentur. Emplastrum deniq; è terra lemnia, aut bolo armenia, & plantaginis succo paratū raso capiti imponatur. Si uerò frigidus humor sit, qui à capite destillet, per ea quæ pituitam purgant, corpus uacuabis. In quem usum multum cōfert ualidi clysteris iniectio. Quo pe-
 racto, à capite auertere, atque retrahere humores oportet. Dein ubi humores cocti fuerint apophlegmatismis, garga-
 rismis, & similibus medicamentis caput expurgandū. Sacculi præterea capiti admouendi sunt, qui habent: Florū chamæ-
 meli, meliloti, betonica, stichadis, foliorū lauri, pul: gij, ori-
 gani, singul. m. s. cinnamomi, garyophyllorū, utriusq; 3 i. ma-
 ceris 3 i. f. nucis moschatæ 3 2. galliæ moschatæ 3 1. Terātur singula, & trita in sericum demittantur, formeturq; saccu-
 lus, qui futuræ coronali imponatur. Plurimum quoq; cōdu-
 cit caput oleis calidis, irino nimirum, anethino, & rutaceo perungere. Destillationem reprimunt omnia, qui-
 bus exiccandi inest facultas: potissimum uerò nigella torrea-
 facta. Et cuminum deustum luteolo inditum & illigatum, præfens auxiliū adfert, si id ipsum agrotātes odorēt. In eundē usum suffimenta adhibere conuenit, quale est quod accipit, Thuris, mastichis, utriusque 3 i. ligni aloës 3 1. cinnamomi. garyophyllorū, utriusq; 3 2. galliæ moschatæ 3 1. f. foliorū lauri, santalorū luteorum, singul. 3 1. moschi, ambar, utriusq; granum 1. Trita excipiantur stacte quod satis est, & infor-
 mentur pastilli, quorum unus prunis inferatur. Aliud quod habet: Saluæ, maioranæ, rosmarini, singul. 3 1. maceris, ga-
 ryophyllorum, cinnamomi, singul. 3 2. ligni aloës 3 1. thuris 3 1. f. Terantur omnia prius, & dein commisceantur, fiatq; puluis, qui exigēte usu carbonibus ignitis inspergatur. Rau-
 cedo autem iisdem frē quibus tussis, curatur medicamentis.

De dentium dolore Cap. LV.

IS à calida uel frigida intemperie interdum excitatur. *Causa.*
 Nonnunquam etiā propter humorum ex capite in eorum
 dem radices defluxum, qui sua illos acrimonia uel erodunt,
 aut consimilem in eis passionem sua concitant copia, qua=
 lis est circa partes carnosas inflammatio. Dentium uerò do=
 lor sine gingiuarū inflammatione, interim in propria ipso=
 rum substantia, interim in neruo qui illorum radici inseri=
 tur, oritur. Si à nuda qualitatis intemperie dolor accidit, *Signa.*
 minimè grauatius erit. Calidaq; intemperies ex totius cor=
 poris temperamēto, quod itidem calidum est, item facie sub=
 rufa, & præcedenti uictus ratione calida deprehenditur.
 Frigida ex cōtrarijs indicijs cognoscitur. Si uerò ab humore
 aliquo copioso influente dolor oriatur, non solum in denti=
 bus grauatius sentitur dolor, uerumetiam in reliquis par=
 tibus quas pertrāsit. Calidus autem humor uehementiorem,
 frigidus uerò remissiorem mitioremq; dolorem excitare so=
 let. *Victus ratio.* Victus ratio, quæ ne dolor accadat, munire potest, eius=
 modi sit ut nullo non tempore quæ suprâ modum calida aut
 frigida sint deuitentur. Vnicè autem cauendum, ne statim sese
 sequantur. Fugienda quoq; acida, acerbâ, & uiscosa omnia.
 Lactis etiam frequens usus dentibus mirificè obest. Studium,
 & diligētia assidua sit in purificatione dentiū, quæ una sanè=
 res eos à corruptione omnium maximè tutos reddit. Cibi,
 quorum frequens usus est, boni sint succi, & concoctu faci=
 les. Dolor uerò insestāte, pro causæ diuersitate, alia atque
 alia uictus ratio præscribatur. Curandi ratio, si à nuda quæ=
 litatū intemperie dolor obortus sit, solis ijs quæ alterare ua=
 lent, præsidij perficitur. Si igitur à frigore sit, proderit uino. *Curatio.*
 tepido colluere dentes. Extrinsecus autē maxillæ calefacien=
 tibus *Si à frigore.*

tibus oleis camemelino rutaceo, irimo, & similibus inungantur. Pro oris quoq; collutione in aceto decoquantur origanum, calamintha, hyssopus, pulegium, satireia, uerbenacæ

Si à calore rectæ radix, & similia. Si autem à calore dentes dolere cœperint, in aceto decoquere oportet portulacam, parietariā, semperuiuum minus, & glycyrrhizam. Quod si intolerabilis existat caloris sensus, utendum est seminibus lactuæ, intubi hortensis & papaueris, decoctis in aceto. Forinsecus oleis frigidis, rosaceo, nymphææ, & id genus alijs partes dolenti uicinæ inungendæ. Porro si ob humorum redundantiam dolor excitatus fuerit, si ætas, anni tempus, aliq; permiserint, ac corporis plenitudo aderit, à sanguinis missione ordiri curationem oportet. Incidere autem conuenit uenam cubiti superiorem, quam humeralem uocant, & quæ è directo affectum locum respicit. Quæ si non contingat, eam

Venæ sectionio.

Purgatio.

Reprimētia.

quæ media existit. Eo peracto, uenas sub lingua secare oportet, aut scapulis cucurbitas affigere. Si uerò unius duntaxat humor, uitiosus redundauerit, medicamento quod eum humorem purgare consueuit, utendum erit. In eum etiam usum clysteres mirificè conferent, quod non solum aluum emollire, uerumetiam humorum impetum ad inferiora auertere queant. Corpore uniuerso exinanito, ea quæ reprimunt medicamenta admouere licebit: ut sunt succi plantaginis, rosarum, portulacæ, intubi hortensis utriusque, aut prædictorum decoctum, aut stillaticij liquores, cum exiguo aceto. Vnicè autem conducit dolentes dentes acri aceto calido, cum immatura galla colluere. Sunt qui etiam caphuram adijciant. In eundem usum decocto solani, lactuæ, & halicabaci utendum. Extrinsecus partes dentibus dolentibus uicinæ oleo rosaceo, nymphææ, exigua caphura adiecta, inungendæ, & emplastrum ex hordeacea farina imponendum.

Prin

Principio mali iam transacto, reprimentibus admiscenda ^{Discutien-}
erunt discutientia: ut est scenogræci, seminis lini, althææ, hyf- ^{tia,}
sopi, & id genus aliorum decoctum. Hoc tempore melilo-
ti radix in uino, donec dimidium absumatur, elixa, ore ea
parte quæ dolet contenta, præcipuè auxiliatur. Vtranque ^{Meliloti}
enim facultatem, discutiendi nimirum & reprimendi, meli- ^{uis,}
lotum obinet. Origanum præterea hoc tempore dolorem
dentium lenit, & protinus tollit, si redactum in puluerem
cum nitro gingiuis inspergatur. Ad stupefacientia, nisi sum- ^{Stupefaciē}
ma urgente necessitate, & non nisi humorum defluxu cali- ^{tia,}
do existente perueniendū non est. In hūc usum decoctū semi-
nis aut foliorum hyoscyami cum aceto adhibere licebit. Phi-
lonij quoq; drachma una in aqua, aut uino diluta, nō parum
auxilij adferet. Cæterum si dolores à frigidorum humorum
confluxu orti fuerint, calida magis medicamenta sunt adhi-
benda. Frigida enim humores crassos & frigidos cohibent,
ac ne diffilari queant impediunt, atq; adeò dolorem uehemen-
torem reddunt. Quare tum hoc potissimum medicamento
utendum erit, quod habet: Piperis, pyrethri, meliloti, singul.
3 1. Trita dentibus dolentibus aspergantur. Porro inter ea ^{Quæ à to-}
quæ à totius essentia proprietate conducunt, egregiè facere ^{ta essentia}
fertur ranæ in aqua & aceto probæ elixæ ius, diutius ore ^{conducūt.}
retentum. Præclarè etiam confert senecta serpentis, in uino,
aut aceto cocta. Eadem quoq; usta & trita, cum oleo ad mel-
lis crassitudinem redacta, dentiç; imposita dolenti succur-
rit. Quod si uerò prædicta nihil contulerint, dens aut ferro,
aut medicamenti auferendus erit. Vt autē dentem citra do- ^{Vt dēscitra}
lorem auferre liceat, hoc medicamento utendum. Pyrethrum ^{dolorē, &}
acerrimo aceto in dies quadraginta cōditum, deinde tritum ^{abiq; ferro}
in usum adserua. Qui ubi postulauerit, reliquos dentes cera ^{extrahatur}
præmunis custodito, ipsum uerò qui dolet, circumcirca
l pur

purgatum hoc medicamento integito, & post horæ interstitium digitis extrahito. Præclare facit lappæ herbæ radix, feruenti cinere calefacta, & denti assidue apposita: parua enim mora dentes tollit. Cucurbitæ syluestris deniq; radicem cauo impone, & dentē erue. Vermes terrestres in testa exustos, in cineremq; redactos contere, & circumrafo prius denti ubertim adsperge, & per diem & noctem excidet sua sponte. Hoc Aëtius confidenter esse utendum monet, quod ueluti mysterium iam sæpe sit celebratum. Erucam è brassica natam frequentius ad ipsum dentem adhibe, cadetq; sua sponte. Hæc in præsentia ut paratu facilia commemorare uolui. Plura alia habet Aëtius lib. 8. cap. 34.

De dentibus denigratis liuentibusq; & mobilibus. Cap. LVI.

Causæ.

Curatio.

Dentium
denigrato-
rum.

Puluis.

Liuent aliquando dentes ac nigrent per uniuersam eorum substantiam, non dissimile quiddam inflammatio-
ni patientes, ob influxum uitiosorum humorum. Vt autem dentes sint mobiles, interdum ictus, aut casus in causa est. Aliàs à redundantī humiditate, quæ neruos & ligamenta relaxat, dentes mobiles euadunt. Aliàs etiam ab erosione aut flacciditate gingiuarum, quibus dentes circundantur. Curatio à uitiosi humoris purgatione auspicianda. Postea uerò si dentes liuore aut rubigine laborant, humores uitiosi, qui ad dentes confluxerunt, exiccantibus sunt medicamentis dissipandi, ut est lycium, thus, menta, galla, mastiche, myrrha, nigella, & eiusmodi. Inter multa uerò alia hoc potissimum cōfert, quod habet: Nigellæ, myrrhæ, thuris, singul. 3 i. mastichis, piperis albi, utriusq; 2 i. pistolochiæ 2 i. aluminis sciſſi 3 i. Trita redigantur in puluerem, quo dentes perfricentur. Aut resina terebinthina excepta dentibus circumlimantur.

tur. Humoribus uitiosis depastis, dentifricijs utendum: quibus ^{Dentifriciũ optimum,} extergendi & exiccandi facultas inest, quale est quod accipit: Nitri, aluminis scissi, cornu ceruini usti, singul. 3 1. myrrhæ 3 1. radicis iridis illyridæ, thuris, mentæ siccæ, singulorum 3 1. f. salis uulgaris tosti, pistolochiæ, utriusq; 3 1. pumicis, testarum sepiæ, utriusq; 3 1. f. piperis, pyrethri, pulegij, sicci, singul. 3 f. Tusis & cribratis omnibus, fiat puluis, quo dentes quotidie fricentur. Ad mobiles uerò dentes ea quæ ^{Dentium mobilium,} adstringunt & laxas gingiuas firmant, atq; stabiliunt admo-
ueantur medicamenta. Prosunt itaq; collutiones oris ex de-
coctis rerum adstringētium, qualis est quæ habet: Rosarum ^{Collutio oris,} rubearum, mentæ, plantaginis, singul. iiii. f. Corticum nucum cupressi 3 1. seminis myrti, rhois, utriusq; 3 f. malicorij, gal-
larum utriusq; 3 2. acatiæ 3 2. Decoquantur singula in ui-
no nigro adstringente, & cum eo crebrò os colluatur. Col-
luto ore hoc dentifricio uti licebit, quod habet: Gallarum, <sup>Dentifri-
cium,</sup> putaminum mali punici dulcis, utriusque 3 1. balaustiorum, rhois, myrrhæ, singul. 3 1. rosarum purpurearum. calycu-
lorum glandium, sanguinis draconis, singul. 3 1. Thuris, cor-
nu cerui usti, utriusq; 3 1. f. Tritis & cribratis omnibus, fiat
puluis, quo dentes perfricentur. Aut cum oxymelite scylliti-
co excipiantur, & usu exigente illinantur.

De aphthis. Cap. LVII.

QUæ in oris superficie fiunt ulcera, ac ignei caloris <sup>Aphthæ.
Alcola,</sup> quiddam obinent, Græcis ἀφθῶν, barbaris & recen-
tioribus alcola nominantur. Sunt autē nūc subal-
bidæ, nunc subrubræ, aliàs crustæ modo nigrescunt, & hæ
omnium periculosissimæ existunt. Oriuntur ut plurimum
infantibus, puerisq; lactentibus, quum scilicet aut lac nu-
tritis fuerit uitiosum, aut non probè ipsum infans concoxe-
rit.

rit. Fiunt etiam aliquando in ijs qui ad perfectam ætatem perueniunt, tum propter uitiosorum humorum ad os defluxum, tum propter acrimoniam eorum quæ comeduntur et bibuntur. Cognitio uniuersarum facilis est, utpote quæ uisui et tactui subiectæ sint. Ad tactum quidem calidiores quàm cõuenit partes fiunt, tumoresq; excitantur. Visu uero ex colore cognoscuntur. Quæ enim rubicundiores sunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amaræ: albidiores, pituitæ: luentes uerò et nigrescētæ, bilis atræ.

Curatio
infantiū, Quæ infantibus accidunt, facile curantur per ea quæ mediocriter adstringunt. Ea uerò ipsis in cibis potissimum offerendæ. Oportet igitur miscere cibus aliquid ex malis coto-neis, et alijs acerbis, pirisq; et mespilis. Interdum etiam lactuca quiddam et intubi hortensis, ac portulacæ cibo admiscendum, in inflammatione nimirum ulceribus accedente. Conuenit quoque lens cum aceto et aqua decocta, ac modico pane commanducata. Quod si infans ipse cibum capere non possit, nutricem eius huiusmodi uictu uti oportet, nec non ora infantium conuenientibus medicamentis illinere. Si enim subrubræ fuerint infantium aphthæ, à principio cum ijs quæ mediocriter adstringūt et refrigerāt curantur. Quare ijs collutiones oris ex succis rosarum purpurearum, plā-taginis, solani, oxalydis aut corundem liquoribus stillati-cijs prosunt. Item ex decocto gallarum, balaustiorum, santalorum, rhois obsoniorum, acaciæ, et similiū, admixto succo medicato è ribes, aut diamorōn. Si uero subflauæ fuerint, ijsdem quidem utendum, sed magis refrigerantibus. Si subalbide, adstringentibus et exiccantibus cum quodam calore, utendū. Eiusmodi sunt thus, myrrha, mastiche, nuces cupressi. His etiā ea quæ paulo antè sunt cõmemorata, miscere licebit. Si luentes et nigrescentes fuerint, ijs quæ generosius dis-

scu

ſcutiunt utendum. In hoc caſu cōfert melilotum, chameme-
 lum, anethum, ſcœnogræcum, adiectis tamen ſemper adſtrin-
 gentibus. In eis qui iam perfectæ ſunt ætatis, unicè corporis Curatio a-
 natura conſideranda uenit, num'ne mollis ſit & humida, an dultorum.
 dura uel ſicca. Siquidem durioribus & robuſtioribus corpo-
 ribus, ueluti ſunt piſcatorũ, nautarum, uenatorum, & agri-
 colarum, ualidiora etiã remedia ſunt adhibēda: imbecilliori-
 bus autem & mollioribus, ut ſunt eunuchorum, & mulier-
 ularum, mitiora. Quod itaque ad uictus rationem attinet, Victus.
 in hac ætate conſtituti, ab omnibus quæ ſalfa & acria ſunt,
 quæq; uitioſos ſuccos progenerare poſſunt, abſtineāt. Quod Curatio.
 uerò ad curationem ipſam ſpectat, in plenitudine totius cor-
 poris, ſi nihil impediat, primum uena humeralis, dein illæ
 quæ ſub lingua ſunt, incidendæ. Si uerò cacochymia corpus
 laborauerit, humoris uitioſi & moleſtantis purgationem
 moliri oportet. Corpore à redundātibus humoribus uacua-
 to, medicamenta quibus adſtringendi & reprimendi facul-
 tas ineſt, admouenda. Moderata uerò ad aphthas, remedia Moderata
 hæc ſunt: Omphacium in uino aut mulſo diſſolutum. Rhus aphtharũ
 obſoniorum eodem modo. Roſarum flos, ipſæq; roſæ ſiccæ remedia.
 cum melle roſaceo. Vehementiora ſunt, quæ paulò antea Vehemen-
 commemorauimus. Deinceps uerò ea quæ citra mordacita- tiora.
 tem diſcutiunt, ut eſt ſcœnogræcum, glycyrrhizæ radix, me-
 lilotum, & alia quæ prius recenſuimus. Atqui ſi exulcera- Ad putre-
 tiones putreſcere incipiant, præclarè facit, maximè in infan- ſcentes a-
 tibus, ex decocto gallarum & melle illitio. Gallas igitur cō- pthas.
 tuſas aqua decoque, & cum decocto percolato parem men-
 ſuram mellis permiscens: ruruſq; decoque, donec ad mellis
 craſſioris ſpiſſitudinem: redigatur: eoq; ut maximo remedio
 utere, ita ut locis illitum ſatis diu digitis adfrices, aut tomēto
 lanæ purpureæ digito circumuoluto partibus ulceratione
affectis

affectis apprimas. Egregiè quoque facit centaureij minoris exusti cinis illitus cum melle. Cupressi etiam pilule, exustæ eodem modo, Cornu quoque ceruinum ustum, tritum, & adfrictum mirabiliter conducit. Ad aphthas uerò quæ proserpunt summè efficax est, fœniculiradix usta per se, & cum melle illita.

De fœtore oris. Cap. LVIII.

Causæ, **G**rauis molestusq; oris odor magna ex parte propter putrescentes gingiuas, aut dentes, aut ciborum reliquias illic detētas accidere solet. Nonnunquam ob cutis oris calidam intemperiem. Interdum etiam ob humorem corruptum, aut putrefactum in ore uentriculi hærentem. Contingit quoque ut nonnunquam oris aut pulmonis exulceratione molestus sit oris halitus. Si propter putrescentes uel

Signa, gingiuas, uel dentes, uel ciborum reliquias oris fœtor accidit, promptè quidem cognoscitur, aut uisu, aut de ægroti sermonibus. Quod si à calida oris intemperie nascitur, tum calor in ore sentitur, ac sitis infestat. Si uerò propter os uentriculi, tunc ante cibi sumptionem potissimum oris halitus molestus & grauis esse solet. Oris exulcerationes uisui subiectæ sunt. Pulmonis sanè, totius corporis extenuatione ac

Vicius, tussi, quæ illius sunt symptomata, facillè dignoscuntur. In uictus ratione omnia quæ promptè in ore aut uentriculo corruptionem accipiunt, æger euitet. Talia sunt lac, pisces, fructus ferè omnes, medullæ, pinguis, aquæ prauæ, & similia. Cibi igitur quibus utitur, sint boni succi, & concocti faciles. Aßis tamen magis quàm elixis utendum. In fine prandij & cœnæ adstringentibus pyris, cotoneis malis, & eiusmodi uesti licebit, ijs potissimum, quibus ab ore uentriculi ingratus exhalat odor. Pro diuersitate causarum potius nunc sit ui

fit uinum, nunc hordei aut cinnamomi decoctum. Somnum à cibo statim fugere oportet. Si ob gingiuarum, aut dentium Curatio, corruptionem oris foetor fiat, corporisq; adsit plenitudo, ex humerali uena primum sanguis mittendus erit, & cucurbitule subinde ceruici sunt affigendæ. Sin cacochymum fuerit corpus, idoneo medicamento redundas, ac molestans humor, uacuadus erit. Corpore autem uacuo, localibus utendum, collutionibus præsertim, quæ hoc in loco mirificè conferre solent. Inter multas autem hæc non parum conducit, quæ habet: Rosarum purpurearum, plantaginis, polygoni, Collutio oris, singul. m. i. f. gallarum, balaustiarum, nucis cupressi, singul. 3 2. putaminum malorum granatorum 3 1. f. aluminis liquidi 3 1. Decoquantur in aqua iustæ quantitatis, ad tertias, iuri decocti per colum transfuso admisceatur mellis rosacei colati, diacaryon, utriusque 3 f. diamoron 3 2. Commixtis omnibus, fiat collutio, cum qua mane & uespere dentes & gingiue colluantur. Proderit etiã frequens collutio ex aqua, cui acetum permixtum sit, mane & statim à cibo. Quod si citra exulcerationem fuerit grauis ille oris odor, iridis radicem in uino ueteri odorato maceratam, ad colluendum assidue exhibere, atque etiam in ore retinere conuenit. Myrrham quoque in uino meraco dilutam, colluendam præbere oportet. Non parum etiam confert commanducatio pyrethri, tamaricis, & rutæ. Collutio item ex aceto scillitico, aut decocto saluie, aut solo uino. Decoctum quoque mentæ in aceto & aqua iuuat, si illo assidue os colluatur. Hoc sanè Odorẽ bonũ faciens, & dentes dealbans. bonum facit odorem, & dentes dealbat. Habet salis candidi, pumicis, origani, singul. 3 2. radices iridis 3 1. florum iunci odorati 3 f. Contritis omnibus ijs & commixtis, dentes fricatio. Si à calida intemperie fiat oris foetor, contrarijs curatur medicamentis. Sin ab humore in ore uentriculi corrupto Si à calida intemperie,

Remedia
in singulis
causis com-
petentia.

accidat, per ea quæ humorem illum uacuare possunt sane-
tur. Commodissimè autem ea quæ in ore uentriculi sunt, per
uomitum elucuntur. Quæ uerò ratione uomitus sit conci-
tandus, diximus cap. 33. Post hæc medicamenta quæ stoma-
chum roborare possunt exhibenda, qualia sunt odoratum
rosaceum, diambæ, hydromalum, & eiusmodi. Medicamen-
ta uerò quæ in omni causa competunt, sunt garyophylli,
mastiche, macer, lignum aloës, cinnamomum, rosæ, santali,
nux moschata, carpesia, & alia huius farine. Hæc suf-
ficient. quotquot enim sunt alia capitis ma-
la, quorum nominatim curationem
hoc in libro non perstrinxim-
us, facillè ex ijs quæ
diximus, curare
cuius lice-
bit.

LEONHARTI

FVCHSII DE MEDEN-

dis singularum partium corpo-
ris humani à summo ca-
pite ad imos vsque
pedes malis,
liber secū-
dus.

De columellæ inflammatione.

Caput. I.



ARNOSA quædam particula
in summa oris parte dependēs appa-
ret, si quis toto ore plurimum aper-
to linguam deprimat: quæ quidē ue-
teribus Græcis duobus appellata est
nominibus, γαργαραῖον & κίον, γαργαραῖον
hoc est, gurgulio & columna: poste-
ωρ, κίον.
rioribus uerò propè omnibus κίον, id est, columella uocata Columella.

est. Hæc sæpe admodum inflammatione infestatur, id quod ex
influxu sanguinis aliorumq; humorum à capite descenden-
tium accidit. Visui malum subiectum est, acceditq; in deglu-
tiendo difficultas, dolor, tumor, & rubedo columellæ, & fe-
bris. Victus ratio talis ferè, qualis in reliquis inflammationi-
bus constituenda. Conuenit autem maximè quies, & tacitur-
nitas, inediaq;. In coena parum, aut nihil comedendum. Cu-
randi ratio, si plenitudo corporis adsit, à uena sectione or-
dienda erit. Incidenda uerò initio uenam cubito exterior, Venæ se-
ctio.

I s quam

quam humeralem nominant, deinde ea quæ sub lingua est.

Auerfio. Alius præterea clysteribus subducenda, ut scilicet hac ratione non solum uacuentur, uerum etiam à loco patiente confluentes humores deorsum trahantur. In hunc etiam usum cucurbitulas scapulis affigere oportet. Neq; sanè prætereûda sunt præsidia, quæ fluxum humorum reprimere ualèt. Nam ut in alijs omnibus, in quibus ex influxu humorum morbus existit: ita & in hac parte prima auxilia fluxum reprimunt. Adstringētis itaq; facultatis hæc esse oportet. Et si quidē moderatus sit humorum influxus, ea quæ moderate adstringūt, qualia sunt quæ austeram nuncupantur, adsumenda. Vbi autē uehementior fuerit, acerba etiam sunt adiungenda. Ambo si quidē adstringunt, sed imbecillius austeram, uehementius acerbam, ut copiose lib. 4. De simpl. medic. facul. cap. 6. & 7. monstrat Galenus. Collutionibus igitur ex ijs paratis utendum, inter quas moderate sunt quæ ex palmulis decoctis, aliquando in sola aqua, aliquando etiam adiecto modico melle. Similiter autem & ex rosis, pampinis uitis, rubo, cypero, cytinis, siliquis, radice mori, malis austeris, aut acerbis, & sorbis. His fortiores sunt quæ ex decocto myrti, & baccarum eius, item acerborum malorum cotoneorū, & surculis quercus, similiterq; glandium eius, mespillorum, & cornorum parantur. Præclarissimæ uerò cōficiuntur ex gallis, rhu obsoniorum, acatia, & utriusque punici mali floribus, & earundem putaminibus. Mirum autem, quantum prædictorum mixturæ, simplicium & immixtorū usum excedant. Inter composita uerò medicamenta plurimum præsidij affert hoc quod habet: Liqueurum stillaticiorum rosarum, plantaginis, oxalidis, prunellæ, solani, singulorū ꝛ 1. diamorōn, succi medicati è ribes ꝛ 6. succi medicati ex oxyacātha ꝛ 2. faceti in quo rhus maceratus sit ꝛ 1. succi malorum granatorum ꝛ 6. Miscantur

Collutio-
nes.

Composi-
ta medica-
menta.

Gargaris-
ma.

ſceantur ſingula, & cum ijs os colluatur. Aliud æquẽ præſtans, quod accipit: Roſarum purpurearum, rubi, utriuſque in 1. balauſtiorum, putaminis malorum punicorum, gallarum, glandium quercinarum ſingu. 3 3. rhois, hypociſtidis, acatiæ. ſingul. 5 2. ſeminis oxalidis & cotoneorum, utriſque 3 1. Decoquantur in lib. 1. aquæ fontanæ dum mediætas relinquitur. Iuri per colũ tranſuſo adiſciatur diamorõn 1. Succi medicati è ribes, diacaryõn, utriuſq; 3 2. f. aceti optimi 3 6. Commixtis omnibus, fiat gargarifma. His quidẽ medicamentis in principiõ morbi utendum, & tunc potiſſimum, ubi affectus non habuerit maiorẽ cauſam, nec ægri corpus multis reſertum fuerit humoribus, neq; pars affecta phlegmone natura imbecilla extiterit. Sin contrà euenerit, ſæpe quidem initio. ſæpe uerò paulo poſt, hoc eſt, tertio die, quippiam ex diſcuſſorijs medicamentis cõmiſcendum erit, ut eſt lini ſemẽ, fœnogræci, & altheæ, radix iridis, atq; mel. Quare medicus perſpecta caloris in ipſa inflammatione magnitudine, conſiderataq; influxus ad eam multitudine, atq; amplius in toto corpore humorum copia perpenſa, uel eorum quæ adſtringuunt, uel quæ diſcutiunt augebit mixturam? Porro quotquot ſunt eius generis medicamenta, hæc tepida adhibeantur, ſiquidem ea quæ inflammatione laborant, frigus non tolerat. Medicamentum hæc tepida adhibenda & cur. Poſt uigorẽ diſcuſſoria medicamenta tuto adhibentur, niſi columella indurari cœperit. tunc enim emollientibus etiam utendum erit medicamentis lini ſcilicet ſemine & fœnogræci, maluæ, altheæ, tragacantha, & ſimilibus è quibus gargarifmata parari poſſunt. Poſthæc diſcutientibus, ut eſt hyſſopi, caricarum, & radicis glycyrrhizæ decocto, uti oportet. Si uerò ad ſuppurationem tendat, id quod ex eius colore deprehenditur, nec ſua ſponte à collutionibus mulſæ, & oxymeliris ſcillitici purus erūpat, ferro aperienda erit. Poſt puris eruptio
nem

nem extergentibus & purgantibus medicamentis, ac subinde glutinantibus, potissimum autem cupatorij succo utendum.

De laxata columella. Cap. II.

Non raro accidit, ut columella laxata radici linguae ac faucibus incumbens propendat. Quapropter initio eandem curandi rationem adhibe quā eius inflammatio exigit. Corpus enim & caput principio uacuanda per medicamenta capite præcedenti dicta. Quibus peractis, collusiones

Gargaris. m. 2. & gargarismi ex ijs quæ adstringunt, & exiccant parètur in hunc modum: Rosarum purpurarum, oxalydis, cupatorij, singulorum fasciculum manipulem unum gallarum 3 2. aluminis 3 1. myrrhæ, thuris, utriusq; 3 1. seminis lini 3 1. f. Coquantur in aqua ad tertias, & iuri decocti per columelam trāsuso adijciatur aceti optimi 3 1. & fiat gargarisma. Pro sunt etiam pulveres per calamum uel arundinem insufflati,

Pulvis. qualis est qui habet: Rosarum siccarum, gallarum, aluminis scissi, singul. 3 1. f. piperis, zingiberis, utriusq; 3 1. myrrhæ 3 1. Contusa & cribrata per calamum insufflato. Noces etiam accipe uirides & exiccato, & palmarum ossa ubi uelis sufficienter exurito, & amborum æquales partes misceto, ac siccis tritis utitor. Item galle immature, salis ammoniaci utriusq; 3 1. Trita insufflato. Per ea itaq; quæ dicta sunt, in naturam suam reducere columellam oportet, omni conatu & molimine adhibito, neque festinandum ad eius excisionem. Quod Hippocrates quoque præcipit, qui sic scriptum reliquit: Gurgulio sine periculo præcidi & scarificari quoad rubidus ac magnus fuerit haud potest, etenim inflammatio & sanguinis p̄fusio ei accidit. Proinde oportet hūc alijs quibusdam medicamentis per id tempus extenuare eniti. Hæc ille. Quum autē per præsidia, quibus extenuandi inest facultas

tas nihil iuuantur, atq; adeò suffocationis periculū imminet,
 ad eius excisionem ueniendum erit, antea tamē aluo uacuata.
 Quod Hippocrates etiā loco prius citato diligēter monuit,
 dicens: Vbi uerò secretū fuerit omne id quod uuā appellant, „
 fitq; pars gurgulionis extrema maior & rotunda, superior „
 autē tenuior: per illud tēpus manus moliri tutū est. Sed præ „
 stat simul aluum subducere, antequā manus adhibeatur, si tē „
 pus ita permittat, ne æger stranguletur. Porro ut manū cō= Collumel-
 læ excisio,
 modius adferas, æger in splendēti & claro loco collocetur, „
 & nunc quidē os eius diducatur, mox uerò immisso forcipis „
 extremo ipsa columella producta obtorqueatur. Obtorta
 enim uelut stupida efficitur, & illaqueata curuatur citra ma-
 gnā sanguinis eruptionē. Quapropter immorari oportet
 aliquādiu, ac eā detinere, quousq; æger tolerare possit: tūcq;
 auferre non supra forcipē incisione facta, sed ad eius fundū.
 Quum enim pelliculis referta sit ipsa columella, & ob laxi-
 tatē cedat, prolixa sanē insipientibus apparet. Vnde multi
 in experti medici, siue per errorē, siue per ignorantia alius
 incidētes, eam funditus auferūt, maximiq; incōmodi autores
 ægro existunt. Columella præcisa, caput reclinetur, ne san-
 guis ad interiora repat, ac subinde os cū decocto rhoīs aca-
 ciæ, gallarum, adiecto stillaticio rosarum liquore colluatur.
 Postea ea quæ cicatricem inducere possunt, adhibeantur.

De tonsillarū inflāmatione. Cap. III.

Tonsillæ, quæ Græcis *παιδοθυα* uocantur, Galeno
 lib. 3. Aph. Comment. 26. autore, sunt inflamationes
 eorum quæ iuxta isthmum sunt locorum. Hic uerò per isth= *παιδοθυα*
 mum oportet intelligere partem illam, quæ os & gulam *μα.*
 interiacet. Sic autem per metaphoram nominatur, ab ijs qui *Tonsillæ.*
 propriè dicuntur isthmi, qui angusti quidam terræ inter *Isthmus.*
 duo

duo maria sitæ transitus existunt. Glandium uerò, quæ in fine oris utrinq; linguae appositæ sunt, è defluxu ex capite tumo-
αὐτὰς res & inflammationes, Græcis *ἀντιάδεις*, ut loco iam ci-
 tato testatur Galenus, appellantur. Verū ipsas etiā glandu-
 las Græci *πριόνια* ἢ *ἀντιάδες*, quod scilicet circa
 isthmum, & sibi ex opposito sitæ sint, nommant: quæadmo-
 dum Latini tonsillas. Barbarā scētantes medicinā amygdæ-
 las nuncupāt. Hæ sanè frequētissimè inflāmationē incurrūt:
 calidi enim & humidi sunt earū loci. Hoc malo magis corri-
 piuntur hi qui plurimo sanguine abundāt, & pueri, atq; in-
 fantes adhuc lactēres, ex lactis haustu. Accidit etiā plerunq;
 adultis à nimia meri potione, & à multa ac auidiore deuora-
 tione ciborū, maximè acrium & asperitatē inducentiū. Sic
 affectis transglutiendi accedit difficultas, & dolor, aliquādo
 etiā febris. Incipiēte itaq; inflāmatioē, cibū subtrahere opor-
 tet, & aquæ potum, aut cinnamomi decoctū exhibere, præ-
 sertim febre simul irruēte. In uniuersum uerò uictus ratio ta-
 lis sit, qualis in alijs inflāmationibus. Cibi autē sint sordiles,
 quod aliās deglutiri nō possint. Quod ad curationē spectat,
 si leuis fuerit inflāmatio, gargarismi adstringentibus & re-
 primētibus quales in principio inflāmatae columellæ assumū-
 tur, utendū. Cauēdū tamē inter initia, ne mel gargarismis ad-
 misceatur: habet enim acrimoniā, & irritat. Verū si inflām-
 atio uehemens fuerit, & periculū suffocationis imminet:
 uena cubiti exterior, quā humeralē uocant, eiusdē lateris in-
 cidēda est, repetita sanguinis detractio: maximè si iuuenis
 sit eger, & multo sanguine abundet. Quod si uenter nō pro-
 bē egerat, inijciendus est clyster. Infantiū uerò uentres glan-
 de immissa, & sedis illitionibus irritare oportet. Post euac-
 uationē reprimētibus utendum medicamētis, idq; ad morbi
 usq; uigorē. Hæc uerò omnia, ut antea quoq; monuimus, te-
 pida

Causæ.

Signa.

Victus.

Curatio.

Venæ se-
ctio.Reprimē-
tia.

pida sunt exhibenda. Extrinsecus autem leniter fouere con-
 uenit spōgijs impositis. Cataplasmata quoq; ex farina hor-
 dei, semine lini scēogræci, & similibus imponenda. Remit-
 tente autē & declinante inflammatione, mel in gargarismos
 admiscere conuenit: quod in principio, & in augmēto mini-
 mē faciendum, ne acrimonia quam obtinet, fluxum concitet.
 Hoc etiā tempore calidiores gargarismi prosunt. Extrinse-
 cus autē lana mollis oleo tincta collo circumponēda. Quod
 si ex usu acriorum collutionum aut gargarismorum inflam-
 matio exasperetur, & mordacitas inde accadat, lenioribus
 utendum, qualis est ptisanæ succus. lac etiā tepidum garga-
 rissandum. Remittente uerò inflāmatione & dolore, prædi-
 cta oris remedia sunt illimenda, immisso digito medio, ita ut
 cū leni adhibita illitione, partes tonsillarū quæ intumuerunt
 cōprimantur, quo cōtentā in se materiā excludāt. Verunta-
 men non uiolenter cōprimere oportet, quēadmodum quidā
 faciunt: qui autores ob id fiunt, quo inflāmatio amplius au-
 geatur. Si tamen aliquem hac ratione lēdi contigerit, cōten-
 ti erimus exhibitione lenientium gargarismatum, nihil illi-
 nentes. Quod si à prædictorum remediorum admonitione
 melius non habuerint ægri, suppurationem expectare opor-
 tet, quam etiam ex inflammationis augmento, & exacerba-
 tionibus ad uesteram fortioribus dignoscere licebit. Vbi au-
 tem suppurationem futuram speramus, coadiuuare oportet,
 ut quā citissimē fiat. Quare tunc exhibendi sunt gargaris-
 mi calidiores, uelut aqua mulsa calida, & decoctum carica-
 rum, hyssopi, & seminis althææ. Extrinsecus cataplasma ex
 hordeacea farina, & scēogræco, cum decocto caricarum,
 althææ & melle. Quum suppuratio perfectā fuerit, dolores
 minuuntur, & inflāmationis tumor mollior redditus, digito
 cedit: tunc sanē acriores collutiones exhibendæ sunt, ut scilicet

Suppura-
 tionis no-
 ta.

cet abscessum rumpant: In cibo accipienda frustra panis, aqua macerata q̄ maxima, & reliqua similiter quæ eis pro cibo offeruntur aceruatim ingerant. Vehementiore enim ex ijs circa tonsillas obuolutione facta, consimili modo tumores adficiuntur, perinde ac si sectionem sustinerent. A' ruptura caput ægri inclinetur ad humoris commodiorem exclusionem, & aquam mulsam gargarisset, per se, postea etiam admixto lenticule & rosarum decocto. Atq; ijs sanè immorandū est, donec penitus ad cicatricem perducatur.

De serpentibus & malignis tonsillarum vlceribus. Cap. IIII.

Causæ.

Signa.

Curatio.

Venæ sectio.

Maligna tonsillarum ulcera interdum præcedente eandem fluxu incipiunt. Aliquando autem à cōsuetis fieri inflammationibus, potissimū effertis, perficiuntur. Fiunt autem frequentissimè pueris, atq; etiam etate iam perfectis, maximè ijs qui vitiosis humoribus abundant. In pueris uerò aphtha præcedēte omnino perficiuntur. Colore similia sunt crustis, quæ ferro inuruntur. Accidit etiam ægris siccitas in transglutiendo, & suffocatio coaceruatim incidit, maximè quum rubor subit mentum. Vbi humorum acrimonia præcesserit, nome quæ depascitur locus excipit, succeditq; una putrefactio. Festinanter ijs auxilium adferre oportet. & si sunt etatis perfectæ, & nihil sit quod prohibeat, confidēter brachij uenam exteriorem, aut si illa non appareat, mediam incidere conuenit. Si uerò uirgines fuerint, quas circa etatis uigorē dum mensium purgationē appetunt, hoc malum crebro apprehendit, tunc eis malleoli uenæ sunt incidendæ, unica sanguinis detractione facta, non tamē usq; ad animi deflectionē, ne subinde profluentibus mensibus uirtus planè concidat. Deinde aluus clysteribus, glādulis, & sedis illitionibus mouen

mouenda: atq; omnibus modis conandum erit, ut auersio ab affectis partibus fiat. In quē usum cucurbitule iuxta lumbos affigendæ, ac ligaturis extremitatum utendum. Postea gargarismis uti decet, suprà in capite De columelle inflammationibus, & sequēti dictis. Post morbi principium diamorōn colluendum exhibeatur, mulsæ permixtum. Tum etiam iridis decocto, & alijs loco iam citato cōmemoratis, uti licebit. Conandum autem est in uniuersum, ne digitum quidem tonsillis ulceratis admoueamus, aut leni saltē tactu manum admoliamur. Etenim insciji ad quos maximē in rebus dubijs homines errore quodā confugiunt, uehementius illinunt, simulq; locū patientē cōprimunt, ac crustam detrahunt: quod minimē facere conuenit, priusquam eleuatam & uix immittentē crustam conspiciamus. Quod si enim adhærentem adhuc crustam auellere aggrediamur, ulcerationes magis in profundum procedunt, & inflammationes consequuntur, augenturq; dolores, & in ulcera serpentina proficiunt. Itaq; sicca quidē remedia insufflare conuenit: liquida uerò cum pinnula illinire, ita ut quantū licuerit, quàm penitißimē pinnulā immittamus. Mirabiliter autē crustas aufert stercus caninū, cū melle illitū: quod tum optimū erit quum osibus canes antea per biduū fuerint nutriti. Magnopere enim auxiliatur, neq; odiū sui inducit, neq; insuauitatē repræsentat in cibo oblatū. Cinis item ustarū hirundinū, & centaurij minoris usti cinis cū melle. Oportet aut post irritationes à medicamētis factas lenire cū glycyrrhizæ decocto & eo qui ex mastiche, myrrha, tragacantha, amylo, & croco constat gargarismo. Cohibito autē iam ulcere pascēte, lac gargarissandum, lemnia terra permixtum. Quid multa: in repurgandis explanādīsq; ulceribus maximē sollicitū esse oportet. Infantes enim pluri in ulcerum repurgatione conuulsionem passi sunt. Ali-

Auersio,

Stercus caninum,

m

qui

qui uerò uia transglutiendi exiccata, sunt strangulati. Forim= secus certè fomenta adhibere cōuenit, & cataplasmata, cum cautione, ne refrigeremus. Feliciter enim res procederet, si intrinsecus detentam materiā extrā possent transferre. Cōtegantur itaq; semper post cataplasmatum ablationem, partes circa mentum, circumpositione lanarū mollium in oleo nardino irrigatarum. Porro ubi crustæ solutæ fuerint, & ulcera ipsa purgata, hoc remedio utendum erit, quod habet:

Illitio.

Florum rosarum purpurearum 3 3. croci 3 1. f. balaustiorū 3 6. myrrhæ 3 1. nucum pinearum repurgatarum 3 2. amyli 3 1. rhois culinarij, aluminis scissilis, utriusq; 3 1. f. Tritis & subactis melle, ad illitionem utere.

De angina. Cap. V.

κωάγυ =
 γη.
 Angina.

KΥνάγχη & σωάγχη Græcis, Angina Latinis, propriè inflāmatio est, quæ in gutture uel faucibus fit. Sic dicta quidē ἀπὸ τῆς κωάγχευ ἢ σωάγχευ, hoc est, à suffocando, quod exitiosum & acutissimū sit malū, quod strāgulatu præsentaneū uitæ discrimen inferre solet. Hippocrates tamen & alij ueteres omnia mala quæ in locis iam dictis accidunt, & quas spirādi comitatur difficultas, anginæ nomine appellat. Porro anginæ quatuor differētiae existūt. Vna, cum fauces inflāmantur, per fauces autem φάεργα Græci uocant, locū intra os, ubi tum gula, tū aspera arteria extrema cōueniūt, intellige. Altera, quum neq; fauces, neq; reliquæ oris partes, neq; etiā externarum partium ulla inflāmata uidetur, eger tamē suffocationis periculū in gutturæ sentit. Tertia, ubi gutturis partes tum internæ, tum externæ iuxta inflāmantur. Quarta, ubi ad anteriore regionē ceruicis uertebrae luxantur, unde cauus apparet locus, & dolorē quum extra attingitur, eger sentit. Recentiores medici, ut Paulus

Aegine

Angine dif= ferentiae quatuor.
 Fauces.

Aegineta, & alij quidā, inter cynanchen & synanchen, item paracynanchen & parasynanchen discrimen faciunt, atque adeò $\sigma\omega\acute{\alpha}\gamma\chi\lambda\omega$ uocāt inflammationē, quæ in interioribus faucium musculis oritur. Quæ uerò in exterioribus eorundem fit musculis, $\pi\acute{\epsilon}\gamma\alpha\sigma\omega\acute{\alpha}\gamma\chi\lambda\omega$ nomināt. Quod si interiores gutturis muscoli inflammatione cōsistuntur, $\kappa\omega\omega\acute{\alpha}\gamma\chi\eta$: si uerò exteriores, $\pi\acute{\epsilon}\gamma\alpha\kappa\omega\omega\acute{\alpha}\gamma\chi\eta$ his ipsis appellatur. Galenus tamē lib. 4. De malè affectis locis, cap. 5. & 3. Prognost. Cōment. 2c, hoc discriminē manifestè reprehendit. Oritur angina à sanguine copioso ac calido, præter naturā ad loca nūc cōmemorata cōfluente. Dignoscitur ijs indicijs: Spiritus nō nisi rectā ceruice, aut difficulter trahitur. Transglutiendi quoq; difficultas adest, quibusdā etiā febris. Rubor faciei, & colli. Adhæc in nōnullis etiā tumor superuenit. Aeger aperto ore hiat, atq; aērē attrahit. Initio itaq; præceptum & cōpendiariū auxilium omnis angina requirit. Quare protinus cubiti uenæ exteriorē eiusdē lateris incidere oportet, nisi quiddam maioris periculi impediat. Parcè autem, & pluribus interpositis uicibus, non confertim, auferendus sanguis. Quippe cummulata cōfertimq; facta uacuatione, animo cito linquūtur, atq; adeò suffocationis periculum superuenit, & aliàs sanè ex refrigerationibus & animi defectione perfacile materia à faucibus ad pulmonē defertur, & inenitabile periculum infert. Curandum etiam, ut modica fiat uenæ diductio. Nam tum in alijs, tum in magnis uenæ diductionibus acceruatim animi defectus irruit. Neque tamen angustiores facere uenæ incisionem cōuenit, ne sanguis uelut percoletur, & crassior eius pars intus remaneat, quæ causa huius mali existit. Vtilis est autem eis repetita detractio sequenti die, nisi præpediat ægri tumor, aut animi deliquium. Quod si ægrotans sit mulier, uena malleoli incidenda est, potissimum ubi men-

Causa.
Signa.

Curatio.

Venæ sectio.

Modica
venæ diductio facienda.

Si ægrotans sit mulier,

- ses restricti fuerint, moderateq; sanguis educendus. Si per hæc parum proficitur, eas quoq; uenas quæ sub lingua sunt, incidere cõuenit, idq; primo statim die, uel secundo. Quod si quid
- Clyster.** uenæ sectionem fieri prohibeat, alius acriore clystere, qualẽ in capite De apoplexia descripsimus, eluenda erit. Post uniuersales autẽ euacuationes, cucurbitas affigere oportet. Et si
- Cucurbitæ** quidẽ tumor circa maxillas, aut sub mēto persistat, ipsi quidẽ tumori, & cū scarificatione plurimũ sanguinis extrahere, saleq; respergere scissuras, & cõfricare. Quod si nullus extrinsecus appareat tumor, retro in collo iuxta primã uertebam cucurbitula apponẽda erit, & constanti attractione
- Auersio,** utendum, frequentiusq; cucurbita auellenda. Auertẽdi quoq; humores, ne ad dolentiẽ atq; inflammatione affectum locum confluant. In quem sanẽ usum pedes aqua calida foueri debent, & extremæ partes ualidẽ deligari ac fricari. Collum etiam lanis succidis, aut oleo calido imbutis contegendum.
- Gargarismi.** Gargarismatis quoq; statim per initia utendum, quæ neque uehementer repellunt, neq; solum discutiunt. Quæ enim admodum repellunt, ea humores ad pulmonem trudẽdo, suffocationis periculum afferũt. Quæ uerò tantum discutiũt, plus ratione sui caloris quàm par sit, attrahunt. Quapropter ubi initium fuerit cum multa inflammatione, ea quæ leniter adstringũt, offerre oportet: uelut est rosarum, lentium, & palmarum decoctum. aut certẽ adstringẽtibus gargarismis, supra capite De columellæ inflammatione dictis, aliquid medicamentorum discutientium commiscendum. Eius quidem generis est flos rosarum, aut rhus cum aqua mulsa decoctus, & myxarum decoctum. Quum morbus uiget cõsistit' ue ijs quibus discutiendi tantum facultas inest, utendum præpropere præsidij, ut est decoctum fœnogræci, ficuum, uuarum, passarum, glycyrrhizæ: uel ualentiorum, iridis nimirum radi

radicis, hyssopi, nigellæ, abrotoni, cum oxymelite. Licebit itaq; hoc tempore uti tali gargarismo, qui habet: Glycyrrhizæ decorticatæ ꝛ 1. uuarum passarum ꝛ ꝑ. caricarum numero 6. scœnogræci ꝛ 2. hyssopi, abrotoni, utriusq; m. f. Coquantur in libra una fontanæ aquæ, donec medieta absumatur. Iuri decocti colo trāsuso adijciatur mellis rosacei colati ꝛ 1. f. oxymelitis simplicis ꝛ 1. Cōmixtis omnibus, fingatur gargarismus. Item stercus caninum, quale prædiximus cap. 4. Stercus caninum, aridum cōtusumq; & cribratum cum melle, quā penitissimè illitū, ut transglutire possint, præstantissimum, Galeno etiā autore, remedium existit. Est autē eiusmodi, quod colore candidum est. Hirundinū similiter ustarum cinis mirè efficax esse solet. Foris deniq; ceruici, quæ concoquere & discutere possunt ea quæ inflammatione laborant adhibeantur cataplasmata, quale est quod accipit: Farinæ seminis lini scœnogræci, hordeacæ, singul. ꝛ 1. seminis althææ ꝛ 3. maluæ, florū chamæmeli, meliloti, singul. m. 1. Coquantur in aqua donec mollescant, dein in mortario contendantur, & informetur cataplasma. Vel adiectis oleorum chamæmelini, liliacei, utriusq; ꝛ 1. f. & iterum ebullitis, fingatur emplastrū. Neq; inutile erit, si collum oleis chamæmelino, anethino, liliaceo imungatur: aut decocto scœnogræci, meliloti, chamæmeliq; foueatur. Qui angina infestantur, triduo aqua mulsa pro cibo utantur, inde ptisanæ cremore per se, aut cum suauī quadam potione. Præditus enim est is succus facultate extenuandi, discutiēdi, alendi & refrigerandi. Vbi inflammatio remiserit nonnihil, & æger iam melius deglutire cœperit, ouorum lutea per liquida, ac sorbitio ex alica præbenda. Quid multa? cibi ægrotantis uiribus respondeāt: ideoq; immodica alimenta uitanda. Somnus quoq; ut in alijs omnibus inflammationibus, sic in angina omnium maxime fugiendus. Nam in somno,

Epid. 6. ut Hipocrates dixit, sanguis intrò repit, atq; adeò humorum
 Par. 5.
 Aph. 29. ad locum patientem defluxum auget.

De tussi. Caput VI.

Causæ in-
 ternæ,

Externæ.

Signa fri-
 gidæ intē-
 periei,

Tussis uariæ sunt causæ. Nam intemperies frigida in-
 strumentorum respirationi seruientium, Galeno lib. 2.
 De sympt. causis teste, tussim efficit. Humor item à capite ad
 asperam arteriam destillās, & sola asperitas mēbrane aspe-
 ram arteriā intrinsecus ambiēs, tussim irritāt. Qui præter-
 labuntur etiam potus & cibi, tussim mouent. Lumbrici quoq;
 stomachū infestātes, tussiculas paruas excitant. Acris deniq;
 humor stomachum perturbans, ac irritantē aliquam quali-
 tatem ad fauces demittēs, tussim facit. Insuper humor in pul-
 mone & thorace detentus, in pulmonis inflammatione, mor-
 bo laterali, & tabe, maximæ tussis causa existit. Inter ea quæ
 extrinsecus adueniunt, atq; tussim mouere possunt, sunt fu-
 mus, puluis, & quicquid est eorum quæ asperam arteriam
 exasperant. Signum autem propter solam frigidam respira-
 tionis instrumentorum intemperiem tussientium est, quod
 sic affecti nihil inter tussendum expuunt. Neq; uiolenta tussis,
 neq; coacta, sed adeò exigua est, ut non solum per spiri-
 tus detentionem suppressi, & ne eueniat prohiberi possit:
 uerumetiam, nisi magna admodum fuerit, sanari, eò quod per
 spiritus inhibitionem frigefactæ particule calefiāt. Præter-
 ea qui hac tussi laborant, per crebras inspirationes magis
 irritantur, frigiditate uidelicet exinde intentione facta &
 aucta. Quare si hi leniter inspirant, ac aërem attrahunt, &
 in calida domo uersantur, parum, aut omnino nihil tussunt.
 Facie deniq; sunt pallida, siti nulla premūtur: calidis optime,
 frigidis malè afficiuntur. Quæ singula, ut alia omnia, Hip-
 ocrates lib. 6. Epid. Par. 2. Aph. 12. breuiter admodum ijs
 comple

complexus est uerbis, inquit: Tusses sicca, leuiter irritan-
tes, non admodum siticulose, non à maligno, sed uento potius
accidunt. Id uerò hinc manifestū fit, quando loquuntur, aut
os aperiūt, tunc tuſiunt, quum uerò non, minimè. Hæc ille.
Que uerò cum titillatione partiū ab utraq; parte palati cō-
tingunt tusses, palam ostendunt defluxum à capite ad aspe-
ram arteriā deferri, itemq; ad pulmonem: id quod ex difficili
que comitatur ſpiratione, facile deprehenditur. Quod si sic
affecti nihil expuant tenuē esse defluxum indicat, qui expul-
sione ſpiritus diſſectus, præ tenuitate sua nō ultrā fertur, sed
rursus fluxum reſectit. Ratio uictus pro cauſarū diuerſitate
uariabitur. Si enim ex frigida intemperie instrumentorū re-
ſpirationi ſeruiētium orta fuerit tuſis, aër & uentus qui in-
ſpirantur, cibi etiā potus frigidi uitandi erūt. Sin ob humorē
à capite deſtillantē excitabitur tuſis, talis ſit uictus, qualem
ſuprà in capite De deſtillatione deſcripſimus. In uniuersum
autem ſalfa acria, & quæcunq; arteriam exaſperare ualent,
fugienda. Porro tuſis ex frigidityte instrumentorū reſpira-
tionis orta, per præſidia quæ eadem excalfacere poſſunt cu-
rabitur. Ceruix itaq; lanis calidis uestiatur, rarò inſpiretur:
quòd ſpiritus cōpreſſio, ut paulo antè dictū est, nō ſolū tuſi-
m impediāt, imò etiā ſæpiſſimè ſanet. Quare multum con-
ducit ut ægotantes in calida domo uerſentur, & leniter ad-
modum inſpiret. Thorax etiā calidis unguētis, quale eſt iri-
num, liliaceum, anethinum, & eiufmodi, ſoueatur. Si uerò hu-
mor tenuis & acris ex capite in aſperam arteriā & thora-
cem deſtillās, tuſim excitauerit, tū per boni ſucci cibos, po-
tiſſimū et p medicamēta quæ refrigerāt, ſpiſāt, acrimoniāq;
ac mordacitatem temperant & obtundunt, ſanabitur. In
quem uſum conuenit exhibere ſerapium uiolaceum, nym-
pheæ, de papauere, antidota diatragacanthæ, diapenidiſ ſine

Signa hu-
moris à ca-
pite ad a-
ſperā arte-
riam deſtil-
lantis.

Victus.

Curatio.
tuſis ab in-
temperie fri-
gida.

Tuſis à te-
nuibus &
acribus hu-
moribus cu-
ratio.

speciebus, pilulas bechicas, & id genus alia. Item ea etiā medicamenta, quæ à ueteribus dolorē leuantia & arteriaca nominata sunt. De quibus copiosissime scribit Galenus lib. 7. De cōp. medic. secundū locos. Inter alia uerò hoc potissimū

Ecligma. cōfert ecligma, quod habet: Sacchari uiolacei & nymphae, utriusq; ꝛ ꝛ. diatragacanthæ, diapenidij sine speciebus, utriusq; ꝛ ꝛ. succi glycyrrhizæ ꝛ ꝛ. pilularū bechicarum ꝛ ꝛ. styracis calamitidis ꝛ ꝛ. myrrhæ, rosarum siccarum, utriusq; ꝛ ꝛ. tragacanthæ, nucum pinearum, utriusq; ꝛ ꝛ. serapij uiolacei quantū ad excipiendū satis est, fiat ecligma. In eum locum referenda uenient & ea medicamēta, quæ suprà in capite De destillatione dicta sunt. Caterum si crassus & uiscidus humor tussis causa fuerit, per ea quæ incidunt & extenuāt medebimur. Quare tum exhibenda egrotantibus serapia de glycyrrhiza, de hyssopo, de prasio, è calamintha, & similia. Aut decoctum hoc, quod accipit: Radicū iridis, petroselinij, glycyrrhizæ singul. ꝛ ꝛ. radicis helenij ꝛ ꝛ. caricarū num. 7. uuarū passarū mūdatarū ꝛ ꝛ. seminū urticæ, anisi, fœniculi singul. ꝛ ꝛ. hyssopi, adiāti, scabiosæ, marrubij, singul. m. ꝛ. ꝛ. agarici optimi ꝛ ꝛ. Coquātur in aqua fontana iustæ quātitatatis, donec tertia pars absumat, deinde colo transfundatur, & iuri decocti adijciantur serapij de hyssopo, è marrubio, utriusq; ꝛ ꝛ. fiatq; potio. Postea, si ita è re egrotantis esse uidebitur, corpus per ea medicamenta quæ crassos & lentos humores purgāt, euacuandū. Inter alia uerò cōplura, quæ in superiore libro à nobis dicta sunt, unicē cōfert agarici dilu-

Decoctum

Purgatio.

Agarici dilutum.

tum, quod in eū paratur modū: Accipe agarici electi ꝛ ꝛ. zim-giberis ꝛ ꝛ. salis fossilis grana ꝛ. Trita macerētur per noctē in uini albi odoriferi ꝛ ꝛ. liquorisq; stillatitij absinthij, & fœniculi, utriusq; ꝛ ꝛ. Mane colentur & exprimantur, atq; adijciātur compositionis indi maioris ꝛ ꝛ. ꝛ. oxymelitis scyllitici

litici ꝛ ꝑ. ꝛ formetur potio. Vacuato tandē corpore, eclig=
mata, quæ officinis hodie Arabica uoce loch appellantur, de
uoranda erunt, cōmixtis interdum alijs antidotis in hūc uel
consimilē modum. Accipe ecligmatis ē pino, sani ꝛ experti, Ecligma.
ē scylla, singu. 3. 1. diaireos solomonis ꝛ 1. pastillorum thora=
ci adaptorū ꝛ 1. ꝑ. pulueris diapenidion cū speciebus ꝛ 1. pul=
ueris radice helenij, iridis, utriusq; ꝛ 1. ꝑ. succi glycyrrhizæ
ꝛ 1. ꝑ. serapij de marrubio quantum ad excipiendum sufficit.
Thorax præterea extrinsecus mungatur oleis calidis, lilia=
ceo, irimo, amygdal. dulcium, adiectis pinguedinibus, ꝛ alijs
hoc quidē modo: Accipe oleorum liliacei, amygdal. dulcium, Vnguentū.
utriusq; ꝛ 3. 1. pinguedinis gallinæ ꝛ 1. ꝑ. butyri recētis ꝛ 2. suc=
ci fœnogræci, radice althææ, utriusq; ꝛ 1. styracis ꝛ ꝑ. pulue=
ris radice helenij, iridis, utriusq; ꝛ 3. 1. croci ꝛ ꝑ. Cum cera
quod satis est, fiat unguentū. Reliqua quæ ad tuſis curatio=
nē necessaria sunt, ex capite De destillatione petenda erunt.

De asthma Cap. VII.

Qui circa febrem crebrò respirant, ut solent, qui cita=
tiore cursu fatigati sunt, à symptomate quod super=
uenit, medicis Græcis ἀσθματι, Latinis an=
helosi ꝛ suspiriosi appellātur. ijdē ab alio symptomate, qd' ἀσθματι=
scilicet perpetuo uniuersum supra thoracē corpus penitus
rectū habere cogūtur, metuentes ne suffocētur, ὀφθονοί, ὀφθονοί.
quasi dicas, non nisi recta ceruice spirantes, nōminantur. In=
spiratio enim minor ipsis cōtingit, quā respirationis fre=
quentia exposulat, quāuis thorax plurimū ipsis diducatur.
Ex quo manifestum fit, coarctationē locorum præter natu=
ram intrinsecus adesse, cuius etiā manifestē agri sensum pci=
piūt. Fit itaq; asthma, quū aut crassorū, ꝛ tenaciū humorū Causæ,
copia pulmonis bronchijs cartilaginibus uel fuerit infarcta:

m s aut

Signa, aut tumor quispian abscessui similis in ipso constiterit. Si militer uerò difficulter spirāt, qui asperā arteriā à multa destillatione repletā habēt. Facile autē inuicē hæc mala distinguuntur. Nam destillatio etiam sanis ex manifesta causa confestim accidit, in totum ferè citra febrē, cōcomitantibus etiā proprijs destillationis indicijs. Si uerò tumor abscessui similis in pulmone fiat, necessario febris cōsequitur: neq; ita diu post, inflammatione suppurata, prius cum tussi reijcitur. Si autē nonnullis crudum tuberculum gignatur, ij neq; grauitatem magnā sentiunt, neq; difficultate spirandi admodū infestantur. Qui uerò propriè asthmatici & orthopnoici appellantur, in totum febrē non habent, grauitatis autē sensus eis contingit, neq; quippiā purulentū per sputum reiectāt. Por-

Victus,

rò uictus ratio in uniuersum calida & sicca sit. Quapropter uitandus aër frigidus & humidus. Carnibus utendū perdicum, auicularum montanarum, gallinarū, caporū, & eiusmodi. Fugiēdi pisces, fructus, legumina, et itē omnia alia quæ crassos & lentos humores procreare possunt. Vsus frequēs sit hyssopi, oreoselini, & fœniculi. Vini quidē potio amobus cōuenit malis, saltē tenuis substantiæ. Potus uerò in uniuersum sit exiguus, ijs quibus abscessus oboritur: multus autem, quibus bronchia & cartilagine tenacibus & crassis humoribus sunt obstructa. Siquidē eos humores repurgātia et abstergētia medicamēta, necessario tusses cōmouēt. Verū nō facile per sputū reijcitur ob crassitudinē, id quod repurgatum & abstersum est: humectatione igitur multa, quo facilius efferatur, indiget. Exercitio ante cibum utendum, at nequaquā subito, quod cōplures hac ratione extincti sint. Frictiones thoracis prosunt. Animi perturbationes, ira potissimum & mœror, fugiendæ. Ceterū curatio prædictorū malorum quiddā commune obtinet, quiddam etiā propriū. Cō-

Curatio

mune

mune quidē utrifq; ut redundantia humoris hæc uitia pro-
 creantis absumatur & aboleatur. Propriū uerò, ut si à cras-
 sis ac tenacibus humoribus oriatur malū per extenuātia &
 extergētia medicamēta sanetur. Si uerò à tumoribus absces-
 sui similibus pathos fiat, per extenuātia & exiccantia. Quæ
 quidē curandi ratio uniuersis in profundo corporis latentibus
 cōmunis est. In crassis itaq; & tenacibus humoribus cō-
 ueniūt ea quæ citra uehementē calefactionē extenuāt & ab-
 stergunt medicamenta. Siquidem ab immodico calore, ueluti
 etiā frigore, crassi & tenaces humores magis crassescūt, co-
 guntur, cōtrahunturq; ita ut subinde difficulter abstergi &
 auelli possint. Quare eis maximē prodest oxymeli scylliticū,
 ipsaq; scylla assa, cum melle trita & delinita. Serapia item ex
 glycyrrhiza, è marrubio, & hyssopo, atq; decoctum quod
 paulo antè in capite de tussi commemorauimus. Quod ad
 euacuationē spectat, si necessitas urgeat, uena in cubito me-
 dia, aut interna præ omnibus ijs incidenda, & tantum san-
 guinis, quantum uires patiūtur, detrahendū. Sin corpus ple-
 thoricū haud fuerit, præmissa humorū ad euacuationē præ-
 paratione, medicamenta fortiora, quæ crassos & tenaces hu-
 mores uacuāt, frequenter propināda. Quare in hunc usum
 cōueniunt catapotia de agarico, & cochia uocata, item dia-
 turpetu cum rhabarbaro scenitico, cōpositio indi, & dia-
 phenicōn, Dandū etiā agarici dilutum, quod præcedenti ca-
 pite descripsimus. Alius præterea clysteribus ualidioribus
 eluēda. Vomendū etiā per interualla ex sumpto raphano, &
 alijs quæ uomitum citant, de quibus capite. 33. libri primi di-
 ximus. Interea tamē dum frequētior sit purgatio, exhibenda
 erunt medicamenta, quæ sensim & paulatim humores in
 thorace extenuare ac discutere possunt. Proinde aristolo-
 chia rotūda, helenij & iridis radices, urticæ semen, hyssopus,
 nigella,

Si crassi
sint humo-
res,

Præpara-
tio humo-
rum,

Vacuatio.
Venæ se-
ctio,

Purgatio,

nigella, calamintha, & id genus alia medicamenta, è quibus decocta, uel ecligmata construere licebit, assumenda. In què usum etià ea ecligmata quæ suprâ in capite de tussi recensuimus, cōpetent. Extrinsecus thoraci cataplasinata è ficibus, & hordeacea farina, magis uerò ex loliacea habente resinâ, mel, & ceram commixta, imponenda. Thoraci etià olea & unguenta calefacientia, irinum, anethinum, rutaceū, & eius-
Vnguētū • modi admouenda. Tale est, quod habet : oleorū anethini, rutacei, utriusq; ʒ ʒ. adipis gallina, anatis, utriusq; ʒ 2. Radicū iridis, helenij, dracontij maioris, singul. ʒ 1. seminis lini ʒ 2. styracis ʒ 3. ceræ quod satis est, fiat unguentē. Thorax tamē nunquā non antea fricandus luteo aspero, quo reſeratis ac diductis meatibus uis medicamentorū ad profunda prōptius penetrare ualeat. Ceterū ijs; etiā medicamētis utendum, quæ exulcerare cutē, & sanie serososq; humores extrahere possunt, qualia sunt quæ rubefacientia nominantur. In hunc usum thorax & pectus cū urticis confricari & cædi potest. Loci autem rubefacti cum lauacro ac oleo calido curandi. Porro in malo inueterato, & omni medicina frustra adhibita, ad uestionem confugiendum erit. Quæ qualis esse debeat, docet
Abscessus
curatio. Aëtius lib. 8. cap. 57. Quod ad abscessus attinet, qui attenuantibus & resiccantibus indigent medicamentis, ut dictum est, sciendū eos aromatu maximè facultatibus gaudere, quod scilicet hæc omnia sint tenuiū partiū, & exiccatoria, nec nō calefacientia. Quare tum antidota ex ijs cōposita, ut est theiaca, mithridacion, diamoschi dulcis, diambas, odoratū rosaceum, & id genus alia, maximè danda sunt asthmaticis.

De pleuritide. Cap. VIII.

Pleuritis.

ΠΛΟΥΡΙΣ, exquisitè & propriè loquendo, inflammatio est mēbranæ intrinsecus costas & latera succingen

cingentis. Latinis lateralis dolor appellatur. Nec temerè ad-
iectum est (exquisitè & propriè loquendo) siquidè ex crudi-
tatibus plurimis, cibisq; crassis ac pituitosis crudi, lentiq; &
crassi humores in corpore generantur, qui nonnunquā repen-
te in uacuū thoracis locum, Aetio lib. 8. cap. 68. teste, inge-
runt, aut in ipsum etiā pulmonē, atq; sua multitudine succin-
gentē latera intrinsecus membranā distendētes inferūt do-
lores, ut imaginatio factæ inflātionis imperitis exhibea-
tur. De ea itaq; hic nihil agetur, quod curatio eius ab asthma-
tis curatione parū, aut nihil absit. Pleuritis, quæ succingētis
intrinsecus latera mēbrane est inflammatio, fit ex sanguine
copioso calido, ad iam dictam membranā præter naturā cō-
fluente. Hæc cōsequitur spirādi difficultas, tuſis febris cōtinua,
dolor uehementè pungēs, pulsus durus, & serræ modo asper.
Quod si sputū rubrū & cruentū fuerit, sanguinē superare
significat. Sin flauum & subpallidū, flauā bilem. Quemadmo-
dum si albū fuerit, & leuiter spumofum, pituitā: nigrius ue-
rò, melancholiā in sanguine præualere mōstrabit. Succo pti-
sanæ primis duobus diebus cōtentus in cibo æger sit. Deinde
quū ptisana amygdalæ mūdatur & trita, decoquatur, idq; ma-
tutino potissimum tēpore. Vespere sumat lac amygdalarū,
aut panis puri micæ cum iure gallorum, maximè ubi ægri
uires imbecillæ fuerint. Pisces etiam saxatiles in declinatione
potissimum morbi dare cōuenit. Acerba & adstringentia in
uniuersum omnia uitanda. Potus sit aqua in qua decoctū sit
cinnamomū. Frigidā aquā, quod sputū in crudeſcere faciat,
tanquam summè exitiosam uitet æger. Vino quoq; omnino
arceatur. Decumbat in latus affectum. Iram & mœrorem,
aliasq; animi perturbationes molestas fugiat. In curandi
ratione principio diligenter à medico erit considerandum,
num corpus ægri plenitudine laboret nec ne, ut nimirum
intelli

Dolor late-
ralis.

Causa.

Signa.

Victus.

Acerba &
adstringen-
tia vitanda.

Curatio.

- intelligat, quādo calorificis medicamentis inter initia dolor mitigari ac dissolui possit, & quando minus. Si enim corpus plethoricū nō sit, tum incipiente phlegmone, calefacientibus medicamētis & fomētis, dolor mitigari & discuti debet.
- Fomenta calida.** Nempe Galeno lib. 2. Viſt. acut. cōment. 1. teste, fomēta calida cutem ipsam ad perspirationes rariore efficere, phlegmonisq; sanguinem tum tenuare, tum per halitum digerere cōsueuerunt. Quæ si facta fuerint, non solum aliquid sanguinis euacuabitur, uerum etiā partes affectæ, quæ minus distenduntur, mitius subinde dolebunt. At si uel plethoricū corpus fuerit, uel malo succo redūdet, ut lib. 13. Ther. meth. testatur Galenus, curatio per ea quæ sic calent non inchoanda, fluxionē enim ad partē affectam citat. Siquidē pars cui calorifica hæc admouentur, plus trahit quā euaporet. Quapropter tum fomentorum calidorum, utpote quæ dolorē soluere nō possunt, nullus esse usus debet, sed totum corpus uenæ sectione præuacuandū erit. Huc sanē respexit Hippocrates, qui lib. 2. Viſt. acut. ab initio statim sic scriptum reliquit: Lateris dolo-
- “ rem siue is per exordia fuerit, siue postea obortus sit, tentare
- “ calidis fomentis dissoluere, non abs re existit. Tentare, inquit
- “ non abs re existit, quasi dicat: Quū fomenta calida dolorem non soluerint, ijs diutius utendum non erit, quod scilicet sanguinis in phlegmone copiam dissoluere haud possint, sed cōfestim ad totius corporis, per sanguinis missionem, ueniendū uacuationem. Secunda igitur uena cubiti interna quam iecorariam & lienarem uocant, in eo brachio quod ē directo loci patientis positum est. Nam (ut Galenus in libro De curā di ratione per sanguinis missionem ait) sanguinis missio quæ ē directo laborantis lateris adhibita pleuriticis fuit, clarissimam sæpe utilitatem affert: quæ uerò ex brachio opposito, aut omnino nullam, aut obscurā, aut certē post temporis in-
- ter

teruallum. Siquidem hæc non solum à parte affecta retrahit, uerum etiã celeriter, quod in pleuritide, alijsq; inflammationibus internis maximè requiritur, euacuat: quemadmodum in nostra aduersus Brachelium apologia copiosè, multisq; argumentis demonstrauius. Eousque autem Hippoc. loco paulo antè citato, teste, sanguis auferendus, donec uel multo rubicundior, uel pro puro rubidoq; liuidus fluxerit. A uenæ incisione clyster leuis aluo, si modo sponte sua, ut conuenit, non deiiciat excrementa, infundatur, qualis est qui habet: Maluæ, foliorum uiolarum purpurearũ, mercurialis, spina Cyster, chie, intubi hortensis utriusq; singul. m. i. hordei integri 3 i. Coquantur singula in aqua iustæ quãtitatis, quoad tertia pars absumatur. Dein accipiat iuris decocti lib. i. medullæ castiæ fistularis recens extractæ 3 i. f. oleorum chamæmelini, uiolacæ, utriusq; 3 i. f. butyri recentis salis expertis 3 f. salis uulgaris 3 i. Commixtis omnibus fiat clyster. A corporis uacuatione calorifica & dolorè leuantia fomenta extrinsecus adhibeantur, ut sunt sacculi, qui à posterioribus Græcis *μαρτυριαι* uocantur, è floribus chamæmeli, anethi, meliloti, uerbasci, seminibus lini, fœnogræci, milio & surfure cõpositi. Aqua etiã calida, aut iam dictorum medicamentorũ decoctũ, aut olea in utre, uestica, uel alio uasculo adhibendũ. Quinetiã utiliter admouetur sponsia magna mollisq; prædictis rebus irrigata, & subinde expressa, ac calida imposita. Vestienda uerò fomenta sunt, ne scilicet uis eorum celeriter euanescat. In hunc etiam usum cõuenit hoc emplastrum, quod accipit: Emplastrũ Florum chamæmeli, uerbasci, anethi, singul. m. f. seminis lini, fœnogræci, utriusq; 3 i. seminis anisi 3 i. farinæ hordei m. f. Contusa ebulliant in aqua, dum in mellis crassitudinem coeant: postea adiectis oleorũ anethini & chamæmelini, utriusq; 3 i. f. ebulliant iterum, & addantur duo uitelli ouorum, croci

Cucurbita croci 3 1. & fingatur emplastrū. Post septimum uerò diem, si eodem modo persistat dolor, cucurbita lateri affigēda est, & cutis scarificāda. Manifestissima enim in pleuriticis utilitas ex cucurbitæ appositione apparet. Vulnuscūla uerò scarificati loci sale cōspargenda, si modò sustinere ægri queāt. In alijs autem linteolū oleo madefactum ac sale conspersum imponatur. Sequēti deinde à scarificatione die, optimum est rursus cucurbitam affigere, quo sanguis saniosus ex impactis uulnuscūlis extrahatur. Hæc enim detractio priore commo-
Sputi edu- **dior** existit: nō enim sanguis, sed sanies in secūda detractiōe
ctionem fa- aufertur. Non negligat etiam medicus exhibere ægrotāticæ
cilem effi- medicamenta, quæ ad sputi facilem excreationē cōducunt, ut
cientia. est diapenidiōn, diatragacanthēs, saccharum uiolaceum, pa-
 stilli pectorales, adiectis alijs ecligmati capite de tussi com-
 memoratis. Extrinsecus adhibēda medicamēta, quibus discus-
 tiendi inest facultas, ut est fœnogræcum, anethum, melilotū,
 hyssopus, et similia nunc sæpius cōmemorata. Quod si tamē
 permutationis in pus signa appareāt, coadiuuare permuta-
 tionem oportet, hoc aut simili unguētō, quod habet: Oleorū
Vnguētū. chamæmelini, amygdal. dulcium, liliacci, singul. 3 3, butyri sa-
 lis expertis, pinguedinis gallinæ, utriusq; 3 2. succi fœnogræ-
 ci, seminis lini, althææ, singul. 3 1. ceræ quod satis est, fiat una-
 guentum. Rupta tandem phlegmone ea quæ extergunt, atq;
 à pure ac sanie purificant, exhibeantur: ut est aqua mellis, aut
 decoctū hordei, aut sacchari rubei. facta puris & saniei ab-
 sterfione. glutinantia adhibeantur medicamenta. De quibus
 omnibus copiosè in capite de phthisi dicemus.

De Peripneumonia. Cap. IX.

Peripneu-
 monia.
 Causa.

Peripneumonia inflammatio est pulmonis, cum febre ac-
 cuta. Hæc magna ex parte à ualidioribus in pulmonem
 destilla

destillationibus, aut angina, aut asthma, aut pleuritide, alijsue morbis fit. Aliquādo etiā ipsa inflāmatio mali origo est. Hoc quidē correptos cōsequitur difficultas spiritus. pulmo Signa
 enim cordi incumbēs, suffocationem infert: febris acuta et
 ardens, grauitas distensioq; thoracis citra dolorem. Quōd si
 mēbranæ ipsius, quæ cum thorace secundū longitudinē eius
 sunt cōnexæ, fuerint inflāmatæ, etiā dolorē percipiunt. Male
 ijs rubēt, et tota facies, nasus in summo fit simus, uenæ tem-
 porū eleuantur, oculi intumescunt, linguæ adest siccitas, de-
 iectio appetitus, expiratio calida, aquæ frigida, magis uerò
 aëris frigidi cōcupiscētia, tussis sicca. Si autē quid efferatur,
 spumofum est ac biliosum, ampliusq; cruentum et floridum Signa mor-
 uehementer: quod etiam pessimæ significationis existit. Et si is,
 mortale malū fuerit, uigiliæ amplius aderunt, aut somni bre-
 ues comatodes, extremitates frigida, unguēs liuidi incuruan-
 tur, quarta, aut summum septima die hi moriuntur. Verū si Salutis,
 ad salutē permutetur morbus, sanguinis eruptio abundanter
 sequitur, aut alui perturbatio, multis exeuntibus biliosis et
 spumosis humoribus. Aliquādo autē inflāmatione in pus cō-
 mutata, per uentrē aut urinam pus excernitur, statimq; ab o-
 mni molestia liberātur. Quōd si in pulmonē irruerit acer-
 uatim, aut suffocat, aut cum grauibz symptomatis in tabem
 permutatur. Quod ad cibū spectat, dāda est peripneumoni- Victus,
 cis sorbitio ex ptisanæ cremore cū melle, origano, aut hyssopo: magis enim quā in pleuritide extenuatorijs cibus opus
 est. Chōdrus quoq; seu alica, ex aqua mulsā ijs nō parū con-
 uenit. Potus sit exiguus, siquidem humiditas pulmoni nocet. Humiditas
 Posūt roboris tuēdi gratia, potissimū ubi suffocatio urget, pulmoni nō
 uti mulsā per se, et cū nucleis pineis: aut mulsā in qua deco- xia
 ctum sit hyssopus, aut iris sicca aquæ mulsæ inspergēda. In
 uniuersum autē uictus ratio eorū qui peripneumonia labo-
 rant,

Curatio
peripneu-
moniae ex
alijs mor-
bis.

Si statim ab
initio inua-
serit.

rant, præcipuè uerò qui à peripneumonia cōualefcunt, eadē
ferè fit quæ pleuriticorū. In curādī ratione sanguinis detra-
ctio uiādā est in ijs, qui ex alijs morbis in hoc malū incidūt,
maximè si diu in hoc statu fuerint, uel si per initia sanguinē
miserint. Alius clysteribus ducēda, si ægrè deijcit: aut cucur-
bitule, ubi nihil obstat, thoraci & lateribus admouēda sunt,
eāq; prægrādes & multæ, cute incisa & scarificata. Sin pe-
ripneumonia statim ab initio inuasit, sanguinē mittere, si
uires & alia permiserint, oportet. Incidēda uerò uena in cu-
bito interna: & ubi uires sustinuerint, ex utroq; brachio san-
guis detrahendus: primum quidē modicè & minimè usq; ad
animi defectiōnē, ut uidelicet asseruetur ad repetendā extra-
ctiōnem. Si uerò quid sanguinis missiōnē prohibuerit, cucur-
bitulas certè uniuerso thoraci lateribusq; affigere oportet:
ijsq; tantum sanguinis eliciendū, quantū uires patiūtur. Aut
acri clystere aluum eluere cōuenit, ex decocto nimirū hyssop-
pi, iridis, rutæ, adiecta colocynthidis medulla, sale fossili, et
alijs quæ ad eiusmodi clysteres sunt necessaria, quæ faciliē stu-
diosi ex libris nostris de cōpositione medicamentorum inscri-
ptis cognoscent. Posthæc curandū, ut per crebrā spūitionē
& excreationē, quæ certè sit celerrima & facillima, thorax
atq; pulmo expurgetur. In quem sanè usum ea quæ superiori
capite de pleuritide à nobis cōmemorata sunt ecligmata, un-
guenta, & emplastra usurpanda erunt. Quæ in eo tantū di-
uersa à prioribus sint, quod quæ nūc sunt adhibenda, omnia
ualentiora esse, maioriq; extenuandi facultate prædita con-
ueniat. Dandum igitur ecligma è scylla, è pulmone uulpis, ra-
dicis iridis ac helenij decoctum. Ceratum autem conficiendū
ex oleo rutaceo, nardinoq; adiectis medulla ceruina, iride,
hyssopo, marrubio, tenuissimè tritis, & terebinthina resina
exceptis, totiūq; thoraci & lateribus imponendum.

Ecligma-
ta.
Ceratum.

De sanguinis reiectione. Cap. X.

Aιμόνησις, uel certe rectius αἱμόνησις ἢ αἱμάσις αἱμόνησις
 ὡς αἱμόνησις, nihil aliud Latinis significat, nisi sanguinis
 reiectionē, aut cruentam spuitionem. Hæc nonnunquā acci- ^{Causæ}
 dit à causa externa & manifesta, nempe delapsu ex alto, pla- ^{externæ,}
 ga extrinsecus illata, percussione uehementi, saltu, aut si gra-
 uius aliquod corpus thoraci inciderit, clamore denique ma-
 gno, aut frigore immodico. Nam frigus uenas rumpere, Hip- ^{6 Epid.}
 pocrates etiam testatur. Calor quoq; sanguinis reiectionem ^{Par. 3}
 efficere potest, iuxta id Hippocratis dictum: Calidum ubi ^{Aph. 10.}
 quis sæpius utatur, profluuia sanguinis affert. Nonnunquam ²²
 ex causa interna & occulta, ueluti plenitudine, sanguine ui- ^{Causæ in-}
 tioso & uenas erodente, atque oris uenarum apertione. Ve- ^{5. Aph. 16.}
 narum autem ora aperiuntur propter uasis imbecillitatem,
 sanguinisq; qui ad os eius impetu ruit copiam: ad hæc acré
 quempiam, quæ illi extrinsecus incidat, qualitatem. Ipsa ue-
 rò uasorum erosio ex acribus contingit humoribus, siue à
 capite in pulmonem delabentibus, siue in ipso pulmone ge-
 neratis. Porro sanguis qui reijcitur, modo ex thorace ac pul- ^{Sanguis ex}
 mone, aut aspera arteria uenit, modo ex alijs locis oris, aut ^{quibus par-}
 gingiuarum, aut faucium, aut columellæ, aut uentriculo, ad ^{tibus reij-}
 quem ex uenis & partibus adiacentibus, iecore nimirum & ^{ciatur.}
 liene, sanguis delabitur. Causæ externæ è sermonibus ægri ^{Notæ,}
 aut assidentium cognoscuntur. Internæ uerò per indicia eius-
 modi. Si enim ob plenitudinem sanguinis reiectio accadat, ^{Plenitudi-}
 tum confertim sanguis reijcitur, & post uacuationem me- ^{nis.}
 lius leuiusq; agunt. At si propter oris uenarum apertio- ^{Apertio-}
 nem, tum calidi affectus præcesserunt: ueluti si calidis bal- ^{nis oris ve-}
 neis plurimis usus sit æger, habitaueritq; in calida regio- ^{narum.}
 ne, consimili existente maximè anni tempore, cibus quoque

Et potionibus calidis usus sit. Etenim multitudo sanguinis calida existens, uenarū pulmōni incumbentiū ora aperit & dilatat, atq; hoc modo coaceruata effusio contingit. Si uerò **Erosionis venarum.** ex uenarū erosione cruentum editur sputum, non cōfertim, sed paulatim sanguis cum tussi expuitur, & semper peius habēt. Possibile est etiā propter erosionē uehementē, cōfertā sanguinis eductionē cum tussi fieri. Quod sic deprehendes: si enim præcedenti tēpore per modica interualla sigillatim, & cum tussi expuerit quis sanguinē, & sequentibus diebus neq; casus, neq; alia externa uiolenta causa acciderit, & tamē copiosa sanguinis eruptio prodierit, magnam erosionē factam esse cui dētissimum est. Porro si sanguis qui educitur spumose sit & subalbidus, atq; ex interuallo prodierit cum tussi, absq; tamen dolore, firmissimum signum eductionis ex pulmone est. Si uerò pituitosa cum leuiore tussi aut excreatione reijciantur, ex aspera arteria prodijisse scito. Si ater sanguis, & in grumum concretus, cum tussi etiam & dolore partis affectæ reijcitur, ex thorace eductū esse mōstrat, per pulmōnem aut asperam arteriā facta translatione. Si uerò ex locis qui circa fauces sunt per palatū sanguis feratur, cū excreatione excernitur. Sin ex aliquo loco oris aut gingiuarū, simpliciter expuitur. Accidit autem nonnunquam per palatum sanguinem educi, propter hirudinē deuorata, & alicui in didem particula adhærescentē: id quod localis dolor qui cōcomitatur patientē particulā, & sanguis ipse qui tenuis est & serosus, ostendent. Porro si à capite sanguis defertur, titillatio palati aderit, & frequēs excreatio, ac tussis nonnunquam, sanguine nimirū ad guttur delapso, iterumq; sursum elato. Ad tussim itaq; irritantur, & tamen non ualde tussiuunt. Habet & suam figurā sanguis à capite delapsus. Est enim nō adeo paucus, colore niger, leuis, cum pure aut pituita mixtus,

xtus, & cum excreatione statim se in linguam infert rotundus, facileq; per sputū reijcitur. Præterea magna ex parte capitis dolor, aut grauitas præcedit. Si ex stomacho eductio fiet, nō magna sanguinis eruptio cōtinget: graciles enim stomachi uenæ existūt. Si uerò ex iecore ac liene sanguis in uentrem deferatur, aderit in dextro aut sinistro latere tumor. Quod ad uictus rationē attinet, utendū cibis qui moderatam quandā adstrictionē obtineāt, ut sunt oryza, alica, alijsq; similes frumētacei cibi, quibus succus mali granati, aut pyrorū adiectus sit. Ex carnibus conuenient columbæ syluestres, turdi, perdices, si cum omphacio seu succo uuæ acerbæ, & rhoë obsoniorū coquantur. Utendum quoq; cotoneis, pyris, pomis adstringentibus, moris rubi, & alijs suprà in cap. De sanguinis nariū profluuio memoratis. Bibedū uinū crassum, rubeū, aut p ea aqua, in qua chalybs imitus extinctus est. Cauendum à clamore, frequēti loquutione, omni corporis motu, & iracūdia. Curādī ratio pro causarū diuersitate uariatur. Si enim à capite fertur sanguis, isq; exiguus, simplicior & exigua sufficit curatio. Adstringētia enim per collutiones palato adhibita frigida, curationē perficiēt. Hæc autē ex capite de columellæ inflammatione petēda erunt. A calidis autē & rarefaciētibus collutionibus abstinendū, quod ab ijs plus sanguinis erumpat. Quod si multū à capite defluerit, euacuatione opus erit. Quare citius per nares, aut per uenæ aliquius incisionē euacuare oportet, ne per negligentā cōsuetudo fiat sanguini in hos locos delabendi. Qui ob destillationem sanguinē expuūt, ijs protinus in principio uenam incidere oportet, nisi uehementer acris humor destillauerit, ac pro uiriū modo sanguinē detrahē. Dein acri simul clystere adhibito, & euacuata aluo ac frictis quàm plurimum manibus, brachijsq; & cruribus per medicamentū calefactorium

Ex stomacho.

Si sanguis ex iecore ac liene in uentriculū feratur.

Victus ratio.

Curatio.

Sanguinis à capite destillantis.

Curatio eorum qui ob destillationem sanguinē expuūt.

ac extenuatorium extremæ eorum partes deligentur. Postea si malū diutius durauerit, raso capiti medicamentū, cui exicādi & discutiendi facultas inest, quale est quod ex fimo syluestrium columbarū constat, imponendū, & post triū horarum intervallum in balneum deducito, sic ut caput nulla pinguedine inungatur. Postea uerò mediocriter cōtectos sorbitionibus austeris alito, deinde dormituris theriaces antidotū exhibeto. Sequēti die omnibus corporis partibus, capite tantum excepto, perfrictis, in quiete adseruato, rursusq; ad uesperā theriacen exhibeto. Quod si ex ijs destillatio nō sistatur, tertia die mane mel parum coctum præbeto, quiescereq; finito, ac totum corpus defricato. Quarto die post acceptā theriacen, rursus plurimū mellis præbeto, capitiq; medicamentum ex fimo columbino imposito. Quod si malū diutius durauerit, cucurbitula occipitio affigēda est. Postremum ea quæ humores qui in pulmonem defluerunt, expurgare ualent, propinato. At si acris admodum fuerit humor, qui destillat ex capite, sanguinis detractio cauēri debet, ac purgatione potius utēdū, alimētisq; & præsijs ijs, quæ infrā dicemus, & suprā ubi de destillatione egimus, cōprehensa sunt, utendum. Qui ex pulmone sanguinē reijciūt, ruptis scilicet in eo uenis, aut earundē patefactis oris, ijs præcipiendū imprimis, ne respirent ualde, sonūq; edant, & ut parū loquātur, & ferē in totū sileant. Decumbāt in locis aēri expositis, lectoq; immobili, ac figura sublimi. His etiam statim uenam incidere oportet in cubito internam, ac sanguinis detractiōe bis aut ter reiterare paulatim, reuellēdi gratia. Nō enim euacuatiōe copiosa indigent tales nimirū à malo ipso euacuati. In hunc usum, hoc est, ut ad contrarium auersio fiat, frictionibus extremitatum, & earundem cum latis linteolis constrictione & ligatione utendum. His sic peractis, primum quidem pos-

scam

Theriace

Cucurbitula

Purgatio

Curatio eorum qui ex pulmone sanguinem reijciunt.

Venæ sectio.

Auersio.

scam dilutam & tepidam bibendam exhibere conuenit, ut si quis sanguinis grumus in uiscere hæreat, inde dissolutus eijciatur: neq; quicquam obstat bis & ter in tribus horis hanc potionē iterare. Post hæc medicamēta adstringētia, & meatus obstruendi uim habentia (emplastica uocāt) intra & extra corpus adhibēda. Per os quidē adsumpta proficiūt portulaca comesta, quamquam succus eius bibitus efficacior sit: succus polygoni, uux acerbæ, decoctum rhois, gallæ, calyculorum glandium, radices rubi, balaustiorū, seminis oxylapathi, radices equiseti, & aliorū quæ in capite de sanguinis ex naribus profluuiū cōprehensa sunt. Præstantiora prædictis sunt terra lemnia, & lapis hæmatites in tenuissimū pollinē detritus, & cum succo mali punici, uel polygoni sumptus. Pondus autē lapidis hæmatitis erit scrupulus unus. Inter cōposita usus esse poterit huius ecligmatos, quod habet: Sacchari rosacei ueteris, succi medicati è ribes, utriusq; ʒ. i. diatragacanthes, diacotoneon simplicis utriusq; ʒ. f. pulueris coralliorū, lapidis hæmatitis, terræ lemnie, singulorū ʒ. i. boli armenie ʒ. i. sanguinis draconis ʒ. f. balaustiorum ʒ. i. thuris, radices symphyti maioris, utriusque ʒ. i. f. serapij myrtini, quantū ad excipiedū satis erit, fiat ecligma. Extrinsecus thorax ex uino adstringēte, oleisq; rosaceo cotoneorū, aut myrtino irrigādus. Si uerò multa sanguinis eruptio fiat, potissimum æstate, ac citra tußim eius reiectiones contingāt, neq; æger debilis sit, sed robustus & carnosus, acetum pro uino admouendū est spongijs exceptum. Proderit iam dictis oleis adijcere bolum armeniam, & terram lemniam, corallia, & similia, atq; cum cera componere unguentum, quale infra libro 3. cap. de appetitu canino describemus. Cataplasma quoque ex palmulis, acatia, symphyti radice, cortice mali græcati, & lentium farina paratum, admouendum. Nec mi-

Adstringētia.

Portulaca.

Ecligma.

Vnguentū.

Cataplasma.

Ceratuma.

nus confert quod ex carnibus malorum punicorum, thure, corallijs rubeis, balaustijs, bolo armenia, terra lenia, & eiusmodi cōponitur cceratum. Maximū enim hoc est, & cui animū diligenter attendere oportet, ut mox facta uasorū ruptura, & dum adhuc cruentum est uulnus concreascit, priusquam scilicet inflammatio apprehendat. Nam si inflāmatio prauenerit, parū spei est ad huiusmodi uulneris congelutinationē, quippe quæ se in multos dies extēdit. Eluere enim oportet tum pus, tum serosum sanguinē ipsius ulceris, posteaquā inflammatio fuerit soluta. Reliquam autē curationē, quemadmodum in tabidis, fieri oportet. Hic tamē monendus mihi lector erit, ne extrinsecus profluente particula admoueatur tum adstringētia, tum citra adstrictionem frigida, nisi postquam in alia prius auersio facta fuerit. alijs enim sanguinem intrō compellunt, & uenas quæ in alto sunt implent. Quare prius semper ad contraria reuellendum, ac subinde adstringentia extrinsecus imponenda. Qui ab erosione sanguinem expuunt, ijs primū in quæ acres humores in pulmonē destilantes purgare possunt medicamēta propināda, ueluti antea quoq; & in capite de destillatione dictum est. Deinceps ea quæ alterare & incrassare acres tenuesq; humores, atque adeo sistere destillationem ualēt, ut est serapium uiolaceum, rosaceū, myrtinū, hydromalon, miuā cotoneorū uocāt, et ijs similia. In eum usum interdum serapium ē papauere, & alia somnifera & stuporem quasi inducētia adhibentur. Destillatione desinēte, erose partes cibis boni succi, & medicamentis carnem generantibus reficiantur. Porro qui uomunt sanguinē, ea uictus & curandi ratione quæ antea cōmemorata est utantur. Hoc est, si uenā in cubito inciderint, si ex iecore: si ex liene in uentrem feratur sanguis, si eam quæ inter paruum & annularē digitū in sinistra manu est: & cibos & potus

Curatio eorū qui ab erosione sanguinē expuunt.

Curatio eorū qui uomunt sanguinem.

tus adstringentes sumpserint, soli hac cura adhibita, ne crebro cibum aut potū sumant. Quippe facile curantur, si auxilia quæ bibuntur, particulis ipsis sanguinē fundētibus plane applicētur. Atqui sanguine in uentriculo instar grumi cōcreto, coagulū potandū est, maximē leporinū, uel tymbra seu satureia cū aceto, uel ex aloë sic affecti uacuari debent. Qui per palatum sanguinem excreant, gargarizabūt ex adstringentibus, fronti; & capiti admouebuntur ea, quæ sanguinē ex naribus fundētibus accōmodantur. Porro postquā omnia, ut postulat ratio peracta fuerint, & sanguinis fluor substitit, uires ipsis reficiendæ sunt, roburq; adhibendū. In primis uerò cauendus frequens usus balnei, uini potio, ira, & uenus.

Curatio eorū qui per palatū sanguinē excreant.

De empyemate. Cap. XI.

EΜΡΥΜΑ Græcis purulentam excreationē significat, Latini suppurationē uocāt. Hinc Εμπύρις καὶ Εμπύρις hoc est suppurati & purulenti, qui hoc malo laborant, & quibus in thorace pus cōtinetur, appellātur. Fit, quādo abscessus in membrana intrinsecus succingēte costas, aut alia qua alia thoracis mēbrana factus, acruatim rumpitur, & in uacūū thoracis locū, qui est inter pulmonem & succingentē costas mēbranā effunditur. Accidit interdum propter sanguinis eruptionē, ulcere ad cicatricem non perducto. Interim etiā ppter cōfluxū ex capite, et alijs superioribus partibus illuc manantē. Quod in angina sæpe contingere solet, iuxta hoc Hippocraticū: Quicumq; ab angina liberātur, ijs ad pulmonē uertitur, & in septem diebus pereunt: si uerò has effugerint, suppurantur. Suppuratos autem hoc pacto cognosces. Gravitas in profundo thoracis adest, tussis ualida siccaq; cum dolore, aliquando etiam cum humiditate, ob quam releuari quoque uidentur. Febres per initia ipsis ac-

Empyema.
Suppuratio.
Empyici.
Purulenti.
Causæ.

5. Aph. 10.

Signa.

cidunt languide, inordinatæ, & ad iudicandū difficiles. Postquam autē ruptura abscessus iam appetit, uehementius cum quodā horrore febricitant, & in sermone cōturbātur, offēsi in spiratione. Rupto abscessu aliquid in profundo thorace transfluere apparet, iuxta multiplices reclamationis permutationes, & maximē quū ab uno latere in alterū decumbunt, tūc sanē multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdā sonitus sæpē sensibilibiter in reclamationibus ipsorum auditur. Pus etiā educitur nūc purū, nunc feculentū. Erumpunt autē suppurationes aliquæ quidē sursum uersus, in uacuum uidelicet thoracis locū: & hæ periculosiores existunt. Aliquæ uerò deorsum in aluum, & intestina, ac uesicā trāsfunduntur, per uasa quædā transmissione ad eas partes facta. Quæ qualia sint, Galenus lib. 6. de patientib. locis, capite 4. ostendit. Semper autem hectica febris laborant, quoad sursum omnia fuerint educa. Qui suppuratione laborāt, aerē inhabitēt siccū. Cibis utantur boni succi, & cōcoctu facilibus iure gallorū, carnibus gallinæ, pullorū gallinaceorum, auium mōtanarū. Iure quoq; cicerū cum herbis, hyssopo, & oreoselino. Potus sit aqua mulsa, ac uinū albū & tenue. Porro nisi in ijs qui suppuratione laborāt summa diligētia adhibeatur, protinus puris collectio tabē accersit, pulmone ulcerationē cōtrahente. Primū itaq; suppurationis concoctio adiuuanda fomentis per spongiās, cataplasmas & emplastris ex hordei, sænogræci, & seminis lini farinis, caricis, columbarū fimo, alihea, & resina modica paratis. Cerata etiā ex butyro, iride, baccis lauri & ruta composita, & alia quæ collectionem maturare & discutere possunt, qualia multa in capite de asthma dicta sunt, imponenda. Quod si malum non discutitur, quæ abscessum rumpunt admouenda. Rupturam autē abscessus, promouet in latus sanum decubitus, sal-

forum

Victus.

Curatio.

Rūpentia
abscessum,

forum esus, & catapotia illa dormituro data, quæ habet: *Pu* Catapotia
 lueris hieræ picæ Galeni 31. pulpæ colocynthidis 21. cum
 succo absinthij quod satis est ad excipiendū, formentur pi-
 lule, quarū una aut altera teneatur in ore. Hac enim ratione
 accidit ut æger crebrò expuere conetur, atq; adeò nimium
 expuendo abscessus rumpitur. Ruptione facta, diligēter erit
 animaduertēdū, quò pus prorepat, adiuuare enim eius excre-
 tionē oportet. Si enim ad aluū proreptet, magis emollientia
 sint quæ offerūtur: si uerò ad uesticā serpat, ea quæ urinā ciēt
 magis adhibenda. Si uerò per tuſsim puris expurgatio fiat,
 nihil cōuenientius aut familiarius exhiberi potest, quàm pti
 sana optimo melle permixta. Proderunt etiam abstergentia,
 quæ partim in capite de pleuritide dicta sunt, partim etiam
 statim in capite de tabe dicentur. Ceterum quæ urinas cient,
 cibus commodè admiscantur, undecunq; tandem puris excre-
 tio cōtingat. Ad puris uerò expurgationē mirificè utilis est
 aqua mulsa cum iride, & plurima glycyrrhiza decocta,
 Radicis etiam dulcis succus commanducatus prodest. Co-
 nuenit deniq; decoctum hyssopi, iridis, marrubij, & similiū,
 quæ ex capite de asthma petenda ueniunt. Reliqua quæ ad
 curationem suppurationis necessaria esse uidentur, in sequen-
 ti capite commemorabimus.

Pus expur-
gantia,

Detabe. Caput XII.

Φθίσις Græcè, tabes aut Latine, propriè est exulcera-
 tio pulmonis ad sanguinis sputa cōsequēs. Fit magna
 ex parte, ob acris & erodentis humoris ex capite in pulmo-
 nem defluxum. Interdum etiā, quum sanguinis aut puris eru-
 ptio in suppurationis, pleuriticis, & peripneumonicis cohibe-
 tur. Qui hoc malo laborāt, agnoscuntur totius corporis & Signa,
 carniū extenuatione. Nares etiā ijs acutæ, collapsa tēpora,
 oculi

φθίσις.
Tabes.
Clyster.

Tempus oculi concaui, scapuleq; inftar alarū auium prominēt, hinc Hippocrati alijsq; Græcis τὸ πυλὸν εἶς appellatur. Præterea tuſiunt, ac febre hectica febrūt, difficulter ſpirāt, genæ liueſcunt, ungues curuātur, pallidiq; apparēt. Malo uincente uenter turbatur, ſitis ipſos magis conficit, capilli deſluunt: & id quod per ſputū reiſcitur, uehemēter fœdi odoris eſt. Quæ ſingula Hippocrates ijs uerbis innuere uoluit.

3. Aph. 14. A tabe, inquit, habito profluuiū alui ſuperueniēs letale. Et

“ iterum: Quibuſcunq; tabe laborantibus capilli à capite deſ-

“ fluunt, ijs alui profluuiio ſuperueniēte moriuntur. Et ruruſus:

5. Aph. 12.

5. Aph. 11.

Qui tabe moleſtatur, ſi ſputū quod extuſiūt carbombus in-

“ iectum graue olet, & capilli à capite deſluunt, letale. Porro

Curatio

difficilis

quare.

ulcera pulmonis difficillimè curantur, propterea quòd ci- tra tuſim nō repurgantur. Tuſientibus autem ulcus dirum- pitur, atq; malū quaſi quodā circuitu reuertitur. Pulmo etiā inter uiſcera propter reſpirationē in perpetuo eſt motu, & tuſiēdo quoq; lincinatur. Vlcerā uerò quæ ſananda ſunt, quietē utiq; requirūt. Medicamentorū præterea uires ad ul- cus, priuſquā in uentriculo & iecore permutentur, perueni- re nō poſſunt. Vt cūq; autē propter cauſas nunc cōmemora- tas difficilis ſit curatio, tamen nihilominus conandū, ut ulce-

Vitus. ratio illa curetur. Initio itaq; tabidis conueniens uictus ratio præſcribenda, in eū ſanè modum. Aërem ſiccū, in calore ue- rò & frigore temperatū, inhabitent. Cibus eorum ſit ptifa- na hordei, lac amygdalarū, oua ſorbilia, carnes auium mon- tanarum, perdicū, phaſianorū, merularū turdorum, gallina- rum, caporū, uitulorū, hœdiq; lactantis. Piſces deniq; ſqua- mati, ſaxatiles, potiſſimū uerò cancri fluuiatiles. Cæterū

Lac.

lac inter omnia cibaria tabidis optimū, primum quidē hu- manum, dein aſininum & caprinum: quod ex mammis, ſi fieri poteſt, ſugatur: aut ſtatim mulctum dum adhuc calet bibe

bibatur, quemadmodum copiosè libro 5. Ther. meth. Gale-
 nus docet. Cauendum tamen unicè, ne statim à lactis usu a- Statim à la-
cte cib⁹ nō
dādus.
 lium cibum (potissimum autem uinum) sumant: quod aliàs Impensè fe-
bricitanti-
bus lac nō
dandum.
 in uentriculo prorsus corrumpetur. Quòd si uerò impen-
 sè admodum febricitant, putrida maximè fetre, lactis usus
 haud conducet. Inter fructus profunt uuæ passæ, amygda-
 la dulcia, nuces pineæ, ficus, palmulæ, & pistacia. Exercitia
 & motus uehementes deuitent. Suauiter autem ante cibum
 deambulare, haud incommodabit. A cibo penitus quiescant.
 Somno utantur nocturno, & mediocri. Fugiant iram, tristi-
 tiam, uigilias immodicas, famem, sitim, coitum, laconicum,
 & quicquid corpus exinanire potest. Potus sit uinum aquo-
 sum & tenue: aut si uehemens est febris, cinnamomi deco-
 ctum. aut bibat potionem quæ à barbaris medicis hippo-
 cras nominatur. Cuius quidem compositionem in lib. 1. cap.
 De resolutione monstrauius. Quòd si malum à defluxu
 humoris acris ex capite oriatur, curandi ratio à destillatio- Curatio,
 nis amolitione inchoanda erit, quam quidem suprà peculia-
 ri capite docuimus. In præsentia igitur quomodo pulmonis
 exulceratio curanda sit, monstrabimus. In eius itaque cura- Absterge-
tia.
 tione in primis quæ abstergendi facultate prædita sunt, &
 quæ ut facillè pus sursum feratur, efficiunt, exhibenda erunt.
 In quem usum potissimum hydromeli conuenit, & decoctū
 hordei cum saccharo & melle. Item hyssopi, iridis, caricarū,
 adianti, & similiū. Serapiū de hyssopo, marrubio, & glycyrrhiza.
 Si accesserit febris, prædictis semina quatuor fri-
 gida commiscenda erunt. Extrinsecus uerò admouenda em-
 plustra & cataplasmata ex semine lini, scæno-græco, & alijs
 in capite De empyemate commemoratis. Ex capite quoq;
 De asthmate multa remedia ad præsentem usum cōducuntia
 petenda erunt. Absterfo & à pure purgato pulmone, ea quæ
ulcus

**Glutina-
tia.** **ulcus glutinare possunt, medicamenta sunt exhibenda. In hūc
usum ab omnibus ferè medicis cōmendatur saccharum rosa-
ceum: hoc enim nō solum glutinandi, uerum etiā abstergendi
facultatē obtinet. Abstergit autē magis quod recēs est, glu-
tinat uerò quod antiquius. Mirificè etiā cōfert bolus arme-
nia, sanguis draconis, succinū, corallia, semen portulacæ, &
similia, quibus abstergēdi & glutinādi facultas inest. Cōdu-
cunt quoq; ecligmata de pulmone uulpis, è pino, saccharum
symphyti maioris, et adianti. Ex ijs igitur tale parabitur me-
dicamentū, quod habet: Sacchari symphyti maioris & ada-
ianti, utriusq; ʒ ʒ. sacchari rosacei ʒ 1. ecligmatis è pulmone
uulpis ʒ 1. ecligmatis è pino ʒ 2. specierū diatragacāthes ʒ
3. boli armenie ʒ 1. f. serapij de papauere, quantū ad ea exci-
pienda satis est, formetur ecligma. Plurimū quoq; adiuuenti
asseret is puluis quotidie exhibitus, q accipit: Seminis papa-
ueris albi ʒ ʒ. gummi arabici uocati, amyli, tragacāthæ, sin-
gu. ʒ 1. f. seminū cucumeris, citrulli, cucurbitæ, melonum, co-
toneorum, singul. ʒ ʒ. eboris usti, succi glycyrrhyzæ, utri-
usq; ʒ 1. f. Penidiorū æquali omniū pondere, singatur puluis,
de quo mane dentur quotidie ʒ 2. cum serapio de papauere,
aut rosaceo. Eo præterea tēpore quo cicatrix obducitur, ex-
trinsecus thoraci oleum myrtinum, aut rosacū inungendū,
adiectis interdum rhoē obsoniorū, hypocisthide, malicorio,
acatia, galla, & similibus. Postremū corpus extenuatū iu-
sta & cōuenienti uictus ratione reficiendum omnibus ijs ci-
bis, qui boni succi sunt, ac facili cōcoquuntur, & plurimū
alunt. Quo tempore hoc quoq; medicamentum exhibendum
erit, quod habet: Pulpæ capi ʒ 1. testiculorum galli, nucum
pinearum, pistaciorum, amygdalarū dulcium, singul. ʒ ʒ. spe-
cierum antidoti de gemmis ʒ ʒ. specierum diarodon abbatis,
dianthōn, odorati rosacci, singul. ʒ 1. santalorum alborum,
cinna**

cinnamomi selecti, utriusq; 3 s. maceris ꝛ 1. sacchari candi-
dissimi lib. 1. diluti in liquoribus stillaticijs buglossi ꝛ ro-
sarum, singantur morsuli. De quibus quotidie unus sumatur.

De cordis palpitatione. Cap. XIII.

Π Αλμός κερδίας Græcis, cordis palpitatio ꝛ tre- Cordis pal-
pitatio,
mor dicitur, motus est cordis deprauatus, nimirum
diastole, seu dilatio eius præter naturā. Recentiores medici
perperā cardiacam nomināt. κερδιὰν enim ad stomachū, κερδία-
quem ueteres olim κερδίαν, ut multis in locis significauit κί.
Galenus, uocarunt, pertinet, eiusq; planē erosio seu morsus
existit, ut alibi quoq; copiosius monstrauimus. Fit ab om- Causæ,
ni eo quod præter naturam cor afficere potest, ut est quæuis
intemperies, aut humoris multitudo in ambiente cor mem-
brana contenta, aut tumor præter naturam, ꝛ alia quæ à
Galeno libro 5. De patientibus locis, cap. 1. recensentur. Dia-
gnoskitur facîle de sermonibus ægri, palpitationē hanc eui-
denter sentientis, ꝛ ex pulsu. In calida intemperie febris, ꝛ Signa,
pulsus uelox atq; magnus existit. In frigida cōtrā. Si humoris
copia in pericardio cōtenta palpitacionē accersierit, pulsus
est mollis et lāgidus. Victus ratio pro causarū malū efficien- Victus,
tiū diuersitate uariē instituitur. Siquidē in calida intemperie
aër esse debet mediocriter frigidus: in frigida uerò modicē
calidus. Quare ex capitibus quæ præmisimus, facîle consti-
tui à quouis leuiter admodum perito potest. In uniuersum Vitanda,
autem uitandum, quicquid spiritum uitalem resoluat ac con-
turbat, ut est nimius æstus, ira, fames, uigilia, coïtus, frigus
immodicū, cibi mali succi. Si multitudo humoris in ambiente
cor membrana contenta palpitacionem procreauerit, tota
dieta sit extenuatoria. Potus in calida intemperie sit uinum Curatio ca-
lidæ cordis
intemperiei.
aquosum ꝛ tenue, aut zuparium uiolaceum, uel rosaceum,
aut

aut buglosi decoctum. In frigida uinum meracius bibatur.

**Frigida me-
dicamenta.**

Qui ob calidam intemperiem cordis palpitatione corripiuntur, ijs per frigida medicamenta, quæ intemperiem calidam corrigere, & robur cordi adijcere possunt, succurrèdū. Taliæ uerò ex simplicibus sunt rosæ, uiolæ, flores nymphææ, santali, corallia, caphura, & ijs similia, de quibus in lib. nostris De cōpos. medic. etiā diximus. E cōpositis est diamargari, diarrhodon abbatis, saccharum, rosaceum, uiolaceum, buglossaceum, & earundem stirpium succi & scrapia. Ex iam dictis itaq; potiones, antidota, & morsuli pro cuiusq; arbitrio cōponi possunt. Extrinsecus admouenda unguenta, emplastra, maximè uerò epithemata uocata, sacculi, & alia quæcunq; calidæ cordis intemperiem alterare ualent. In pri-

Unguētū.

mis autē inter unguēta hoc cōuenit, quod habet: Oleorū rosacei, uiolacei, nymphææ, singul. 3. coralliorū rubeorū, santalorū purpureorū, rosarū purpurearū, singul. 3. caphuræ grana 2. ceræ albe quod satis est, fiat unguentū, quo cordis regio, & spina dorsi inungatur. Inter epithemata hoc potissimū cordi imponatur, quod accipit: Liquoris stillaticij rosarū, oxalidis, & buglosi, singul. 3. liquoris stillaticij mellissophylli 1. specierū antidoti cordialis uocati 3. santalorū purpureorū, coralliorū rubeorū, utriusq; 5. caphuræ grana 1. croci grana 4. cōmixtis omnibus fiat epithema.

Epithema.

Sacculus.

In genere sacculorū is potissimū cōpetet, qui habet: Florum buglosi, uiolarū, rosarū purpurearū, singul. iii. f. santalorū omnium, singul. 3. coralliorū rubeorū & alborū, singul. 3. unionum 3. Contusa in sericum demittatur, formeturq;

Curatio frigidæ cordis intemperiei.

sacculus. Cæterum qui frigida cordis intemperie laborant, ijs inter simplicia medicamēta prosunt ambar, moschus, crocus, lignū aloës, styrax, garyophylli, macer, zedoaria, melissophyllum, & eiusmodi. In genere compositorum, antidotus diambar,

diambar, dianthôn, aromatici rosacei, pleresarchigoû, & si-
 miles. Ex quibus sanè uaria remediôrũ genera parari, possũt,
 haud secus quàm in calida cordis fecimus intēperie. Siquidē Vnguentũ.
 unguenta in eum cōponentur modũ: Oleorũ liliacei, è spica,
 & de croco, singul. 3. 1. f. galliæ moschatæ, garyophylorum,
 utriusq; ð 1. ligni aloës ð f. maceris ð 1. croci gra. 3. cere
 quod satis est, fiat unguentũ. Epithematũ hæc forma erit: Li Epithema
 quorum stillaticiorũ melissophylli, maioranæ, buglosi, sin-
 gul. 4. specierũ antidoti diambar, diamoschi, utriusq; 3 f.
 maceris, ligni aloës, utriusq; ð 1. ambar granũ 1. uini optimi
 3 1. Cōmixtis singulis, formetur epithema. Sacculorum hæc Sacculus,
 esto forma: Florũ melissophylli, buglusi, utriusq; m. 1. f. cin-
 namo. selecti, garyophyllorũ, maceris, singul. 3 1. ligni aloës
 ð 1. corticũ mali citrij 3 1. f. croci. ð 1. ambar granũ 1. Cõtu-
 sis omnibus fiat è serico sacculus cordi imponēdus. Quod si
 ab humore aliquo in pericardio cõtēto palpitatio fiat, exte-
 nuāti uictus ratione, et uenæ sectiõe quæ in cubito fit, Gal. lib.
 5. De patiē. loc. cap. 1. teste, curatur. Siquidē is ibidē sic scriptũ
 relinqt: Palpitatio cordis plurib. integra ualētudine degētibus
 tum adolefcētibus, tũ adultis, subito sine alio manifesto sym-
 ptomate euenire uisa est, atq; omnes eos sanguinis detractio
 iuuat. Hoc enim pacto pleriq; perfectē ab hoc symptomate
 liberati sunt: præsertim qui utebātur & uictu, & medicamē-
 tis, quibus esset extenuādi facultas. Hæc ille. Seccāda uerò est
 uena incubito interior, aut media, atq; deinde unguenta, epi-
 themata, & sacculi, eiusq; generis alia medicamenta, quibus
 extenuandi & corroborandi cordis inest facultas, extrinse-
 cus & intra corpus adhibenda. Quorũ omnĩũ priuatim ex-
 empla proferre superuacaneũ putamus, quũ faciliè admodũ
 sit cuius ex iam dictis, & alibi commemoratis, componere
 omnis generis ad institutum suum facientia medicamenta.

De syncope. Cap. XIII.

Syncope.
Causæ.

Syncope, Gale. lib. 12. Ther. meth. autore, nihil aliud est nisi præceps uirium lapsus. Accidit ob plurimā sanguinis excretionē, immodicā uentris inanitionem, motum uehementem, dolorē ingentē, uigilias multas, sudores copiosos, omnesq; alias immoderatas euacuationes, timorem, terrorem, & alias huius generis animi perturbationes. Ob crudorum deniq; humorum redundantia, inflammationis magnitudinē, uitiosos & tenues humores, auræq; foetida inspirationem.

Notæ. Cognoscitur syncope ijs indicijis. Pulsus est rarus & obscurus, extremarum partiū frigiditas, sudor circa faciē, nitoris cutis quæ in ea existit ablatio, & totius corporis quasi resolutio. Ad hæc accedunt desperatio, animi angor, & corporis iactatio. Porro euenit interdū syncope cordis uitio, ubi scilicet ipsum uehementer intemperatum est: interdū etiā stomachi, in eo nimirum redundantibus & cōgestis aut crudis, aut acerbis & erodētibus humoribus. Eius generis syncope, stomachica nominatur. Qui propter humorū crudorū in ore uentriculi copiam syncopē incidunt, his hypochondria inflata sunt, & totū corpus ampliore mole quā pro naturæ modo cernitur, tum eiusdē color ijs ad albidius, quā pro naturali habitu sit, est mutatus: & in summa corpus aqua inter cutē laborātibus simile. Nonnullis etiā ad nigrius aut liuidius, quos quidē plumbei palloris appellamus, accedit. Pulsus tamē arteriæ omnibus minores sunt, præterea obscuri & inæquales. Qui uerò propter acriū humorū redundantia syncope corripiuntur, ij assiduas in ore uentriculi uellicatioēs ac mordicationes sentiūt. Qui ob tenues succos, q̄ ocyssimē exhalāt, syncope corripiuntur, in ijs mortifera illa species in facie celeriter apparet, nasus acutus, oculi caui, et alia quæ deinceps p Hippocrate sunt adscripta. Reliquæ syncopest causa ex adstantiū ser

Syncope
cordis.Syncope
stomachi.
ca.

sermonibus nullo negotio cognoscuntur. Curandirationem
 pro causarū diuersitate uariari, nemo est qui nesciat. Si enim
 propter sanguinis excretionē, aut aliā immodicā & repen-
 tinā euacuationē syncope inuadit, frigida faciem aspergere
 oportet, aut liquore rosarū stillaticio, qui in hoc casu miri-
 ficā quandā uim obtinet. Extremæ corporis partes uinculis
 uehementer sunt cōstringēdæ, ac linteis modicè asperis per-
 fricādæ. Crura qdē, si suprà eruptio fiat: manus uerò, si infrà.
 Cucurbitulæ quoq; leues pro partiū, è qbus euacuatio pro-
 cedit, aut sanguis erumpit, diuersitate affigēdæ. Os deniq; di-
 ducendum, cunei aut digitorū, aut alterius rei immiſsione: au-
 ditorius uerò meatus & nares cōprimēdæ, ut inspiratus aer
 interiora petēs, spiritū reficere ac excitare queat. Cōfestim
 etiā uarijs odoramētis animū reuocare cōuenit. Nihil enim
 est (Hippocrate in libello De alimētis teste) quod uires odo-
 re citius reuocet. Prodest itaq; pullos gallinaceos affos, ac
 permediū scissos atq; discerptos, naribus egrotantiū admo-
 uere. Itē rosas, uiolas, mala cotonea, citria, et eiusmodi. Postea
 iusculis, et alijs sorbitionibus cōcoctu facillimis alēdus ager.
 Vinum huic propinandū tenue & dilutum. Aer cubiculi sit
 frigidus, cubiculū uerò ipsum non ualde lucidū. Stragula eis
 incūbentia tollantur: operimēta uerò, quibus cōtegūtur, mol-
 lia sint. Pauimentū irroretur, ac folijs cōsternatur myrti, ui-
 tis, quercus, rubi, atq; ipsis etiā rosis. In immodico sudore ex-
 udantibus partibus oleū myrtinum, rosaceum, & cotoneorū
 illinendum: in primis uerò collum, thorax, loca sub alis, &
 inguina. In hūc usum etiā cōducit amyliū, & thuris pollinē
 cādido oui excepta, aliāq; adstringētia medicamēta illinere.
 Odoramenta quoq; tū uaria offerēda, nimirū rosæ, santala,
 cotonea poma, flores nymphææ, et caphura. Extremas uerò
 corporis partes tum nō oportet uincire. Si propter dolorē

Curatio.
 Eius quæ
 propter im-
 modicā in-
 anitionem
 accidit.
 Faciei as-
 persio.
 Ligaturæ

Cucurbitu-
 læ.
 Oris didu-
 ctio.

Odoramē-
 ta.

Victus.

Sudores
 imodicos
 colēcētia.

Odoramē-
 ta.

Curatio syncopes à dolore. Syncope fit, diligēter de causa inquire oportet. Si enim extrinseca fuerit, facile eius amotione dolor sedabitur, atq; syncope curabitur. Si uerò à nulla extrinseca occasione dolor cōcitatus fuerit, internā aliquā esse causam, quæ dolorē efficiat, existimare oportet. Si enim plenitudo distendēs, dolorem excitauerit, protinus si uires patiātur, sanguis mittendus est è uena, quæ parti dolēti uicina fuerit. Sin uires imbecilles sint, tū reuellendū duntaxat, aut sursum aut deorsum deriuandū, aut utrinq; aut frictionibus utendū. Vbi uerò à uitiosis humoribus dolor oritur, purgare magis oportet. Si utraq; cōeant, ambabus utendū uacuationibus, sanguine prius missō. Deinde si noxius humor in parte fixus & impactus est, curationem per discutientia medicamēta moliri oportet. Reliquorū dolorum curationes ex proprijs capitibus, præsertim uerò ex

Curatio si syncope fit ob animi affectus. De colli doloribus, petendæ. Qui ob mœrorē, timorem, & alias animi perturbationes syncope corripuntur, ij planè suorū cōtrariorū admotione curandi sunt. Nec in mœrentibus prætereūda sunt odorifera, et alia quæ intra corpus

Curatio syncopes ex redundantia crudorum humorum. sumpta spiritus recreare possūt. Qui ppter crudorū humorū copiam syncope laborāt, ij neq; sanguinis missionem, neq; purgationē sustinēt, utpote quos etiā sine ijs syncope subito adoriatur. Curare itaq; hos pfrictionem oportet. Initio itaq; mali statim incipiendū, ac crura quidē primū à superiore parte deorsum, linteis non admodum mollibus, sed modicè asperis perfricāda, deinde etiā tota brachia ab humeris pariter ad infimas partes. Vbi uerò iam artus omnes abundē incaluerint, & metus fuerit, ne quis ex nimia frictione lassitudinis sensus superueniat, oleo relaxāte utendū, quale est anethimū, & camamelinū. Cauendum autē quā maximè ab adstringēte. Quū iam artus plurimū perfricueris, postea oleū detergendū, inde ad spīnā dorsi transcendū, hæc q; tota perfricāda
simili

similiter, lnteo scilicet primum, mox oleo. Ab hac rursus ad crura & subinde ad brachia, tum rursus ad spinā remeandū, & ita toto die faciendū: idq; in splendido quodam minimeq; humente cubiculo, cuius aer temperatus sit. Præterea muls^a Mul^a in qua hyssopum coctum fuit, ijs est aptissima: cauendūq; ne uel cibum, uel sorbitionē, uel aquam exhibeas, uel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulsam tribus primis diebus duntaxat, alternatim fricando, ut solū illud tempus intersit quod somno datur, qui certē mediocris sit. Quod si pulsus ijs paruus admodū infirmusq; sit, aut etiā suprà hæc uehementer inæqualis, scire licet extremum periculū esse, facienda tamē nobis quæ retulimus, nec aliud quicquā moliendū. Sin pulsus robore mediocri sit ac magnitudine, præterea minime intercisus & cōpressus, cōsiderāda quæ ad aluum spectāt: ac si sua spontē cōmodē nō deiciat, audacter per inferius aliquid infundes. Accidit nāq; post aquā mulsam, ut quæ in primis uenis, quæ scilicet circa iecur & mesenterium sunt, colligi superuacua solent, hac cōmodē deiciantur. Quod si maior iusto recrementorū impetus ad aluum citetur, principio quidem percoquere mulsam amplius oportebit: ita enim minus aluū subducet, & magis nutrit. Posthæc si superuacua largius descendant, ne sic quidem sistenda aluus, sed exhibendus pro aqua mulsæ ptisanæ cremor est. Si uerò fluere pergant, alicæ sorbitione nutries, pulsuum interim ratione obseruata. Aliquādo enim subitò ad imbecillitatē, uel inæqualitatē, uel paruitatem mutantur. Quo sanè tēpore panē ex uino diluto exhibere, conueniet: idq; si nec uenter, nec iecur phlegmōne laboret: hac enim si infestētur, iam corpore crudis succis referto, planē desperata salus ægro est. Ergo in eiusmodi ægri casu, te ipsum à culpa immunē præstabis, si moriturum prædixeris, ac nullo generosiore medicamento usus fueris. At

qui si quādoq; craſſi abūdē humores deprehēdantur, oxyme-
li pro muſſa cōfeſtim exhibendū. Ergo ſi æſtas ſit, & æger
frigida potioni aſſuetus, frigidū huic oxymeli dabis. Sin hy-
ems ſit, omnibus calidū, tū ijs q̄ calida, tū ijs qui frigida in-
ſueuerūt, offeres: æquē ut ſi immodicus æſtatis tēpore æſtus
ſit, etiā qui calida aſſueti ſunt frigidū: utiq; ſi nullū ſit ijs ui-
ſcus ad iniuriā oportunū. Sanē ijs aduerſiſſima ſunt tum bal-
neum, tū aēr ambiēs, quoties uel nimīū calidus eſt, uel frigi-
dus. Itaq; ut lauandi iij non ſunt, ſic & reclinādi in domo ſunt:
æſtate quidē quæ frigeat, hyeme quæ caleat. Læduntur nāq;
non parum ab utroq; exceſſu: uidelicet in balneo, æſtate, &
omni caloris incremento crudis humoribus liquatis, ac per
omnes corporis partes fluentibus: ita ut metuendū ſit, ne ad
pulmones & cor ferātur: aliqñ etiā, ne cerebrū ſubeant: quū
longē præſtet, ut circa iecur & primas uenas ſubſiſtāt. In do-
mo autē immodicē frigida, & hyeme, & deniq; ambiēte fri-
gido ſucci, qui crudi ſunt & inepti ad cōcoquēdū manēt, &
iecinoris obſtructiones, ſi leues ſunt, augent: ſi nullæ ſunt, eas
craſſitudine ſua hærentes impactiq; creant. Si uerò ad eos,
quos ſyncope iam premit, ſis accitus, ubi uēter et iecur phle-
gmone uacent, panē exhibebis exiguū, hūcq; ex uino aliquo,
quod celerem in corpus diſtributionem adiuuet: ſtatimq; ad
frictiones uenies, quas etiam pro tradito iam modo admini-
ſtrabis. At ſi quidem æſtas ſit, aut regio naturaliter calēs &
æſtuans, aut ſtatus cœli uehementer calidus, aqua frigida ui-
num dilues: ſi nihil eiufmodi ſit, cum calida. Quæ tamen ſe-
cundo & tertio dabitur potio, omnino calidam exhibendam
curabis. Quippe ad uniuerſam eam curationē, cuius gratia
frictiones adhibemus, calor præſtat, utpote crudorum humo-
rum concoctionem adiuuans. At quibus ex flaua bile, quæ
os uentriculi infeſtet, ſyncope incidit, ijs frigida exhibenda
potio

Syncope
iam pre-
mentis cu-
ratio.

potio est. Vinum tamen quod & calidum natura sit, colore fuluum, substantiaq; tenue, ætate uetus, ut distributionem in corpus promoueat, omnibus quos syncope male habet, offerre cōueniet: distribui nāq; per corpus nutrimentū quod sumptum est, non in uentriculo manere uolumus. Qui tenuium humorum uitio syncope premūtur, eos paulatim & assidue uacuare oportet, propterea quod multā simul uacuationem ferre nō queāt. Hos etiā paulatim et assidue nutriemus. Summa cutis densanda, & aer cubiculi frigidus, & adstringens cōparādus, quēadmodum copiosè Galenus libro nono Ther. meth. cap. xiiij. docet. Vngendi præterea sunt adstrictorijs unguentis: tum cibi ijs dandi, qui non admodum promptè disfluant, non aqua mulsa, non ptissanæ cremor, sed panis, & sorbitio ex alica, & fructus austeri, qui non facillè corrumpantur, tum ipsi per se, tum uerò & cum pane, etiam alica quæ in aqua sit cocta. Dabis uerò aliquādo ijs & oua, præcipueq; eorū uitellos. Album enim eorū agrè concoquitur. Præterea gallinaceorum, qui lacte sint alti, testiculos. Itemq; suillū cerebrū, sed uel diligenter assum, uel in aqua, adiectis porro & anetho, legitimè elixum. Deniq; omni ratione agendum, ut & succorū materiā crassiorē reddas, & cutim deses, & exhalationem inhibeas. Vinum uerò ijs aquosum necessarium inter initia est, sumptum post cibū. Quod si ex sententia nobis omnia responderint, etiā carnei ijs aliquid nutrimenti post alia dabimus: potissimum post quartū diem, succis iam ad concoctionem uenientibus. Si ob inflammationis magnitudinem syncope accidat, artus fricandi & fouendi, manusq; ac pedes uinciendi, uigiliæ imperandæ, quia sanguis in somno (ut inquit Hippocrates,) ad interiora repit. A cibo & potu penitus arcēdi. Quicūq; propter uitiosos humores os uetriculi erodētes syncopē incidunt, ij curadi sunt uomitus

Syncopes
ex tenuib⁹
humorib⁹
curatio.
Vicitus,

Sycopes
ab inflam-
matione cu-
ratio,

”
Syncopes
curatio ob
erodentes
stomachū
humores,

irritatione: aut si id non successerit, alius mouendus, aliaq; facienda, quæ infra in capite, De dolore stomachi exponemus.

Si ob balneum syncope accidat. Qui in balneo animo linqui incipiunt, eos celeriter educere oportet, neq; multa aquæ infusione humectare. Qui autem iam inciderunt syncopē, celerrimè exportandi sunt, & reliquū qdē corpus leui quopiā uelamine cooperiendū. Facies uerò sponsia frigida imbuta made fiat, aut frigida, aut stillatio rosarū liquore aspergatur. Ericanda etiā facies, uenter & pedes. Os quoq; aperiendū pennarum aut digitorū immiſsione, omniq; modo conandū, quo humor ipsius syncopes autor euomatur, aqua tepida ori instillata. Qui perfectiori sunt ætate, ijs capilli euellēdi sunt. Et uociferatio quidē unius utilis est: multorum autē & simul edita, nocet. Vbi cōualuerint, fugere oportet tum in calidam, tum in frigidam aquam demissiones. Aut enim laxatis corporibus, calore discusso et resolutio percunt: aut à frigiditate adstringēte extinguuntur. Reliqua quæ hic desiderantur, facile quiuus ex alijs locis huius methodi petere poterit, & ex quinto Aëtij libro.

De lactis defectu. Cap. XV

Causæ.

Lactis defectus accidit propter siccā mammillarū, aut totius corporis intemperie: item ob boni sanguinis paucitatem, & quia infans imbecillis non probè ex māmīs sugit.

Signa.

Quantò enim plus sugēdo ex illis adimit, tantò etiā plus attrahitur. Notæ quibus causarū diuersitas deprehēditur, notiores serè sunt ex ijs quæ antea dicta sunt, quàm ut nūc repeti debeāt. Ne tamē imperiti aliquid desiderare queant, eas denuo narrare nō grauabimur. Sicca intemperies ex habitu totius corporis aut mammarū macilēto & arido, & alijs suprà commemoratis, dignoscitur. Sanguinis probi paucitas, è malo corporis habitu, eiusdēq; uitioso colore, & ex corporis

ris quæ præcesserūt euacuationibus immodicis, mensium nimium, alui, exercitijs ualidioribus, inedia, & id genus alijs.

Quod ad curandi rationē attinet, de lactis defectu qui ē sic = Curatio sic
cū intēpe-
rici.

ca intēperie nascitur, hoc in loco nihil dicemus, quod facile ex ijs quæ antea dicta sunt in alijs capitibus, & postea in ca- Sanguinis
paucioris.

capite De hectica cōmemorabuntur, curari possit. De eius itaq; qui fit ex sanguinis boni paucitate curatione, hic tantū agemus. In hoc igitur primū sanguis est cōtēplādus: sic mo-
nente Galeno lib. 5. Simpl. med. facul. cap. 20. aut enim minor

est quā cōuenit, aut deterior. Itaq; qui modicus est, uniuersam

uictus rationē exposcit, humectatē & calefacientē me-

diocriter. Quæcūq; enim plus q̄ expediat calefaciūt, quæq;

desiccāt aut refrigerāt, partim qualitatē ipsius sanguinis ui-

tiātia, partim ipsum modicū reddētia, lac prouenire probi-

bent. Dare igitur cōuenit panē purū, lac, carnē uitulinā, pul-

los gallinaceos, perdices, hœdos, oua sorbilia, pisces saxati-

les & squamatos, uuas passas, amygdalas dulces, lactucā, bu-

glossum, melissophyllum, cucurbitas, & eiusmodi. Bibēdum

uinum tenue & aquosum. Fugiendū immodicū exercitium,

ira, mœror, & omnia quæ sanguinē pauciorē efficere pos-

sunt. Si uerò deterior fuerit sanguis, si quidē biliosus sit, pri-

um purgationē desiderat biliosi humoris, mox uictū quem

modò diximus. Sin pituitosus, medicamēta requirit excalsa-

ciētia aut primo aut secūdo ordine: nō tamē desiccātia. Hæc

enim pituitosos humores excalfaciētes in sanguinē uertunt.

Verū inter ea potiora sunt, quæ nō tātū sunt medicamēta,

sed etiā nutrimentā: uelut cruca, sceniculū, anethū, apiū, sium,

eaq; uirentia priusquā siccētur. Nam sicca plus quā oportet & excalfaciunt & desiccāt. Quæ uerò desiccāt, humorē

sanguinis depascentia, crassiorē simulq; pauciorē efficiūt.

Et si natura quoq; fuerint calida, iusto etiam calidiorē: sin

frigida, frigidiorē. Debet enim esse modicē calidus, ac neutri-
quā crassus, ut ex eo lac generetur. Proinde quæ mediocri-
ter exalſaciunt, nullāq; insignē adiunctā obtinēt siccitatē,
lactis porcatricē facultatē habēt. Inter quæ sanē, præter ea
quæ paulō ante dicta sunt, est sesamū in uino decoctum. Item
butyrum recēs pondere unius unciz cum uino potū. Præter
ea amygdalæ dulces, pistacia, nuclei pincarū triti, & cū buty-
ro comesti. Laudatur etiā ferculum hoc in primis, quod ac-
cipit: Orizam decies ablutam, exiccata subinde, & in pul-
uerem redactā, coctāmq; in lacte optimo iuxta ignitos car-
bones. Intercoquendum autē sacchari candidissimi quod sa-
tis est adijcitur, formaturq; pulmentum. Fit præstantius, ubi
addūtur amygdalæ dulces, pistacia, nuces pineæ, farina hor-
dei, cicer, & eiusmodi. Annitendum tamen erit, ut etiam cum
leni thoracis frictione, alijsq; medicamentis calidis & tracto-
ria facultate præditis, ad mammas lac alliciatur.

De lactis redundantia. Cap. XVI.

Contingit interdum, ut ob lactis redundantia mamilla tumefacta repleantur, atq; eousq; extendantur, ut copia eius uix ferre queant. Quod sane malū Græci *μαργαρις* uocant. Fit à causa planè contraria, nimirū boni sanguinis copia. Visu & tactu deprehenditur malum. Huic quidem statim succurrendū, quòd aliis metuendū sit, ne mamma inflammatione corripiantur. Inter initia itaq; uena secūda plitis, aut media quæ in cubito est. Deinde utēdū ijs quæ leuiter reprimūt, ne scilicet ad pulmonē impetu quodā trudatur sanguis. In hunc quidē usum proderit spongiā mollem posca tepida imbutam madefactamq; & expressam imponere, & mammis fascijs circūligare. Vel palmulæ cum pane & posca trita adhibende. Vel ouum totū cū rosaceo imponendū.

Сод

Conuenit etiam apponere emplastrū ex oleo rosaceo, santalis, coriādro, psyllio, portulaca, farina fabacea, lentium, plantaginis succo & aceto in hunc modū cōpositum. Emplastrū
 Farinæ fabarum, lentium, utriusq; 3 1. seminis portulacæ 3 1. seminum lini & altheæ, utriusq; 3 2. f. plantaginis m. 1. seminis coriā dri 3 2. Bulliāt omnia in aqua, donec ad mellis crassitudinem redeant. postea adiectis olei rosacei 3 1. f. succi plātiginis 3 1. aceti 3 1. denuo ebulliāt, et additis duobus oui uitellis, fiat emplastrum. Aut fingatur ceratum hoc quidem modo: Ceratum
 oleorū rosacei & myrtini, utriusq; 3 1. f. farine fabaceæ, lentium, utriusq; 3 1. f. mentæ, rutæ, utriusq; 3 1. plantaginis 3 1. f. seminis coriā dri 3 1. Cum cera & resina laricea quod satis est, formetur ceratum māmīs adhibendū. Erysimon etiā, quod rapistrū hodie uulgus herbariorū uocat, mirificè prodest, cum aqua & melle illitum. Ricini insuper folia trita, & apium uirens illitū, non exiguā commoditatem ostendūt. Pyrites deniq; lapis tritus cum rosaceo & aceto impositus, mirificam uim in lactis redundantia declarat. Porro uniuer- Victus.
 sa uictus ratio talis sit, ut ex ea paucus procreetur sanguis. Quare inedia huic malo præ cæteris mirificè confert.

De lacte in grumos cōuerso. Cap. XVII.

CRumescit lac, & in casei formam transit nonnunquā, θρόμεω -
 & hoc malum Græci θρόμεωσι, quasi dicas Latine σις.
 grumescentiā, nominant. Fit ob lactis abundantia, quum ni- Causæ.
 mirum diutius in mammis coaceruatum detinetur, nec exu- Lactis a-
 gitur. Ab intēperie etiā calida, dum scilicet à nimio calore, bundantia.
 quod in lacte tenuium erat partiū digesto ac discusso, quod Intemp.
 reliquū est cōcrescit, & in grumos abit. Idem etiā à frigi- cal.
 ditate accidere solet, quæ ut alia liquida cōtrahere, ita quoq; Frigida.
 lac ipsum ut concreseat efficere potest. Interdum etiam lac Lactis cras-
sities,
 ipsum

- ipsum suapte natura satis crassum & lentum est, ob id facile
Signa. in grumos uertitur ac cōcrescit. Notis nullis ad malū digno-
 scendum opus est. Ex tactu nanq; atq; adeò ægri sermonibus
 et relatione, statim agnoscitur. **Viētus.** ratio in hoc malo pro-
 causarū diuersitate uariatur. In calida enim intemperie mā-
 marū, ad frigidū in frigida cōtrā, ad calidū declinet. Si pro-
 pter crassiciē lactis euenierit uitium hoc, extenuanti omnino
 uictus ratione utēdū erit. Quod ad curationē ipsam spectat,
Curatio. si lactis fuerit redundantia, nec adhuc in māmīs grumescat,
Si lac redū
det. ab adultis, in hocq; peritis mulieribus sensim leuiterq; exu-
 gendū erit. Mammæ aut extrinsecus apy uirentis, mēiæ, &
 fœnogræci succo illinantur, aliāq; quæ suprà in capite De
 redundantia lactis dicta sunt admoueātur. Leporis uerò coa-
 gulum ex aqua tritum si illinatur, ad omnes mammarum tu-
 mores, & præsertim è uitiosa earundem lactis copia eueniē-
 tes, conducit. Lentes insuper in muria elixatæ mirificè con-
 ferunt, si decocto quidem mammæ colluantur, lentes uerò cō-
 tuse illinantur. Althææ deniq; & fœnogræci decoctum, non
Si cal. sit
intemp. parum commoditatis adfert. Si quidē nimia mammarum ca-
 liditas ut lac grumescat in causa fuerit, tunc portulacæ suc-
 cus, & solani hortensis, illinendus erit. Item rosaceum cum
 aceto adhibendum. Alsine quoq; quam uulgus herbariorum
 morsum gallinæ appellat, illita mirā efficaciam ostendit. Be-
 ne facit etiam cimolia terra ex aceto, aut aqua & oleo ro-
 faceo illita. Præterea lentes in aceto elixatæ, & (ut paulò an-
Si frigida. te dictum est) adhibitæ. In frigida intēperie mammarum, de-
 cocto chamæmeli, fœniculi, anethi, seminis lini & fœnogræ-
 ci utendum, eoq; fouendæ mammæ. Oleis quoq; chamæmeli-
 no, anethino, liliaceo, & similibus inungendæ. Cauendum ta-
 men, ne papillam contingāt. Fel bubulū illitum confert. Me-
 dulla panis cum aceto illita prodest. Sed licebit adijcere mē-
 tam,

tam, aut apium, & fit medicamentum ualidius. Præter cate- Emplastrū
 ra uerò hoc potissimū ualet, quod habet. Mellis ℥ ʒ. styracis
 calamitæ 3. fellis bubuli 3 2. olei chamæmelini ℥ 1. myrrhæ,
 thuris, utriusq; ℥ 2. ʒ. Misceantur singula, & redigantur in
 formam emplastri, quod mammis imponatur.

De inflāmatione mammarū. Cap. XVIII.

Accidet interim, instar aliarum inflammationum, pro- Causæ.
 pter sanguinis copiosi & calidi ad mammas defluxū.
 Interim etiam ob lac casei modo concretum & coactum, ac
 subinde ad suppurationem tendens. Facile iam dictæ causæ Signa.
 discernūtur, quod scilicet prior inflāmatio ijs quæ neq; gra-
 uida, neq; puerperæ sunt accidat: altera uerò iam commemo-
 ratis duntaxat. In curandi ratione obseruādum, ut in prima Curatio in
 inflāmatione confestim sanguis mittatur ex interna cubiti flamma. ob
 uena, uel media eiusdem lateris, nisi mensium subesset reten- sanguis. co-
 tio: tunc enim cōsultius est, poplitis aut malleoli uenam in- pio. & cal.
 cidere. Post hæc ad reprimentia ueniendū medicamenta, quæ Venæ fe-
 nō oportet esse ualida, ne ad interiores corporis partes nobi tio.
 les humorū impetus trudatur: aut aliqua quæ discutere pos- Adstringē
 sunt, ijs miscenda. Quare ad eum maximè usum cōuenit ra- tia.
 faceū cum succo aut stillaticio liquore solani, aceto, & de-
 cocto chamæmeli, ut scilicet in ijs lintei madefacti & intin-
 cti, māmīs imponantur. Valet etiā emplastrū ex farina hor-
 deacea, semine lini, santalis, bolo armenia, adipe porcino, &
 rosaceo compositum. Quòd si medicus non admodum con- Discutien-
 ferre medicamenta reprimentia animaduuerit, ad ea quæ tia.
 discutiunt statim est progrediendum. Quapropter hoc Emplastrū
 emplastrum est adhibendum, quod accipit: Farinæ fabaceæ,
 fœnogræci, seminis lini, singul. ℥ ʒ. florum meliloti, & cha-
 mæmeli, utriusque 3 2. ʒ. medullæ panis triticei 3 ʒ. myrrhæ.
 Ebul

Ebulliant in aqua iustæ quantitatis, dum in mellis crassitudinem coquant. postea adiectis oleorum chamæmelini, & anethini, utriusq; 3 i. f. bulliant iterum, & addantur vitelli ouorum tres numero, croci 3 i. fingaturq; emplastrum. In hunc usum lini semē, uel fœnogræcum in oxymelite decoctū illini potest, & alia eiusmodi quibus discutiendi facultas inest, de quibus antea sæpè dictum est. Quod si uerò discutiendi spes omnis sublata fuerit, maturatione & suppuratione auxiliabimur, quæ perficitur hoc cataplasmate, quod accipit: Maluæ, altheæ, foliorū uiole nigræ, chamæmeli singul. m. i. f. radicis altheæ 3 i. Bulliāt in aqua, donec mollescant, dein cōtūdantur, & informetur cataplasma. Aut fingatur emplastrū ex semine lini & fœnogræci, caricis, radice altheæ, & liliorum candidorū, adiectis oleis chamæmelino & linaceo, adipebus porcina, gallinacea, & similibus. Suppuratione facta, ad ruptionem sectionem uē mame ueniendū. Hæc autē ferro, aut medicamentis perficitur. Medicamenta uerò, quæ suppuratos in māmīs humores emanare faciūt, sunt, finus columbinus, fœmētum cum puluere cantharidum, calx uiua cū fimo anserino. Si ferro uti magis placuerit, locus prope papillā lunari sectione accuratissimè incidendus erit, ut incisione abscessus quidē profunditas denudetur, sed papillā cōseruetur. Curatio reliqua talis sit, qualis aliorū ulcerū. Porro si propter lac coactam inflammatio accidit, tunc per initia utendū est spongia molli tepida posca imbuta, & expressa loco illigata. Item palmule cum pane ac posca trite imponende. Medulla quoq; panis, additis myrrha, croco, menta, & alijs quæ in cap. De redundantia lactis cōmemorata sunt, imponeda. His peractis, si inflāmatio perseuerauerit, ad alia remedia, quæ paulò suprā cōmemorauimus, progrediendū.

LEONHARTI

FVCHSII DE MEDEN

dis singularum partium corpo-
ris humani à summo ca-
pite ad imos vsque
pedes malis,
Liber ter-
tius.

De imbecillitate ventriculi. Caput I.



ENTRICVLI imbecillitas ex ^{Causæ.} Intemperie qualitatum esse & tricum ^{Intemperies.} citra humoris confluxum oboritur. Nam (ut testatur Galenus lib. tertio. De sympt. caus. cap. i.) Omnis uehemens intemperies vires deiecit. Fit ^{Humor.} etiam ex humore in ipso sinu & am-

plo uentriculi spacio contento, qui aut calefaciendi, aut refrigerandi, aut humectandi, aut siccandi, aut etiam horum aliqua per coniugationem efficiendi naturam obtinet: interim uero & in ipsas uentriculi tunicas immerso & infarto. Nudam qualitatem calidam testantur sitis uehementis, cibi fastidium, nidorosusque ructus. ^{Signa in temp. cal. & frigid.} Frigidam contraria indicant, modica nimirum sitis, immodica appetentia, acidusque ructus. Quid multa: si calida uel frigida intemperie uentriculus afficitur, assumptos cibos ad intemperie in naturam permutat, ut appareant cibi citra alicuius humoris complexum in nidorem aut acorem permutationem accepisse. Præterea frigidis medicamentis, cibisque & potibus

bus statim adiutum hominē uidebis, si calida intemperies extiterit. Si uerò frigida, calidis cibis & medicamentis uiuabitur, à frigidis uerò ledetur. In humida nulla uel exigua saltem sitis aegrū affligit, saluæ copia adest, & cibus gaudet humidioribus. In sicca, linguæ siccitas, corporis extenuatio, saluæ paucitas, sitisq; uehementissima. Porro copiam humorū uitosorum signa cōmunia uitosorum humorum. Flauæ bilis. Pituitæ. Atq; bilis. nausea, uomitus, grauitas uentriculi, & ructus potissimum à cibo ostendūt. Quòd si flaua bilis redundat, oris amaritudo, bilis uomitus, sitis, ructus nidorosi, & uentriculi morsus adæerunt. Sin pituita, nulla prorsus uentriculi erosio excitabitur, nisi salsa fuerit: acidi ructus, nulla sitis, tensio que uentriculi adsunt. Si uerò atra bilis abundet, tristitia metusq; , ructus & excreationes foetide, piscesq; olentes, somnus cū accessione imaginationū alienarum, contractioq; & dolor poplitū & surarum. Intemperies omnis per cōtraria corrigitur atq; emendatur. Calidam itaq; refrigerare oportet, frigidam uerò calefacere: siccam humectare, humidam siccare. Similiter uerò etiam compositas intemperaturas aut calefacere & siccare, aut humectare et calefacere, aut refrigerare et humectare, aut siccare & refrigerare oportet. Calida igitur intemperie affecti, refrigerante uictu curantur, præcipuè uerò si ex aceto frigida assumatur. Panis itaque posca sit imbutus. In carniū genere pullis gallinaceis, perdicibus, uitulinis carnibus, cum aceto aut omphacio decoctis, utendum. Inter olera lactuca & portulaca maximè conducunt. Poma item, & pyra acida. Bibēda aqua frigida, si afflucit aeger: sin minus, decoctū cinnamomi, aut uinum tenue & aquosum propinandum. Extrinsecus ea que medocriter adstringunt, & refrigerant medicamēta imponēda. Frigida intemperie uentriculi laborantes, contrarijs medicari oportet, anisi, ruta, oroselinūq; decocto. Cibi quibus utuntur, odoramentis, nēpe

cinna

cinnamomo, calamo odorato, garyophyllis, pipere & similibus cōdiantur. Danda quoque antidotus diatrionpipereōn nominata, diacalamminthes, & theriaca, forinsecus ea quæ calefacere possunt unguenta inungenda. in potu usus sit uini ueteris & subadstringētis. Humide intemperiei auxiliātur cibi, qui citra ualētē calefactionem refrigerationem ue siccant. Insuper consuetæ potionis paritas. Sicca instar hec̃tica, de qua in libro quarto dicemus, curabitur. Copiosissimè uerò Galenus eius, ut etiā reliquarū intēperantiarū uētriculi, curationē prosequitur, lib. 7. Ther. meth. unde ea quæ hic desiderantur petenda erūt. Ceterū si humor aliquis calefaciēdi uel refrigerandi uim obtinens uentriculi imbecillitatē effecerit, diligenter considerādū erit, an is humor in sinu seu amplitudine uentriculi innatet, an eiusdem tunicis impactus sit. Si in sinu cōtinetur, ac biliosus fuerit, per uomitū statim expurgandus erit. Facile uerò uomitū reddit aqua calida, uel mulsæ dilutissima bibita. Satius erit, ut ante hæc humectantia exhibeas, ueluti est ptisanæ cremor, aut oui lutea. Sin in uentriculi tunicas est receptus humor biliosus, hiera picra alius purgabitur, qua qdē (Galeno loco antea citato teste) nullū aliud medicamentū ad uitiosos humores qui in uentriculi tunicis detinentur præstantius inueniri potest. Humore uacuato, uictu utātur eodem, quo eos qui calida eiusdē intēperie correpti sunt uti debere, paulo antē diximus. Intra corpus assumenda sacchara, quibus refrigerādi & humectādi inest facultas, itē antidota ipsdē uiribus prædita. Extrinsecus uētriculo adhibeātur refrigerātia, & mediocriter adstringētia, ut est oleum rosaceū, cotoneorū, adiectis santalis, balaustijs, corallijs, & caphura. Infrigidatiū tamen mediocris semper sit usus, pro intēperiei cōtrarietate. Nā immodicus horum usus, non modo non iuuat, sed etiā sepe insanabilem morbū efficit: quod scilicet

Humidæ.

Siccæ.

Curatio imbecillitatis uentriculi ab humore,

Bilioso.

Pituitoso. cet ad concoctionē calore summē opus sit. Si uerò pituitosi; atq; adeò crassi & lenti humores amplitudini uentris innascent, oxymelite utendū est, in quo ex medicamētis quibus incidēdi & extenuādi facultas quædam inest. sint decocta (uerbi gratia) hyssopus, iridis radix, origanū, satureia, & marubiiū. Sin tunicis uentriculi immersi fuerint, tum primū exhibenda quæ lentā & crassam pituitā diffecent, postea uerò purgandū. Qualia autē medicamenta sint quæ iam dictā pituitā purgēt capite duodecimo primi libri diximus. Est uerò & ipsa hiera picra ad crassorū humorū purgationē nō inu-

Viſus. tilis. Viſtus quoq; ratione extenuāte tum utendū erit. Antidotis item calefaciētibus diatrion pipericon, diagalanges, diacinnamomi, diabar, zingibere cōdito, diacori, & similibus. Extrinsecus uentriculo adhibenda sunt olea calefacientia, quale est nardinū, è menta, absinthite, mastichinum, & alia consimili facultate prædita. In hunc usum etiam cōmendantur cerati, quæ uulgus medicorū hodie scuta stomachalia no-

Scutū sto-
machi.

minat. quale est hoc quod accipit: Cinnamomi selecti, garyophyllorū, piperis longi, singul. 3 i. galliæ moschate, maceris, utriusq; 3 f. calami odorati, thuris, utriusq; 3 i. f. ligni aloës 3 i. mente satiuæ 3 i. mastiches, ladani, utriusq; 3 i. f. oleorū mastichini & nardini, utriusq; 3 f. Cum cera & resina terbinthina quod satis est, in formetur ceratū, uentriculo imponendum, & obducatur serico purpureo. Aut utendū hoc medicamento, quod habet: Mastiches in puluerē redactæ 3 i. f. Quæ subinde spargitur in corio scuti formā obtinente, & affunditur ei oleum nardinum. Postea igni quoad liqueſcant singula, adhibentur, & inspergitur ijs cinnamomi selecti, nucis moschate, garyophyllorum in puluerem redactorum, singul. 3 i. & uentriculo admoventur. Quid multa? Hæc & alia uentriculum roborantia & calefacientia sunt adhibenda:

Corrobo-
rātia & ca-
lefacientia
uentricu-
lum,

benda: uerbi gratia menta, absinthiū, thus, mastiche, cinna-
momum, acorus uerus (galangā maiorem hodie uocat) zim-
giber, macer, lignum aloës, calamus odoratus, & id genus
alia libro primo, quē de cōpositione medicamē. scripsimus,
commemorata. E' quibus omnibus uaria remediorum genera
pro cuiusq; arbitrio componi possunt.

De nausea & vomitu. Cap. II.

Nausea, quæ facultatis expultricis uentriculi depraua- Causæ.
tus motus est, ex uitioso humore, tum calido, tum fri-
gido in uentriculo contento gignitur, qui aut in concauitate
ipsius innatat, aut in tunicis eius infarctus instar uisci adhæ-
ret, atq; ægrè auelli pōt: aut serosior existēs in ipsis uētriculi
tunicis, uelut aqua in spongia, immergitur. Atque eiusmodi
humores ex uentriculi intēperie tum calida, tum frigida nō-
nunquā nascuntur. Nonnunquā autem ex toto corpore, aut
alijs partibus prius malè affectis in ipsum uentriculū, ueluti
illarū excremēta, confluūt, utpote ex iecmore, aut liene, aut
capite, aut ex uniuerso corpore. Si ex intemperie nascuntur,
facile id ipsum ex notis capite præcedēti commemoratis, de- Signa.
prehendes. Vtrum uerò is humor in cauitate uentriculi in-
natet, aut tunicis eius infarctus sit, ita cognosces: Humorē Humoris
uitiosum innatantē in uentriculo, ac nauseam excitantē, ma- natantis in
gna ex parte uomitio sequitur, atque ipse cibos corrumpēs ventriculo
manifestē eiusmodi humore imbuit, & in suam naturā per-
mutat. Si uerò uentriculi tunicis humor tenax immersus sit, Immersi tu-
nauseam quidem efficit, sed tamen talem, quam inanes uo- nicis ven-
mendi irrationes comitentur, quæ lancinant tantum, & triculi,
nullum humorem educunt. Sin serosus fuerit, non solum ante Serosi
cibum, sed & post sumptum cibum uomitum inducit, idq; si
in uentriculi amplitudine innatat. Qui enim superficiē uen-

tris infarti adherent, ante cibum magis inanes uomitiones
 mouent. Quando uero aliæ partes, è quibus in uentriculū ex-
 crementa defluunt, prius malè afficiuntur, ipse æger primū
 affectuæ partis lesionem sentit. aut enim caloris sensus iuxta
 patientē partem ipsi accidit, aut frigoris, aut grauitatis, aut
 etiā tactui nostro dura succumbit. Si uero uniuersum corpus
 uitiosis humoribus plēnū fuerit, id ipsum ex colore, & pustu-
 larū eruptionibus circa cutē cognoscitur, atq; ex ipsa adeo
 urina. In curandiratione diligenter cōsiderandum erit, num
 uentriculi tantū pathos sit, aut totius corporis, aut alicuius
 alterius partis. Siquidē ex alia quadā parte, aut ex uniuerso
 corpore humores in uentriculum cōfluūt, priorē curā totius
 corporis, aut partis prius malè affectæ habere oportet: ita
 tamē ut neq; uentriculū ipsum negligamus. Nisi enim uniuersum
 corpus humoribus uitiosis prius probè expurgetur, ni-
 hil egerit quisquis humorē, qui se in locum aliquē receperit,
 expugnare conabitur. Sic quoq; is qui primum patientem
 particulā curat, uelut fontē omnium in uētriculum influxio-
 num excidit. Quæ uero ratione partes quæ excrementa uen-
 triculo demittunt sint curandæ, ex proprijs de ijs capitibus
 perdiscendū erit. Ceterū si in uentriculo nati fuerint humo-
 res, cōcitantes nausēā, cōsiderandum num tenues, biliosi &
 serosi sint, & in uentriculi sinu cōtineātur: tum enim tenuis-
 simus pitane succus dādus, aut aqua calida & ad uomitum
 cogēdus æger diguis, aut pennis in os immis̃is. Si autē intrin-
 secus circa superficiē uētriculi infarti fuerint, drachma una
 aloës in aqua diluta potui exhibenda. Si quidē calidorū qui
 in uētriculo sunt humorū aloë optimū est medicamētum, ita
 ut sæpenumero uentriculo malè habentes una die sanauerit.
 Post humores uacuatos, aliq; adhibita medicamēta leniētia
 seu tēperāciabilis acrimoniā, quæ præcedenti capite sunt cō-
 me

memorata, calida uentriculi intemperies (ut eodem in loco docuimus) curāda erit. Si autē pituitosi, aut uiscosi, et craſſi Pituitosi. humores ſint, qui amplitudini uentriculi innatent, curandi ſunt ad eum modū, qui in præcedēti capite eſt à nobis expoſitus. Deinde frigida uentriculi amouēda intemperies. Quòd De vomitu ad uomitum quidē attinet, initio ſciendum eum nō eſſe reprimendum, à quo æger melius ſeſe habet, iuxta hoc Hippocratis dictum: In uomitibus ſpontaneis ſi talia purgētur, qualia 1. Aph. 2. purgari oportet, cōfert, & leuiter ſerūt. Sin minus, contrā. 22 Non erit itaq; reprimēdus, qui decretorius fuerit, aut ubi ex uniuerſo corpore in uentriculum confluunt humores, aut in ipſo uentriculo propter intemperies naſcūtur. Quare tunc potius is expultricis facultatis motus adiuuandus erit, in calido quidē pathemate aqua calida cum oleo uiolaceo pota: in frigida uerò, oxymelite propinato, & alijs quæ antea ſunt à nobis commemorata. Quòd ſi uerò immodicus fuerit Immodici vomitus cu ratio. uomitus, atq; ægri planē uires iam deſicere cœperint, tū ſuppreſſioni eius ſtudendum erit. Quare principio decubitus ſurſum uergens adornetur, in conuenienti & malo contraria domo: quæ frigida quidem ſit. malo exiſtente calido: cōtrā uerò calida, ubi frigidum malum exiſtat. Extremae corporis partes fricētur, manibusq; calfactis palpentur, quin & uiolentius uinculis ſtringantur. Deinde pedes & manus in aquam ſolito calidiorem demittantur. Odoramenta uerò naribus admoueantur olfacienda boni odoris, uelut roſæ, mala cotonea, pulegium menta, fœniculum, ſpica nardi. Ventrículus extrinſecus oleis abſinthite & roſaceo illinatur. Cataplasmata è palmulis, malis cotoneis, abſinthio, item cerata ex ijs & ſimilibus, nempe menta, lolij farina, maſtiche, thure, parata, & uentriculo impoſita proſunt. Palmulas autem in uino ueteri maceratas optimè conterere oportet, deinde

maſtichen & thus unumquodq; per ſe optimè tritum adijcere, & rurfus ſimul terere. In hunc locum etiam reuocanda remedia, quæ partim in capite De cholera, partim etiam De dysſenteria dicemus. Porro malo diutius permanente, & cibis non retentis, cucurbita ad os uentriculi cum plurima flamma affigenda, donec locus rubefiat, atq; ipſa adhuc affixa cibis præbeat. adijcito,

Diuturni
vomitus cu
ratio,

De ſiti immenſa. Cap. III.

Cauſæ. **S**itis, Galeno lib. i. De ſimplic. medi. ſacul. capite 30. teſte, duplici ratione prouenire ſolet, partim humoris inopia, partim caloris copia. Caleſcit autem uenterculus multis & uarijs modis, propter ſcilicet calidam intemperiem nude qualitatis ſimplicem uel compoſitam, aut calidos & bilioſos humores in eo natos, aut ad eum cōſtuentes. Item ob uini ueteris & copioſi potum. Exiccatur uerò propter ſiccā quæ in eo eſt intemperiem, aut humores ſalſos, aut ſalſæ aquæ potum: item nonnunquam ob conſenſum totius corporis, ut in ardentibus & heſticis febribus accidere ſolet. Cauſarū diuerſitas facilè ex ægri ſermonibus & ijs notis quas in duobus capitulis præcedētibus narrauiſimus, cognoscitur. Porro cauſa cognita, unicuiq; peculiaris curandi ratio eſt adhibenda. Quare ſiti ex calore prouenienti, refrigerantibus eſt ſubueniendū. Cōuenit itaq; frigidi aëris attractio, & aquæ, aut uini aquoſi potio. Item cucumeris ſemen cōmanducatum. Decorticatum uerò & tritū, ex aqua potatū, ſiti ex calore uentriculi ortæ, ualde auxiliatur. Eodē modo prodeſt lactucæ ſemē māducatū & potum: itē ſemē portulacæ. Optimum ad ſitim tollendam eſt hoc, quod habet: Cucumeris ſatiui ſeminis decorticati ꝛ. i. tragacanthæ ꝛ. i. Tragacanthā contundito & cribrato, ſemē uerò conterito, eiſq; ouorum crudorum recentium candida

Ventriculus
quibus
caleſcat.

Quibus ſic
cetur,

Signa.

Curatio ſi
tis ex calore,

Catapotia
ſub lingua
detinenda,

adijcito, & simul omnibus contritis catapotia informato, ac in umbra exiccato. Ex his deinde unum detimēdum præbeto, ut paulatim dissolutū deglutiat. Quibus autem longo iam tempore uenterculus æstuat, eis succurrit radice dulcis succus potus, atq; ipsa etiā radix ex aqua, & portulacæ succus. Curatio diuturnæ sitis.
 Ceterum qui siti præmūtur ex calore & siccitate, ut accidit in ardētibz febribz, & peraridis omnibz, & in ijs q̄ æstate laborāt, ac in graui æstu, ijs optimè medetur oxycratum, Ex calore & siccitate. Oxycratū
 ut quod ex aceto & aqua cōpositū sit. Acetum autē strenuè refrigerat, & quouis expeditè permeat: aqua uerò, supra quā quod refrigerat, omniū quoq; est uel humidissima. Nihil enim (ut loco antea citato testatur Galenus) aqua est humidius. Sitim etiā quæ in febribz oboritur, lenire solet capitis irrigatio ex frigidissimo oleo, aut rosaceo, ex alto nimirū scyncipite irrorato. Siccitatis quoq; optimum remedium est somnus. Quare rectè ab Hippocrate 5. Aph. 27. dictum est: Quinoctu bibere appetunt, his admodum sitientibus si su- Curatio sitis quæ in febribz accidit.
 perdormierint, bonum. Vbi autē caliditas & humiditas co- Si caliditas & humiditas coeant.
 eant, ut accidit in ea aquæ inter cutem specie, in qua in uentre falsi humoris copia congeritur, aut in ijs quibus falsa pituita uenterculus refertus est, tum acetum optimum est remedium. Conducit etiam ijs absorbere malorum cotonerum cremorem, aut pyrorum, aut omphacij succum cum aqua. Si Si biliosi aut falsi humores sitim excita- uerint.
 autem biliosi aut falsi humores in uentriculo innatantes, aut eidem immersi & infarcti sitim excitauerint, tum exhibēda erunt medicamenta, quæ eosdem uacuare possunt humores. Deinde uerò adstringentibus & roborantibus uenterculum utendum est: quorum omnium exempla è superioribus petenda. His qui ob multi uini ueteris potum sitiunt, frigida aqua potata succurrit, & alia quæ lib. 1. capite 14. sunt commemorata.

De dolore stomachi. Cap. IIII.

καρδία-κκ. **καρδίαλγία.** **καρδία-γμός.** **καρδία-δωγμός.** **Caufa.** **Syncope stomachica.** **Signa.** **Vicius.** **Curatio.** **Vomitus.** **Purgatio.**

Dolorem stomachi Græci καρδίακωι & καρδίαλγίαν nominant. Siquidē prius os uentriculi, ut testatur Galenus 4. Aph. comment. 17. & lib. 5. de patient. locis, capite & multis alijs in locis, καρδίαγ, hoc est cor nominant. Hinc est quod hoc malum Hippocrati etiam καρδίαδωγμος, id est, cordis morsus dicatur. Fit hoc uitium, ubi in stomacho prauis, uenenatis, & morsu uellicantes humores detinentur. Vnde accidit, ut propter intolerabilem mordacitatem syncopen inferant, quam stomachicam appellamus. Malum ex assidua in ore uentriculi punctura & uellicatio ne statim innotescit. In hoc malo cibi refrigerantes, & qui robur stomacho asferre possunt, offerendi sunt. In quo censu habētur lactuca, & portulaca cū aceto acceptæ: item mala punica, & citrea uocata, pyra, uux acerbæ, & eiusmodi. Panis etiam, aqua egelida maceratus, conuenit. Reliqui quoque cibi tales sint, ut faciliē concoquantur, & tamen corruptioni non sint obnoxij. Eius quidem generis sunt pulli gallinacei, perdices, aues montanæ, & similia cum omphacio cocti. Item pisces saxatiles cum aceto, limonibus, & acido citrij mali succo cocti. Bibāt egri cinnamomi decoctum, aut uinum aquosum tenue. Quantum ad curandi rationem attinet, initio uomitus est per remedia quæ antea dicta sunt eliciendus. Dein quoq; per inferna purgare oportet, hiera picra assumpta. Quibus per actis remedijs uentriculum roborantibus utendum, tam extra quàm intra corpus. De quibus non est necesse sermonē prolongare, quod de ijs supra capite secundo, & alijs locis satis copiosè dictum sit. Quare ad alia uentriuli uitia progrediamur, atq; quo pacto ea sint curanda ostendamus.

De

De inflammatione ventriculi.

Caput V.

Inflammatiō uentriculi haud secus atq; aliarum partium corporis fit, à confluxu sanguinis copiosi & calidi. Hæc autem testantur dolor immensus, assiduus, & qui nullis medicamentis admotis mitigari potest. Præterea tumor, æstus qui tactu dijudicari queat, febris, grauitas & nausea. Victū perinde atq; in alijs inflammationibus tenuē & exquisitum esse cōuenit. Quod etiā monet Galenus lib. 13. The. methodi. quod scilicet eius munus toti animali cōmune sit. Ut ætā itaq; pitisanæ cremore, abstinendū uerò à carnibus, uino, & alijs cibis calidis. Bibat æger decoctū cinnamomi, aut succū malorum granatorū acidorum, aut aliorum fructuum frigidorū & adstringentium. Parum dormiat, & nō multū admodū loquatur. Fugiat quoad fieri potest tristitiā, uerseturq; in aëre mediocriter frigido. Curadi ratio à sanguinis missione auspicianda, modo corporis uniuersi plenitudo, ac uirū robur adsint. Incidenda uerò cubiti uena interna, & pro uirū robore sanguis detrahendus. Post hæc quæ reprimūt & adstringunt, foris ubi dolor & tumor maximè apparēt, sunt imponenda. Ventriculus enim, potissimum uerò os eius, eorū quæ adstringunt cōplexu semper quidē indiget, multo maximè uerò ubi fuerit inflammatus. Quare qui solis relaxantibus præsidijs, citra eorum quæ corroborant admixtionem, curationē tentant, periculū uitæ inferunt. Oportet itaq; siue oleum sit, quo inflammationem patientes fouentur, siue cataplasma ipsis imponatur, semper aliquid ex adstringentibus admiscere. Quapropter in hunc usum maxime conuenit oleum in quo absinthium, aut malum cotoneū decoctum sit, admixta simul mastiche adhibere. Item succum cotoneorum, aut pyrorū,

Causæ.

Indicia.

Victus.

Curatio.

Venæ sectio.

Reprimētia & adstringētia.

Ceratū.

adiectis rosis purpureis, hordei farina, santalis, bolo armenia, & similibus. Licetbit etiā uti hoc cerato, quod habet: Farina hordei ꝛ ꝛ. santalorum alborum & purpureorum, rosarū purpurearum, singul. 3 2. ꝛ. boli armenie 3 1. ꝛ. aloës, mastiches, utriusq; 3 1. absinthij, nucis moschatae, balaustiorum, singul. 3 ꝛ. oleorum mastichini, rosacei, utrorūq; 3 1. ꝛ. Cum cera & resina terebinthina quod satis est, informetur ceratum uentriculo imponēdū. Quod si maiori adstrictione opus erit, id quod tum fit, quādo tanta fuerit stomachi imbecillitas, ut ne cibum quidē retinere possit, rectē prædictis miscetur omphaciū, aut absinthij succus, aut hypocisthis, & rhuobsoniorū. Hæc autē omnia, si uehemēs sit inflammatio, actu frigida sunt alimouenda. Quod si aliud nihil deiciat, clysteribus leuibus irritanda erit. Neq; temerē facit, qui ætus uehementia paululum remissa, casie fistularis ꝛ ꝛ. intubi satiui stillatio liquore dilutam exhibet. Hoc etiā tempore adstringentibus medicamentis, quæ extrinsecus imponuntur, nonnulla quibus discutienti facultas inest, permiscenda erunt: ut est farina scœnogræci, flores chamæmeli, alibæ, & lini semina. Nunquam autē, ut antea quoq; monuimus, etiā ne tūc quidē quum nihil amplius affluit, & repelli quod in laborante particula continetur, nō potest, solis relaxantibus & discutientibus utendum: sed semper adstringentia quæ robur uentriculi cōseruare ualent, admiscēda, ut diligenter etiā Ga-

Emplastrū

lenus lib. 11. Ther. meth. cap. 10. monuit. Quare hoc tempore illius emplastri usus cōueniens erit, quod accipit: Farinæ seminis lini, scœnogræci, utriusq; ꝛ ꝛ. seminis anethi 3 2. florum chamæmeli, meliloti, utriusq; ꝛ ꝛ. absinthij, balaustiorum, rosarum purpurearum, utriusq; 3 2. hypocisthidis 3 2. oleorū chamæmelini, liliacei, rosacei, mastichini, singul. 3 ꝛ. axungie gallinæ, anserinæ, utriusq; 3 2. Commixtis omnibus re-

ducant

ducantur in formam emplastri. Antequam tamē apponatur, non ab re erit, si hoc unguento uentriculus inungatur, quod habet: Oleorum chamæmelini, anethini, cotoneorum, singu. Vnguētū.
 3 3. pulueris radicis altheæ, absinthij, seminis lini, singul. ʒ 1.
 ceræ quod satis est, fiat unguentum.

De cibi fastidio. Cap. VI.

Cibi fastidium diximus malum, quod Græci ἀνορεξία, ἀνορεξία.
 Latini uerò appetentiæ amissionē uocant. Accidit aut
 ob sensus exuctionis uenarū (qui sanè naturalis fames, Ga=
 leno lib. 1. de Symp. causis cap. 7. teste, existit) amissionem, aut Appeten-
tiæ amissio.
 quòd exuctio nō fiat, aut quòd corpus nō inaniatur. Contin=
 git etiam sæpe propter aliquam calidā, potissimum uentri=
 culi intemperie, quæ solida corpora laxādo dissoluit, atq; ad
 attractionis functionē reddit imbecilliora: humida uerò fun=
 dendo supra modū extendit. Oritur interdum ob uitiosorum
 humorū in uentriculo redundantia, & ob immoderatā uen=
 tris & intestinorū fluxionē, item sanguinis immodicā mis=
 sionem. Respuunt quoq; cibū ægri in cōtinuis & uehemen=
 tibus febribus, uentriculi, iecinoris, uulueq; inflammationibus
 alijsq; multis de causis, quas nō opus est nunc recensere. Indi=
 cia quæ calidā testātur intemperie, supra cōmemorauimus,
 nempe capite primo. Qui biliosorū humorū uitio cibum a=
 uersantur, uentriculi morfu torquentur, nauseaq; & siti ma=
 gis cōficiuntur. Quibus autē humores cōputruerint, ij etiā
 interdum febricitāt. At quibus crassi lentiq; humores fasti=
 diū pariūt, ij nec rosionē uētriculi, nec sitim experiūtur. Cō=
 muniter autē omnibus superuenit nausea. Si iuxta principiū
 morborū accesserit fastidiū, aut iuxta eorundē uigorē, quū
 uires adhuc sustinere possunt, nihil molestiarū infert: modi=
 co enim alimento ægri indigent. Si uerò in declinatione to=
 tius

Signa

Quando fa=
stidium pe=
riculo va=
cet, nec ne

tius morbi appetentiæ perditio accedat, aut in diuturna imbecillitate, aut uiribus debilitatis, aut ex immodica inaniitione, periculo nō uacat. Augetur malum hoc ab ætate. Incommode enim eo pueri afficiuntur, utpote q natura uoraces sunt, et assiduo fomite indigent. Quare magnus præter naturā excessus significatur, si pueri appetitus perditione fuerint affecti. Quod ad curā d rationem attinet, si ex uirium uentriculi imbecillitate appetentiæ amissio fiat, considerandum qualis intemperies uires exoluit: & per contraria ea ipsa corrigenda, ueluti suo diximus loco. Si uerò uiciatorum humorū præsentia fastidium excitarit, & tenues atq; mordaces fuerint, antequam aliam curā adhibeamus, cōtentos in uentriculo humores, uomitu uacuabimus. Quod si ægrè uomit laborans, sorbitiones & alia quæ humectare possunt alimēta exhibebimus, quæ eiusmodi humores ad aluum elicere, atq; infernè expellere consueuerunt. Aut plinè hiera picra aluius purganda. Deinde per ea quæ ad hanc rem idonea sunt, corpora ad bonū perducemus tēperamentū. Quibus crassi lentiq; humores fastidij autores fuerint, ijs medeberis extenuādo ipsos, incidendoq; tum oxymelitzæ, tum ijs quæ ex hoc & ex muria cōponuntur, ut cappari, oliuis, sinapi, & similibus, quæ capite primo exposuimus. Si uerò propter inflāmationē, aut obturationē alicuius alterius partis cibi fastidiū accidat, tū illius curationē adhibere cōuenit. Conandū uerò unicè, ut per odoramenta appetentiam reuocemus, aut uino, odoro diluto, aut malorū cotoneorum decocto, aut pyrorum. Inunctione item leni idē conabimur per olea, rosaceum, mastichinū & similia. ac moderata corporis frictione. Inseffus etiā lumbos & pectinē amplectentes adhibendi sunt. Cibi apparētur etiā plures & uarij, ac optimo apparatu. & ultra dulcedinem quoq; illiciētes, & appetitū irriātēs: frumentacei in primis

Curatio fastidij ob intemperic.

Ob uiciatos humores.

Tenues.

Craffos.

Ob inflāmationem.

gene

generis, ac multi alimēti, uelut est alica ex decocto palmularū, ac prunorū damaſcenorū lota, oua ſorbilia, & ex uolucris nō graueolētes, & macra & mōtana: pedes ſuilli in decoctione plurimū eliquati. Eiuſmodi enim cibos ſi guſtauerint tantū, ſufficiēs alimentū deinde corpori affēret. Omnia uerò quæ exhibētur eiuſmodi eſſe cōuenit, ut facile deuorari poſint. Quæ enim multa cōmanducatione indigēt, iniucunditatem quādam adferunt, & appetitum auertunt. Nec negligendum, quin præter unguenta extrinſecus etiam impoſantur uentriculo cataplaſmata ex palmulis, malis cotoneis, abſinthio, & ſimilibus. Item cerata ex eadem materia apparatus, quorum etiam exempla è ſuperioribus petenda.

De appetentia canina. Cap. VII.

CAnina appetētia, quæ Græcis ἀκυνόδης ὀρεξις dicitur, Canina appetentia. contrariū eſt amiſſioni appetitus malū. Qui enim ſic laborāt, ij plures appetūt cibos, & cū appetitū cohibere nequeāt, in ingerēdis cibis modū excedūt: deinde multitudine eorum grauati, et aſſumptos cibos citra noxā ferre haud potentes, ad uomitū diuertūt. Poſtea rursus cibo ſe explētes, de nouo ad uomitū reuertuntur quēadmodū canes: unde etiā malū hoc appellationē accepit. Fit: ppter frigidiorē uentriculi tēperaturam, aut propter uitiatos & acidos humores, qui os uentriculi mordēt et irritāt. Quippe frigidi humores uitiatī roſionē quæ ſuctioni proportionē reſpondeat inducūt, ciborumq; appetentiā haud aliter q̄ naturale pathema excitant. Accidit etiā nōnunquā propter totius corporis immodicam diſſipationē, quæ aut caloris uim, aut retētricis facultatis imbecillitatē ſequitur, ut copioſe lib. 1. de Symp. cauſis ca. 7. Galenus mōſtrat. Frigida uentriculi intēperies ex deprauata cōcoctione, inflatione, murmure, ac egeſtionibus multis dignoſcitur, Signa.

scitur, alijsq; indicijs suo loco cōmemoratis. Acidi humores è ructu acido, multa; egestionē & liquida admodū deprehenduntur. Immodica dissipatio si in causa fuerit atq; ob caloris qui instar ignis cibos cōsumit, & cutem rarefacit, uim acciderit: tunc pauciores uentris egestionē procedūt, quā pro eorū quæ ingeruntur modo ac proportionē, & quæ egeruntur sicciora sunt. Sim ob retētricis facultatis quæ cibis dominari nō potest, imbecillitatē prouenerit, tū eorū quæ fuerunt ingesta, multa fit deiectio. Quod ad curādī rationē spectat, frigida intēperies ad eū quē suo loco diximus modū curatur. Si uerò ab acidis humoribus ori uētriculi impactis, ac ueluti aqua in spōgiā immersis canina, atq; adeò immodica appetētia fiat, initio hiera picra Galeni exhibenda erit. Hæc enim nō tantum calefacere, uerū etiā diffecare, ac repurgare, extrahereq; ex profundo ori uentriculi infarctos humores, & per aluū infernē euacuare potest. Quin & robur uētriculo addit, ut subinde nō facile nociuū humorē suscipiat. Quare ea ad uitiosos humores uētriculo impactos, ut suprà etiā cap. i. à nobis cōmemoratū est, educēdos, præstantissima est. Exhibeatur autē pondere drachmarū quatuor ex uino cum aqua calida diluto. Si uerò puer hoc malo laboreat, qui ob aëritudinē bibere nequeat, in catapotia duas drachmas huius medicamēti digeremus, & forinsecus melle cocto oblinētes deuoranda exhibebimus. Quum uerò magna ex parte à pituita acida malū hoc accadat, ijs utendū cibis & medicamētis quæ hāc incidere, diffecare, repurgare, & calefacere possunt: ueluti sunt allia, porrū, thymus, satureia, origanū, pulegium, & quæ ijs similia existūt. Quapropter uacuatis initio uitiosis humoribus, hac tandē uictus ratione utantur. Panis non sit recens, neq; bene fermentatus, cui etiam quæ urinam mouent admisceantur, uelut est anisum, careum, cuminū, petro-

Curatio.

Si ex acidis humoribus,

Vicius,

tro

trofelinum, & quæ eius generis existūt. Cibi sint pingues, & oleosi. Sorbitiones itaq; cōuenient appetitū destruentes, ueluti sunt pulres ex melle multo, & oleo plurimo, aut adipe anserino, gallinaceo, aut suillo. Ex oleribus aut malua. Cerebelli item & pinguiore uolucriū partes, pisciumq; eodem modo, & omnino quæ appetitū auertunt, & satietatē inducunt, & quæ magno cumulo accepta, modicè alunt. Vinum autē ipsis recte datur copiosum, quantū uidelicet bibere possunt ex eorū numero quæ impēse calefaciunt, cuiusmodi sunt colore fulua, substantia tenuia, odora, adstrictionisq; experientia. Hoc enim uētriculū excalfacit, & humorū destruit acorem, ut sepe solū suffecerit cū pinguibus & oleosis cibis ad perfectā curationē: ita ut rectissimè ab Hippocrate dictum sit: *Famem uini potio soluit. Exhibendum uerò tam ieiunis,* ^{2. Aph. 21.} *quàm ijs qui cibum sumpserūt, etiam si nondum sitierint. Ieiunis tamen calidum, aut certè tepidum. Abstinere autē oportet ab omnibus acidis & adstringentibus cibis ac potibus, maximè uerò à fructibus. Bellaria eorum sint, pistacia, amygdalæ, nuces pineæ, & oliuæ ex mellæ. Lac etiā ipsis exhibendum tum per se, tum cū passo aut melle: ita tamen ut obseruemus ac uitemus in eis, quibus in uentriculo acescere cōsueuit. In ijs enim maius nocumentum quàm utilitas cōsequetur. Probè uerò concoctum non solum appetitū obtundit, sed & aluum obturatam emollit, fluxionesq; eius sistit. Apparandæ etiā ex ipso lacte potiones & placentæ, ut sunt dulciaria, & oryza cum lacte decocta exhibēda. Lauare quoq; per interualla oportet, cuticulāq; ipsorū largè pinguefacere. Isto quidem curationis modo tantisper utendū, dum à malo penitus liberetur æger. Si uerò ex immodica dissipatione, ac transpiratione canina appetentia oritur, tunc eorum qui hoc modo patiuntur cutem dēfere, ac spissiore reddere conuenit, cum*

oleo

Ab quibus
abstinēdū.

Si ex immodica
dissipatione,

oleo ex immaturis oliuis expresso, aut rosaceo, aut myrino, aut alio in quo quippiā adstringēs ad lentum ignem decoctū sit. Quinetiā optima ratione eger in aëre frigido ac spirabili uersabitur. Fugiat uerò aërem calidum, & balnea cōsimili qualitate prædita, uini potum, & omnia quæ tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt. Potus autē sit aqua frigida, aut cinnamomi decoctum. Ducatur eger ad lauacrū frigidū, si quidē nihil id fieri prohibeat: utpote corporis gracilitas, aut pars aliqua corporis refrigerata, thorax (uerbi gratia) aut alia quæpiam. Cibi eis exhibendi sunt stabiles, & agrè corruptibiles, ut sunt cochleæ, & litotum genus testaceorum, si ex duarum aquarum reiterata decoctione appareatur: carnes itē suille in uigore existentes, maximè uerò uentres. Bubulæ quoq; pinguiore, & omnia simpliciter pinguis, & quæ uētri innatāt, tardèq; cōcoquūtur ac distribuuntur. Sunt enim qui sic afficiūtur, quādo quidē ipsis calor acris ac mordax, & ut quispiā dixerit febriculosus inest, ex eorū numero, qui minori negotio bubulas carnes aliāq; concoctu difficilia, quā saxatiles pisces, similiaq; cōcoctu facilia cōficiunt, ut fufius in præfatione libri primi de alimentorū facultatibus Galenus docet. Ex ouis, ea quæ coquēdo sunt indurata, aut sartagine fixa conueniunt. Similago absq; melle ex pinguibus iusculis apparatus. similiter oryza cū butyro decocta, & panes nō fermentati. iuxta proportionē autē quantū malum imminuitur, tantum ex crassi humoris cibus est detrahendū, & ex adstringētibus forinsecus admotis imminuendum. Aliquādo enim sedata uehēmētis appetētia accessione, quū corpus crudis & crassis humoribus repletur, in aliud grauius malū transitio fit. Inter adstringētia uerò, præterea quæ suprā dicta sunt, illius unguenti usus esse poterit, quod habet: Oleorū myrtini & cotoneorū, utrorūq; ʒ f. olei ro-

facei

Vnguentū
adstringēs.

facci 3 1. succi plantaginis 3 2. santalorum purpureorū, ma-
stiches, bistortæ, rosarum purpurearum, singul. 3 1. boli ar-
menie 2 2. hypocisthidis, acatiæ, sanguinis draconis, singul.
2 1. ceræ quod satis est, formetur unguentum.

De bulimo. Cap. VIII.

BΟΥΛΙΜΟΣ Græcis nihil aliud est quā ingens uehemēsq; Bulimos.
fames. Bou enim particula alijs uocibus adiecta, signi-
ficationē eorū auget. Fit ex uētriculi frigiditate, indigētiaq; Causa.
et uirium imbecillitate, et ferē in totū ab externo frigore
initiuū capit. Siquidē peregrinationes multæ, et lōga itinera,
maximē per niuē facta, malū hoc inducūt. Dignoscitur hac Signa.
ratione: fames initio multa adest, quæ tamē non usquequaque
perdurat. Nā postea repēte animo inquantur ægri, cum ex-
tremarū partiū refrigeratione, et spiritus defectiōe. Porro Curatio.
huic malo statim adhibēda curatio erit, quod sint qui in locis
desertis, aut in balneo eo correpti confestim, auxiliij facultate
destituti, perierint. Quare eos qui in itinere, aut aliās fame Si malū si-
ne febre sit
magna citra febrē infestantur, resoueimus aceto, aut pule-
gio, ad odorandum exhibito, aut terra quæcunq; tandem cō-
tigerit aceto conspersa, aut malis, aut pyris, aut similibus a-
lijs fructibus qui ad manū fuerint. Auxiliatur et panis recēs
naribus admotus, et caseus boni odoris, caro suilla affata aut
cocta, et in uniuersum omne qd' multū alit, maximē uerò qd'
nidosum ac probē conditū, sufficiētēq; odorē habet. Per
huiusmodi enim odores, tales ut plurimū refocillantur: quum
nihil sit, ut diximus lib. 2. capite de syncope, quod odore citius
uires reficere possit. Ceterum et extremæ eorum partes fa-
scijs constringendæ sunt, manuumq; ac pedū summitates ca-
lide aquæ feruentiori imponendæ, ipsiq; tum maxillarū pun-
ctura, tum capillorū et aurium uellicationi excitādi. Reuo-

Si in febri-
bus malum
accidat.

catis uerò iam ab exolutione, panem ex uino diluto, aut aliud quippiā eorum quæ accruatim uires reparare possunt, offeremus: uelut sunt oua sorbilia, alica cum uino. Cōpendiosissimū enim auxilium ex cibo sperare possunt, quē etiam si oblatum assumere nō possunt, ori indere oportet uiolenter, cogereq; ut ipsum deglutiāt. E' uestigio enim & à fame, & ab animi deliquio liberātur, & celeriter excitātur. In hūc quoque usum cōueniunt antidota ex odoramentorū uarietate cōposita, ut est odoratū rosaceū, diambār, diāthōn, diamoschi, alipta moschata, & id genus alia. Quod si in febribus (quod tamē rarò accidit) bulimos inuascrit, atq; circa exacerbationē febriliū declinationē eius accessio irruerit, intrepidē cibi sunt offerendi. Si uerò in principio accessionis, aut in uigore acciderit, per odoramenta prædicta reuocādi sunt ægri, maxime per ea quæ sunt frumentacei generis, uelut est polenta aqua madefacta, aut panis calidus nidorem adhuc emittens: frictio quoq; extremarum partiū adhibēda, & cataplasmata ex palmulis, aut malis cotoneis in uino decoctis. Atque hæc usq; ad remissionē facere oportet, ut oportunē cibum offerre liceat. Quod si ex ijs nihilo melius habeant ægri, audendū est per ciborum ingestionem auxiliū adferre. Cremorem itaque ptisanæ, aut buccellas unā & itē alteram uino albo & tenui madefactas exhibebimus. His enim refocillati, ac ex improviso respicientes, deinceps usq; ad remissionem perueniunt. Vitabimus autē omnino in ijs qui hoc malo sunt apprehensi, longiorem cibi dilationē ac inēdiam. Verū solerti ratione facta, singulis horis simplicissimū modicumq; cibum dabimus. Assiduus enim bulimos & exoluit, & animi deliquia, ut dictum est, affert, quibus ægrē auxilium reperitur. Quod autem in ipsa etiam accessione liceat egrotantes nutrire & cibare, pereleganti historia Galenus lib. 10. Ther. meth.

meth. capi. 3. ostendit, ubi multa quoq; ad institutum facientia
offendent studiosi.

De cruditare. Cap. IX.

CRuditās, quam Græci ἀνωψία vocant, est ubi cibi in ἀνωψία
totum non permutantur. Causæ eius intemperies uen- Cruditās.
triculi, inflammationes, scirrhi, abscessus, & quæcunque eius
generis existunt. Aliquādo autem uentriculo nihil patiente
cibi crudi permanent, aut propter immoderatā ciborum ac
potuū ingestionem, aut ob uitiosam ipsorū ciborū qualitātē,
aut ex intempestiua, aut etiam inordinata sumptione, aut ob
recrementum uitiosum, aut somnum breuem, quemadmodum
Galenus libro 3. De sympt. causis cap. 1. copiosè docet. Cau- Signa.
sarū diuersitas partim ex ægri & assidentiū sermonibus, par-
tim etiam ex indicijis certis deprehenditur. Ex sermonibus
ægrorum & assidentiū cognoscuntur immodica ciborū &
portionum, itemq; intempestiua & inordinata ingestio, so-
mniq; breuitas. Vitiosæ autē ciborū qualitates è nidoribus &
ructibus. Corruptiones enim nidorose in calidioribus &
biliosioribus, acidæ uerò in frigidioribus natura, & magis
pituitosis. Eodē modo & de excrementis, quæ in uentriculo
præexistunt, iudicandum erit: quæcunq; enim ex eis pituitosa
& frigida sunt, acidæ corruptiones efficiunt: quæ uerò ca-
lida & amara bile mixta, nidorosas. Ipse quoq; uenterculus
aliquo modo affectus, si quidem frigidus morbus existat, aci-
das permutationes facit, calidus uerò nidorosas. Quum uerò
citra corruptionē perfectā cruditās oboritur, ut quales as-
sumpti sunt cibi, tales permaneant iuxta omnē suam qualita-
tem, ex hoc cognoscere datur uictum esse uentriculū, aut ab
immoderata ciborū quantitate, aut per uehementem insiti
caloris refrigerationē. Vt ne quis igitur in cruditatē inci- Vicius,

dat, cautione in omnibus prædictis est utendū, ut neq; in multitudine, neq; in qualitate eorū quæ in cibo accipiuntur, neque in acceptionis opportunitate, neq; in ordine delinquat: & ut quæcunque concoquere valeat, ea tantum ingerat, & non quæ appetitus expostulat. Mensuræ itaque maximè omnium diligenter curam habere oportet, appetentiamq; refrænare, Cibi mo- & neq; plus quàm vires tolerant assumere. Ordinē etiā præ
 dus. posterū cauere oportet, ne scilicet mala cotonea, aut punica, aut aliqd aliud tale imprimis ingerat, deinde uerò olera assumant ex oleo & garo, aut etiam alia quæ aluū emolliūt. Intē-
 Tempus. pestiuam quoque assumptionem evitare conuenit, ne scilicet antequam uel ipse modicè fuerit exercitatus, uel hesternus cibus probè descenderit, prandeat, aut etiā præter consuetam horam. Fugienda etiā omnia quæ natura difficulter concoquantur, ueluti sunt carnes natura duræ, bubulæ nimirum, & ceruinæ, aut ætate, ut sunt omnia seniores. Cauendum etiam à pinguibus, salisq; condimento seruatis, ac uetustis. Ex oleribus quæ calidioris sunt naturæ, ualdeq; frigida: item quæ flatu pariunt, incommoda existunt. Ex piscibus qui duras carnes habent, & repositione arefacti. Abstineāt quoq; à cibis corruptis, & fœtidis ac graueolentibus. Vitent fructus dulces, aut flatu generantes, & immaturos. Bellaria item quæ difficulter concoquuntur. Non minus autē uitandi cibi peregrini & inconsueti, ac medicamentariā uim habentes, quales frequenter placentis ac panibus immiscuntur. Iuxta tempus uerò accipiēdi cibi neq; impetuosè, neq; accruatim, neq; solidis partibus, aut absque commanducatione eos ingerere oportet. Neq; etiam potus cibum interpellat: id enim unitionem ciborum impedit, singulosq; innatare facit. Post assumptum cibum motus inæquales ac conturbantes uitandi, item æstus & refrigeratio: hæc enim concoctioni ciborum resistunt.

stunt. Adiuuant autem eandem calefactio hypochondriorū,
 & frictio pedum. Quod si grauitas adsit circa uentericulum,
 & ex ea molestia quædam in uniuersum corpus diffundatur,
 ex passa manu os uentriculi apprehendendum est, aut pue-
 rulus carnosus admouendus. Cōfert siquidē amplius, Galeno
 lib. 5. De simpl. medi. facul. cap. 5. autore, magisq; multo fa-
 miliaris est eo calore, qui à sōmentis paratur. Eiusdem utili-
 tatis gratia, quidam paruos catellos per quietem uentri im-
 ponunt, copiā coquentis cibos caliditatis adaugētes. Somnus
 etiā nocte imperturbatus & æqualis pcurāus. Adhæc ere-
 ctior decubitus apparetur, et ea quæ capiti subijciūtur subli-
 mius insternantur, & reclinatio ipsa in sinistrum latus fiat:
 atq; si quis uigilijs infestetur, citra corporis uexationē cō-
 motionem uē permaneat, eādēq; decubitus formam obser-
 uet: frequentes enim agitationes cibos perturbāt, intestinaq;
 inflata reddunt. Curandi ratio pro causarum diuersitate ua-
 riatur. Aliam enim intemperies uentriculi calida, aliam fri-
 gida requirit. Aliam item inflammatio, aliam scirrhus & ab-
 scessus, quas omnes è proprijs capitibus petent studiosi. In
 præsentiarum hæc dixisse satis sit, quum iniucundus ructus
 proueniēs manifestè ciborum corruptionem esse factam im-
 dicat, citra cunctationē ad uomitū ueniendum erit, atq; aqua
 tepida ingesta, omnia corrupta ad excretionem cogenda. Si
 enim in uentre permāserint, & torsionum, & grauitatis ca-
 pitis causa existunt. Aliquando autē bilis supernè ac infernè
 effusionem, aut profluuium uentris, aut etiā febres inducunt.
 Quare eos qui difficili cōcoctione apprehendi solent, longo
 ante tempore assuesfaciemus ut facile uomāt: commodissimus
 enim in plurimis periculis existit. Quod si quis natura diffi-
 culter uomat, & ob nullam causam malè dispositus sit ad fri-
 gidæ potum, non inconueniens erit cyathum unum aquæ fri-

Curatio.

Quādo vo-
mendum.Si quis x,
grevomat,

gide pura absorbere. Corroboratus enim uenter celerimè que in ipso hærent extrudit, & ad subiectas partes demittit. Sequenti deinde die in q̄te æger afferretur, frictioneq; pedū utatur, & hypochondriorū cōcalefactione, donec murmur & flatus circa intestinum rectū eruperint, eructationesq; cū qualitate māsuetiori recurrerint. Et tūc sanè exurgere conuenit, ut primū aliis ea que corrupta sunt egerat: deinde ad deambulationē moderatā æger procedat, atq; otīū agat, propter cōmotos uapores ex corruptione in caput delitos. Post hæc autē ad quotidianas actiones mēs applicanda est citra perturbationē ac indignationē. Deinde rursus uenter cogendus est ad corū que relictā sunt excreationē. Postea quiescere iubebimus, atq; aqua calidiorē pedes perfundere ac fouere, frigida uerò pura facie proluta, in lecto quiescere omnibus conatibus somnū illiciēdo. Post quē modica deambulatione, deinde balneū suscipiatur. A balneo cibū capere cōuenit moderatū, & cui cōcoquēdo corpus sufficit. Non prætereūda tamē sunt medicamenta, que cōcoctionē iuuare possunt: ueluti est piper, maximè longum, quod unicè concoctionem adiuvat. Si tamen id ipsum non adsit, albo utendum erit: quod si neq; hoc adsit, nigro. In eundem usum antidotus diacotoneōn conuenit, & diospoliticum Galeno & alijs ueteribus dictum. Sunt etiam alia tum simplicia tum composita uentriculum roborantia intra & extra corpus exhibenda, que in superioribus capitibus recensuimus. Debent autem omnia hæc medicamenta, potissimum que oxypora, hoc est cito penetrantia accipiūt, ut sunt careum, sceniculum, apium, ligusticum, oreoselinū, ammi, piper, zingiber, & similia, duabus ante cibum horis dari. A cibo uerò nunquam assumenda: distribuitur enim simul cum ipsis aliquid crudorum ciborū, & obstructionē operatur. Quare usus illorū maximè sit post matutinam frictionē, & duabus ante exercitium horis.

Piper longū cōcoctionē iuuat.

Oxypora quando dāda.

De inflatione ventriculi. Cap. X.

Ventriculus ex flatibus in eo generatis inflatur. Generā Causa.
 tur autem ex humoribus in ipso pituitosis, aut ex ci-
 bis in uapores per deficientem & imbecillum calorē resolu-
 tis. Etenim absoluta frigiditas nullum omnino flatum efficit,
 propterea quod neq; extenuare, neq; conficere, neque dissolu-
 uere cibum possit. Vehemens autem calor, magna ex parte
 uincens ea quæ comprehendit, plus quàm pro uaporis gene-
 ratione cibum extenuat, nisi is suapte natura facile in flatū
 transeat: uerūm flatus ita genitus & turbidus erit, & nebu-
 losus: quinetiam paucus, & parum duraturus, ut ad unum
 aut alterum ructum statim euanescat. Calor uerò in cibos
 agens, si parum ualidus fuerit, ut eos quodammodo dissoluit,
 ita non omnino cōficit: unde sanè flatuum generationē fieri
 necesse est, ut copiose libro 3. De sympt. causis cap. 7. Gale- Signa.
 nus docet. Accedit ita laborātibus uētriculi grauitas & distē-
 tio, aliquando etiam tumor & eminentia quædam iuxta os
 uentriculi, & ipsum adeò uentriculū efficitur, ructusq; ina-
 nes fiunt modicè alleuantes, inhibitiōq; flatuum qui per al-
 uum excerni consueuerunt. Malum etiam ipsum aliquando
 quidem iuxta totum thoracem, aliquando uerò retro iuxta
 spinam ac dorsum ipsaq; uerticilla irruit: sepe autem &
 utrinq; occupatos tenet. Ultra hæc uehemens difficultas spi-
 ritus ob septi transuersi compressionem adest, ut aliqui non
 dissimile quiddam suffocationi se perpeti æstiment. Leuantur
 autem cibo infèrnè subeūte, & flatibus siue per ructus, siue
 per aluū exclusis. Murmura deniq; intus audiūtur. Si itaq; ex Curatio in
 cibis pituitosis sit uētriculi inflatio, uictus sanè ratione exte- flationis ex
 nuante utendū erit, & medicamētis ijs quæ pituitā difsecant cibis pitui
 & euacuant, de quibus capite primo huius libri diximus. to sis,

- Ex imbecillo calore.** ex deficiente et imbecillo calore orta fuerit inflatio, cibis ceterè utendum erit concoctis facilibus, & boni succi. Parum etià comedendum: siquidè inedia huic malo summè confert. Post omnè cibum vinum meracius exhibendū. Multum tamē potum tanquā in festissimum hostem deuitet. Fructuū quoq;
- Solia calida.** atq; olerum humidorū esum semper suspectū habeant. Solijs etiam calidioribus utamur, hæc enim Paulo lib. 1. ca. 51. teste, mitigāt, emolliunt, flatus ubiq; fuerint dissoluūt, somnūq; conciliant. Vbi uerò somnus accesserit non parū leuat ægro
- Decoctum** tantes, quod scilicet concoctionem minificè iuuat. Ceterū quod ad medicamenta ipsa attinet, bibāt hoc decoctum, quod habet: Calaminthæ, mentastri, chamæmeli, origani, mentæ, pulegij, singul. ṡ. 1. absinthij ṡ. 1. seminū anisi, apij, cumini, dauci, oreoselinij, fœniculi sing. 3. 3. seminis urticæ, carei, utriusq; 3. 2. radiceis helenij 3. 2. decoquantur in aqua iustæ quantitatis, donec tertia pars absumatur: dein colo transfundantur, adiectoq; saccharo sufficienti ius decocti dulce reddatur, addanturq; serapij de calamintha 3. 3. & fiat potio, de qua æger in aurora singulis diebus sumat 3. 4. uel utendum medicamento hoc quod accipit: Specierum dianisi, diacumini, diacalaminthes. singul. 3. 2. seminum anisi, carei, dauci, fœniculi, singul. 3. 1. carpesiorum, garophyllorū, utriusq; 3. 2. zingiberis 3. 1. piperis 3. 1. sacchari lib. 1. misceantur singula & fiat tritura, uel ut barbari loquuntur tragea. Eos qui non ita diu antè cibum sumpserunt, primum: uomere oportet. Glandes quoq; confidenter & citra dilationē supponēdæ sunt, ex rebus flatu prolestantibus, in hunc uel similem modum formata: Mellis cocti 3. 2. seminū rutæ, cumini fœniculi, singul. 3. 1. seminis carei & anisi, utriusq; 3. 6. salis 3. 2. misceantur singula, & fingantur glands. Aluo autem uehementer adstricta, clyster infundendus, qui accipit decocti paulò antè de-
- scrip

scripti lib. 1. benedictæ lax. 3 7. oleorum absinthitis, rutacei, anethini, singul. 3. 1. pinguedinis anseris & gallinæ, salis expertium, utriusq; 3 2. f. salis uulgaris 3 1. Cōmixtis omnibus fiat clyster. Extrinsecus uenter in hoc malo cū oleis iam dictis inangendus erit: aut lana in fasciculum conuoluta, & oleis prædictis leuiter calidis madefacta, imponēda. Lanæ uero sic cōuolutæ cum inū tritum, aut apij semē, aut anethi inaspergendū. Perseuerante autē diutius malo cataplasmata ex semine lini, hordeacea; & loliacea farina, cumino, anethi semine, aut apij, aut fœniculi tritis, centaurij coma, & id genus alijs parata imponenda. Aut hoc ceratum, quod habet: Ceratum.

Oleorum rutacei, anethini, nardini, laurini, singul. 3 1. farinæ seminis lini, fœnogræci, utriusq; 3 1. f. seminis opij, carei, melanthij, singul. 3 1. baccarum lauri, centaurij minoris, utriusq; 3 1. f. gummi ammoniaci, opopanax, utriusq; 3 2. ceræ & resinæ quod satis est, fiat ceratū. Porro cucurbita bonæ magnitudinis umbilicum undiq; cōprehendēs, cum flamma copiosa admotā, præsidium in hoc malo est quod incantamenti cuiuspiā simile, Galeno etiam lib. 12. Ther. metho. id ipsum testante, efficit. Castoreum quoq; ex posca potum, tum extrinsecus cum oleo anethino appositum prodest. Cucurbita

De singultu. Cap. XI.

ΛΥγμός Græcè, singultus Latine, est motus uentriculi qui est ueluti eius cōuulsio, ab expultrice facultate noxia uolentis extrudere excitatus. Neq; temerè adiectū est, ueluti eius cōuulsio: neq; enim absoluta cōuulsio est. hæc enim solis musculis inesse solet. At qui neq; uenter ipse, neq; ipsius ostiolum musculus est, ut copiosius Galenus lib. 3. De sympt. causis cap. 2. ostendit. Accidit magna ex parte, uel ex plenitudine, uel inanitione, Hippocrate etiam teste, qui sic

Singultus quid.

Singultus non cōuulsio uentriculi.

Cause. 6 Aph. 39.

scriptum reliquit. Conuulsio fit uel ex plenitudine, uel inanitione: ita uerò & singultus. Interdum etiā fit ob acrium humorum, & medicata qualitate præditorum, mordacitatem. Cibus quoq; in mordacem qualitatem mutatus atq; adeò corruptus, aliquos singultire facit. Frigiditas etiā oris uētris, & alimēti corruptio singultū inducūt, quo sanè nomine pueris omnium maxime frequentes singultus eniunt. Fit deniq; in febribus singultus, stomacho præsertim, aut aliquo alio uiscere inflāmato. Causæ externæ facillè de sermonibus ægri & assidentium cognoscuntur. Plenitudo ex grauitate, inanitio autem ex ijs quæ præcesserunt. Cibus corruptus è nidore eius: acria uerò ex uellicatione atq; erosione. Singultus itaq; ubi à frigiditate ortus fuerit, oleum in quo ruta, cuminum & absinthii decocta sint, lana exceptū, uentriculo imponendum. Oleū etiā mastichmū, & è castoreo inunctū prodest. Pueros calefactorū linteorū admotio nō raro iuuat. Adultioribus & integræ ætatis in potu uinum, aut apū in aqua mulsæ decoctum, aut cuminū tritum, aut asarū, aut pulegiū, quodlibet eorum per se, aut simul mixta exhibeātur. Vtile & acetum scylliticū sorbēdo acceptū. Castoreum etiā ijs, tum ob frigiditatem singulticibus, tū ob humorū multitudinem similiter affectis, drachmæ pendere ex posca dandū. Quin & uentriculo extrinsecus impositum, utrisq; cōmodū existit cum oleo antiquo. Præterea qui ob frigiditatem singultiūt, ijs spiritus retentio, quæ calorem auget, quæadmodū copiose lib. 2. De symp. causis ca. 6. Gal. docet, præsens est remediū. Quādo uerò ex plenitudine oboritur singultus, uomitus optimū remedium fuerit. Crassis autē humoribus existētib, cum oxymelite sylitico, & calaminthes, marrubij, ac similibus iam sæpius commemoratorum decocto extenuandi & incidendi erunt.

Auerſio. Deinceps ea quæ in contrarium humorum copiam trahunt & auer

& auertunt, sunt adhibenda. In quē usum conueniunt ea quæ
 per inferna purgant, potissimum uerò chysteres, extremarū
 partium frictio & constrictio, cucurbitulæ cū plurima flā-
 ma thoraci, uentriculo, & dorso affixæ. Conuenit etiā ijs de-
 ambulatio longa & concitata, gestatio, atque adhuc magis
 equitatio. Præterea sternutatio etiā cōueniēter eis cōcitur.
 Nam Hippocrate teste, à singultu cōprehensum sternutatio ^{6. Aph. 15.}
 superueniēs liberat. Quādo enim à plenitudine fit singultus, ²²
 uiolēto opus est motu, ut ueluti cōcussæ ipsum efficiētes hu- ²²
 miditates, diffilētur atq; euacuētur. Sic quoq; uociferatio cō- ²²
 cinna cum plurimo clamore, & detentio spiritus illis cōstē-
 runt. Venter deniq; per medicamēta quæ intrinsecus &
 extrinsecus adhibētur roborandus erit. Intrinsecus per anti-
 dota corroborātia, de qbus lib. 2. De cōpos. med. ca. 5. abundē
 diximus. Extrinsecus uerò unguētis, emplastris et ceratis an-
 tea pductis. Porrò singultus ex euacuatione sanatur per ali-
 mēti cōuenientis assumptionē, & per ea quæ defectū explēt, <sup>Singultus
ex euacua-
tione cura-
tio.</sup>
 quæ partim sunt supra dicta, & copiose infrā in curatione
 hecticæ febris dicentur. Non mediocriter autem in hoc ge-
 nere singultus, conducit uertebras cervicis & dorsi, hume-
 tate oleo, nempe uiolaceo & amygdalarum dulcium per-
 ungere. Cæterum mordacibus rebus singultum excitātibus, <sup>Singultus
ex morda-
citate cura-
tio.</sup>
 primum sufficiens remedium uomitum ipsum reperiemus: de-
 inde sensus etiā stupefactionē, & morsum inferentium alte-
 rationē. Stupefiunt autem sensus per refrigerantia, in quem
 usum Philonium exhiberi potest, aut pilulæ de cynoglossa, <sup>Pilularum
de cyno-
glossa visus,</sup>
 quæ in hoc malo mirifice conferre solēt. Earum uerò is usus
 erit. Debent ex una drachma confici sex catapotia, quorum
 unum antequam cubitum eat aeger sumat. Alteratur autem
 mordacitas & discutitur per obtundētia, attenuātia & exic-
 cantia medicamēta. Obtundit autē mordacitatē intubi satiui
 succus

succus potatus, cucumeris semen decorticatum, tritumq; bibitum. Lactuce semen eodem modo sumptum. Item portulacæ succus potatus, ipsaq; portulaca in cibo sumpta. Myxarum etiam decoctum in potu acceptum. Maximè tamè omniū præstat lac asininum: aut si hoc non adsit, bubulum, recēs multum, potatum. In eundē usum exhibendum saccharum roseum, aut uiolaceum, aut nymphææ, antidotus diarhodon, diatriosantalon, zylapium uiolacæ, nymphææ, & eiusmodi. Obtudit uerò, attenuat, & exiccat is pastillus, qui accipit:

Pastillus.

Costi, croci, spica nardi, rosarum uiriliū, mastiches, singul. ʒ ʒ. asari, aloës, utriusq; ʒ ʒ. opij ʒ ʒ. Cum succo psyllij fiant pastili, de quibus detur ʒ ʒ. aut ʒ ʒ. Porro opium & rose & psylli succus ex refrigerantium genere existunt. Nardi autē spica ex discutientium & corroborantium. Asarum uerò, per urinas uitiosos deducit humores. Aloë uiriatos humores expurgat, & infernè per uentrè purgat. Crocus cōcoquit, & particulas corroborat: per temperamentum quidē caliditatis concoctionem efficiens, per adstringendi uerò uim, quæ ipsi adest, robur addens. Costus autem sufficienter calefacit, moderatè uerò adstringit, quod & ex gustu eius percipitur. Commendat hoc medicamentum pluribus uerbis Galenus libro 8. De compos. med. secundum locos, capite 3.

De cholera. Cap. XII.

Cholera.

Xολέρα Græcis, cholera Latinis etiā appellatur, est uentriculi immodica perturbatio, infra & supra per uomitum facta. barbarā sectantes medicinā cholericam & cholicā passionē nomināt. Qui hoc malo afficiuntur, Græcis χολεραῖοι, & Latinis cholerici uocātur. Accidit ob multā cruditatē, quæ nōnunquā è magna alimentorum prauitate, interim etiam ex uitiosorum humorum copia oritur,

Cholerici.
Causæ.

Signa

Signa quibus malum deprehēditur, manifesta admodū sunt: Signa.
nam infrā supraq; excernunt. Siis etiam sequitur, & sudor,
& pulsus cōcīsus, musculorumq; manuum ac pedum, maxi=
mē uerō surarū cōtractio & tētio. Quapropter cū hoc ma=
lū acutissimū sit, & grauissimā syncopā, si paulō diutius du=
ret, inducat, accurata opera danda erit, quo cōfestim & sine
mora huic succuratur. Nemo autē medicorum ubi copia ui=
tiosorum humorū malum hoc conciliauerit, mox initio, aut Curatio.
confertim ea quæ efferruntur cohibere aggrediatur: inutilia
enim cum sint, euacuatione indigent. Quare si nauseabundus
est æger, & turbatur, cibis etiamnū crudis in uentriculo ma=
nentibus, aqua tepida propinari debet, deinde uomere oport=
tet, digito uel penna ori indita. Neq; tamen cum aqua mulsā, Si nausea=
bundus sit
æger.
neq; aqua cum oleo mixta uomitus citandus: quòd hæc flu=
xiones augeat, illa uerō mordacitatē operetur, & torsiones
augeat. Adiuuare etiā oportet per inferna excretionē: alienū
enim uelut uenenū insidēs, & uentrē ac intestina rodit, &
humores ex uniuerso corpore attrahit. Propinanda uerō Purgatio.
sunt leuissima medicamēta purgantia, ut est aloë, casia fistu=
laris, myrobalanorū decoctū, & similia. Postquā autem su=
peruacua educta fuerint, tum quiescere oportet. atq; hypo=
chōdria oleo mastichino, uel nardino, uel absinthite fouere
cōuenit, somnumq; accersere. Prædictis oleis admiscenda in=
terdum alia quæ uentrē roborare possunt, de quibus suprà di=
ctum est, & ex ijs cōficienda unguēta. Vbi iam exacta appa=
ruerit cōcoctio balneo aquæ dulcis, & cibis boni succi utē=
dum est. In quorū numero est iusculum pulli gallinacei cum
omphacio. Carnes auicularum montanarū, perdicū, oua for=
bilia, & eiusmodi. In potu utendum succo malorum grana=
torum, aut serapio rosaceo, aut aqua in qua chalybs ignitus
ter aut quater eximctus sit, Caterū cū malū perscuerauerit,
& gra

Et gracilitas per ambitū corporis fiat, et maxime si uenter
 cōsidat, pulsus minor dēsiorq; euadat, tūc sanē extremas cor
 poris partes uinculis adstringere, ac oleo multo impingua
 re oportet. Cataplasmata etiā et emplastra ex adstringenti
 bus et roborantibus cōposita uentriculo imponēda. Sunt au
 tē eius farinæ quæ ex palmulis, hypocisthide, acatia, rhoē ob
 soniorū, bolo armenia, thure, balauſtijs, rosis, ac myrti fructi
 bus cōponūtur. Efficax quoq; remedium est, si linteū in suc
 co malorum syluestriū made factum uentriculo imponatur:
 aut hoc ceratum, quod habet: Oleorū rosacci, myrtini, coto
 neorum, singul. ʒ i. mastiches, thuris, acatiæ, singul. ʒ ʒ. hypo
 cisthidis ʒ ʒ. santalorū alborum et purpurcorū, utriusq; ʒ
 ʒ. balauſtiorum, sanguinis draconis, utriusq; ʒ ʒ. boli arme
 niæ ʒ ʒ. ceræ et resinæ qd' satis est, in formetur ceratū, quod
 uentriculo adhibeatur serico obductum. In potu uerò frigida
 aqua cyathi mensura, hoc est ʒ i. f. absorbenda præbeatur,
 Cauendū tamē ne nimīū frigida sit. Hæc enim aceruatim ex
 hibita reuomitur, et aliquando innatum calorē suo stupore
 extremē offendit, aut inflammationem stomachi, aut uisceris
 alicuius efficit. Instilletur uerò huic interdū mali punici acidi
 succus exiguus, aut rosarum, aut pampini uitis decoctum.
 Quòd si acriora sint ea quæ excernūtur, uexetq; sitis et ar
 dor, cucumeris semē cū aquæ cyathis tribus præbeatur. Da
 tur quoq; utiliter cum amylo. Tum etiā intubi et lactuca in
 posca coctæ exhibeantur. Post uerò somnus procurādus, et
 quies omni modo. Verū si fluxio sisti nequeat, et pulsus in
 tercidatur, apprehendatq; frigiditas et sudor, aliquādo etiā
 singultus, ad uinum trāseundum est mediocriter adstringens,
 neq; uiribus ualidum, dulce tamē, non autē odorum. Interant
 autē in ipsam calidum, si fieri potest: si uerò non frigidū, mi
 cas panis, aut alicam iniiciant, atq; ita paulatim et per in
 ter

Scutū qd'
 vocant sto
 machi.

Si fluxio si
 sinequeat.

terualla absorbeant. Vini tamen multitudo uitanda est, ac o= omni arte conandū, ut ipsos sopiamus, è rosis, pampinis, ru= bo, & similibus antea sepè dictis, domus pauimento constrata. Odoramenta quoq; naribus admoueātur, rosæ, mala coto nea, & eiusmodi. Illitiones etiā soporiferæ circa frontē adhi beantur. Aluo autē adhuc egerente, amyllum cū decocto ca= pitū papaueris per clysterē infundatur: simul enim & cohi= bet & refrigerat, & somnum inducit. Ad uomitiones uerò Vomitus coërcendas succū mēspilorū, malorum cotoneorum, punico= cōstriatio,
rum, pyrorum cōmanducare & deuorare cōuenit. Si ne his quidē auxilijs, & alijs quæ supra cap. 2. huius libri exposita sunt, cibum retinēt egrotantes: extrinsecus uentriculo cu= curbita leuis quàm maxima admoueatur. Ad cōtra= Ad cōtra= cōntractions in
tem in musculis factas, linimēta oleo calido imbuta musculis
circūponere oportet, & cerata humida seu unguēta, quibus
adiectum sit aliquid castorei, & olei irini, quorum copiā in
capitate De resolutione, & cōuulsione offēdes. Vbi malū
inclinauerit, cibis reficiendi sunt ægri, pullis gallinaceis, co=
lumbis, gallinis, perdicibus, palumbis, turdis, & cōsimilibus.

De diarrhœa. Cap. XIII.

Δ *ἰατρίαι* Græcis, Latinis uerò diarrhœa, copiosum Diarrhœa,
est sine exulceratione & inflammatione alui proflu= uium. Accidit propter imbecillitatē instrumentorum cōco= Cause,
ctioni seruientiū, alimenta item copiosa humidiora & uisco= siora, eorundemq; corruptelā, mordicationē deniq; in uētre cōtentorū, et defluxum quorūdā è supernis ad uētris spacia, imbecillitatēq; retētricis facultatis. Notæ qbus discernūtur Signa,
causæ, manifestæ admodū sunt. Si enim propter imbecillitatē diarrhœa fit instrumētorū quæ cōcoctioni seruiūt, uētriculi (uerbi gratia) intestinorū, iecinoris & lienis, ex proprijs de
ijs ca

ijs capitibus petenda signa erunt. Sin ob alimētorum prauorum multam ingestionē accidit, partim de egri sermonibus, partim etiā ex ijs quæ excernuntur, cognosci potest. Si enim biliosa fuerint, flauo colore infecta erunt, neq; citra mordicationē & caloris sensum eijcientur. Aderit etiam oris amaritudo, sitis, tenuis corporis habitudo, & alia quæ biliosam constitutionē ostendunt. Si autē pituitosa fuerint, contraria iam dictis prorsus erunt ea quæ per aluū excernuntur. Quòd si à capite in uētrē cōfluxerint humores, egestionēs spumose apparebūt, cerebriq; tēperies humida admodū erit. Si à plenitudine totius corporis oriatur, aut iudicatorius sit alui fluor, signis quæ in alijs locis à nobis cōmemorata sunt, & à Galeno in lib. De plenitudine & crisi bus deprehenduntur.

Curatio. Cæterū si ab imbecillitate instrumentorū alui profluuiū excitabitur, intemperies quæ hanc ipsam parit, suo contrario, quæadmodū cap. i. huius libri monstrauimus, corrigēda erit. Si autem propter alias causas fluore alui laborauerit, & natura per hunc quæ noxia & superuacua sunt in corpore expellere tētauerit, & ij qui eo correpti sunt facillē tolerauerint: tum usq; quòd natura omnem suam curam impēderit expectare, aut ipsius etiā motus adiuuare conuenit. Etenim obluētari & excretionis cohibitionē moliri, maiorem morbum facit. Siquidem quæ cohibētur sursum perlata dolores capitis, aut phrenitim, aut lethargum, aut parotidas periculo haud uacantes inferunt. Quare initio ea quæ in corporis cōmoditatem utiliter excernuntur, minimē inhibere oportet. Postquā uerò iam diutius perseuerauerit fluor, non solum superuacua expellens, uerumetiam habitum corporis ueluti colliquans, uiresq; consumens, tunc sanè ei resistendū erit, tū per ea quæ per os sumuntur, tum ijs quæ per anū infunduntur, atq; etiam ijs quæ extrinsecus uentri imponūtur. Si itaq;

pure

Alui profluuiū non temere sistendum.

pure biliosa excrementa prodierint, in magis salubria permutare ipsa oportet, non tamen per cohibitionem statim eos curare. Biliosum enim tum in uētriculo, tū in ieiuno intestino aggregatū, atq; post coacervationē retentum, maximopere ledet. Nam & uentriculū subuertit, & uisceribus inflammationes infert, & sitim accendit, & febres instaurat, omniaq; prædicta in capite uitia efficit, atq; in totum grauius malum reddit. Quod si itaq; humores biliosi in corpore copiosi fuerint, natura per medicamēta purgantia leuia, ut est rhabarbari dilutum, castia fistularis, cortices myrobalanorum luteorum, aut mel aërium, quod recentiores Græci manna uocant, iuuāda uenit. Lac deinde bubulū aut caprinū tepidum, recens mulctū, exhibendū, aut sanè ad ignem decoctū, assidueq; agitatū, donec ad tertias sit reductū, quod ipsum & fluuiales silices, ferriq; aut chalybis laminas igni candefactas, & in lacte extinctas fieri potest. In decoquēdo uerò superstantem concretionem siue spumam auferre oportet. Hoc sanè nullum compēdiosius remediū ad fluxiones biliosas reperire poteris. Quādoquidem autem febricitātibus lac ipsum in nidorē aut etiam acorem conuerti consueuit, maiusq; nocumentū quā commodum inferre, tunc sanè, si simul febricitent, ipsum exhibere uitabimus. Aquæ uerò quarta parte ad lac ipsum affusa, decoctionē faciemus, donec dimidium eius consumatur, atq; hoc modo exhibebimus. Si autē in intestinis coacervata bilis fuerit, clysteres ex hordeo decocto, saccharo rubeo uocato, oleo rosaceo, ouorū luteis, & similibus paratos iniicere oportet. Biliosis tandem uacuatīs humoribus, intrinsecus ea quæ adstringunt & roborant exhibenda: ut sunt saccharum rosaceū, diacotonēon citra species, diatrion santalōn, pastilli ē spodio, hydromalon, & similia. Qualia uerò esse debeant ea quæ extrinsecus imponuntur medicamenta, paulò post dicemus.

Biliosa diarrhoea curatio.

Purgatio.

Febricitantibus cur lac non dā dum.

Si in intestinis coacervata sit bilis.

cemus. Sedes etiam ipsa ex decocto quopiam adstringentium foueatur. Ceterum in diarrhoea ex humoribus crassis, pituitosis & lentis nata, ac eorundem corruptione facta, haud secus quam in priore a purgatione auspicanda curatio erit. Exhibendum itaque tunc agarici dilutum cum myrobalanis empetriticis, aut simile aliquid, quod praedictos humores educere possit. Conueniunt etiam chlysteres, potissimum ubi in intestinis uiscidorum humorum copia coaceruata fuerit, e centaury minoris decocto, oleo rutaceo, & similibus. Intra corpus exhibenda diacotoneon cum speciebus, zingiber coctum nominatum, & alia quae calafacere & exiccare ualent medicamenta. Ex-

Diarrhoea ex pituitosis humoribus curatio. **Purgatio.** trinsecus etiam quae robur addunt ad mouere oportet. Quod si ob retentricis falcultatis imbecillitate orta fuerit diarrhoea, ea sunt sane adhibenda medicamenta, quae ad alias immodicas alui fluxiones ad mouetur. Irrigationes itaque ex oleo omphacino, aut rosaceo, aut melino, cum uino aliquo austero adhibeantur. Efficacius autem myrtinum est, si uehementiori indiget adstrictione, tertia aut quarta uini parte ei admixta. Quod si robustiora sint corpora, gallas, malicorium, & balaustium in ipsa irrigatione incoquere licebit. Perseuerante autem adhuc fluxione, cataplasmata, emplastra, & cerata ex adstringentibus & exiccantibus composita, quorum mentionem in capite sequenti faciemus, imponenda erunt. Parabile uero & efficax hoc est, quod habet: **Mora praematuritate adhuc acerbio** ra & albicantia septem, quibus ubi probe contusa fuerint adduntur olei rosacei & cerae & i. & fingatur ceratum. In potu uero accepta, post inutilium euacuationem, uentris fluxiones sanant cuminum, adianti decoctum, spinae albae radix, apij similiter semine drachmae pondere datum. Vrinam enim irritat, fluxionesque ad intestina factas eodem diuertit. Mora quoque immatura, & adhuc acerba, ad sole pluribus diebus exiccata, deinde reposita,

posita, usq; expetente trita & bibita, mirificè aluū restrin-
gunt. Cuntunduntur etiam & obsonijs admiscuntur, quem-
admodum rhus consuevit, qui interdum uncie unius pondere
cum pullo gallinaceo decoquitur. Magis tamen aluum co-
hibent rubi mora immatura & acerba, eodem modo exica-
cata, & in potu exhibita. In numero compositorum medica-
mentorū mirificè conferunt pastilli è spodio, è lemnio si-
gillo, diacotoneon, diatrionsantalon, theriaca. & hæc cōpo-
sitio, quæ accipit: Specierum diatrionsantalon, diarhodon
abbatis, utriusque ÷ 2. coralliorum rubeorum, thuris se-
lecti, rosarum purpurearum, singul, 3 f. spodij 31. seminum
oxalidis, rhois obsoniorum, utriusque ÷ 1. balaustiorum, a-
catie, utriusq; 3 f. mastiches ÷ f. boli armenie 31. sacchari
candidissimi 3 s. dissoluti in stillaticijs liquoribus plantaginis
& rosarum, singantur morsuli. Item hoc ecligma, quod ha-
bet: Sacchari rosacei ueteris, diacotoneon sine speciebus suc-
ci medicati è ribes, de oxyacantha, singulorum 3 f. hydro-
mali 33. diamoron 33. specierum diatrionsantalon ÷ 2. co-
ralliorum rubeorum ÷ 1. spodij, balaustiorum, utriusq; 3 f.
boli armenie 31. serapij myrtini quantum ad excipiendum
sufficit fiat ecligma. Porro hanc aquam nunquam non pa-
ratam habebis, quæ habet: Rhois obsoniorum quartam unā,
aque pluuiialis lib. 3. in quibus die & nocte sumach macere-
tur, dein ebulliat, & rhu benè ac ualidè exprimatur. In ea si-
quidem aqua oryza, milium, & alij cibi coquantur, aut sal-
tem aliqua eius portio ijs affundatur. Si propter defluxum
ab alijs corporis partibus diarrhoea accidit, curatio ex pro-
prijs capitibus petenda erit: uerbi gratia, si ex capite in uen-
triculum defluxio fiat, ad ea quæ in capite De curatione de-
stillationis dicta sunt recurrendum erit. Et sic in cæteris
etiam corporis partibus faciendum.

Cōpositio
in morsulis,

Ecligma,

Aqua miræ
vilitatis.

Si propter
defluxū ab
alijs corpo-
ris partib⁹,
diarrhoea
accidit.

De Lienteria. Cap. XIII.

Lienteria.

Λ ΕΙΩΤΟΡΙΑ Græcis, quemadmodum ipsum nomē indicat, leuor quisspiā intestinorum est, qualis etiā extrinsecus in corporis cuticula ex cicatrice cōingere solet. In hoc siquidē malo intestina cibos non retinent, sed antequā per mutationē et perfectam cōcoctionē admittant, dilabuntur, idq; ea qua fuerunt assumpta forma. Cuius rei testis est Galenus, qui lib. 6. Aph. com. 1. sic definit lienteria. Leuitas intestinorum, inquit, est uelox exitus eorum quæ comeduntur et bibuntur, quæ talia deijciuntur, qualia fuere deuorata. Quare Latinis rectē leuitas seu leuor intestinorū dici potest. Oritur autē frequēter graui præcedente dysenteria, atq; adeo ex profunda intestinorum exulceratione, cicatricibus densis et leuibus succedentibus, quæ deinde propter densitatē quidem suā ciborum per corpus distributionē fieri non permittunt, quum sanē uenarum quæ alimenta ex intestinis ad se auellunt, ora sint ueluti obturata. Ob leuorē autem, ut dictum est, cibum antequā perfectæ concoquatur, dilabi sinunt. Fit etiā nonnunquam lienteria ex imbecillitate et languore facultatis cibos in uentriculo retinentis. Hac enim infirma et imbecilla, nec concoquuntur, nec distribuuntur alimenta: sed cruda, humentia, nihilq; immutata excernuntur, aluo continenter fluida. Interdum quoq; post longum uentris profluium oboritur. Aliquādo etiam aqua intercutē per uentrem euacuata, lienteria consequi solet. Ex quacunq; igitur causa lienteria orta sit, ægri cibum non sentiūt, et malū corporis habitū acquirūt. Succedit itaq; ægris assidua excretio cruda, colore subalbida, inæqualis, et aquosissima, citra sanguinis ac bilis cōplexum. Adest autem simul et ardor per tota hypochondria se dilatās, quē cibi concomitatur fastidium. Est autē bonum et amicum signum in ijs qui lienteria longa laborant,

seu leuor
intestinorū
Causæ.
Dysente-
ria præce-
dens,

Imbecilli-
tas reten-
triciis,

Longū al-
ui proflu-
uium.
Hydrops.
Signa.

Signū bo-
num,

borant, si eis acidus ructus accidat, iuxta id Hippocratis di-
 ctum: In longis leuitatibus intestinorū si acidus ructus fiat, »
 qui prius nō erat, signū bonū. Significat enim, cibū in uētricu- »
 lo aliquādiu cōtineri, donec principium mutationis accipiat. »
 Ceterū quū eiusmodi malū sit, facile est intelligere, quod ^{Victus.}
 facultatē retentricē & cōcoctricē, tum uentriculi tum inte-
 stinorum omni modo refocillare oportet. Id quod in primis
 per ciborū cōuenientiū exhibitionē, & uictus rationē resti-
 tuendis & refocillandis uiribus aptā, fieri potest. Cōueniūt
 itaq; carnes auicularū montanarū, pulli gallinacei aſi, in quo-
 rum uentre rhus, aut mastiche etiā imponi debet, et alia quę
 capite sequēti cōmemorabuntur. Cibus qui exhibetur quan-
 titate paucus sit, & cōcoctu facilis. Et si acris & biliosa sit <sup>Si biliosa
sit deiectio,</sup>
 deiectio, ex oryza, alica, & similibus, quibus cū adstringens
 aliquod decoquetur, pyrum, malū cotoneū, mēspilum, & ad
 id genus alia, parabitur. Item lac discoctum eis proderit. Sin <sup>Si pituito-
fa,</sup>
 autē pituitosiora excernūt, cōtrarius ipsis cibus adhibetur.
 Nonnulla quoq; uentriculo grata, anisum (uerbi gratia) cu-
 minū, uel dauci semē admiscētur. Potus erit uinum aquosum
 & tenue in priore, in altero uetustius & calidius. In uniuersū
 uerò potus sit exiguus, multus enim non solū lienterie,
 uerum etiā omnibus reliquis uētris fluxionibus infestissimus
 existit. Quòd ad curandi rationē attinet, si ex imbecillitate
 facultatum uentriculi creatur lienteria, ad caput De imbe-
 cillitate uentriculi recurrendū, atq; illinc curandi ratio pe-
 tenda. Summatim uerò exhibēda intra & extra corpus quę
 adstringūt, & tam uentriculū quā intestina roborare pos-
 sunt. Exhibendū igitur serapiū de absinthio, de menta, aliāq;
 antidota quę uentriculo robur adijcere possunt. Extrinsecus
 uerò ea sunt admouēda medicamēta, quę in capite De diar-
 rhœa sunt commemorata, & sequēti dicentur capite. Sed in

Vnguentū. primis hoc medicamentū cōueniet, quod accipit: Oleorum mastichini, de absinthio, de menta, myrtini, singul. 3 1. pulueris cinnamomi selecti, garyophyllorū, galangæ, singul. 3 1. ba-
Ceratum. laustiorū, rosarū purpurearū, utriusq; 3 1. ceræ quod satis est, fingatur unguentū. Vel hoc ceratū, quod habet: Oleorū mastichini, de absinthio, cotoneorū singul. 3 1. olei de menta 3 1. calami odorati, garyophyllorū, thuris, singul. 3 1. ligni aloës 3 1. rosarū purpurearū, santalorū alborū & purpureorū, singul. 3 1. mastiches, cumini, utriusq; 3 1. hypocistidis, acatiæ, rhois, singul. 3 1. galliæ moschatiæ 3 1. cum cera & resina terebinthina quod satis est, in formetur ceratū. Porro quibus cicatricē factā esse cōiicimus, ijs acriū rerū comestio uelut refractionem quandā cicatricum operatur, atq; adeo utilis est. Quin & insitū calorē reuiuificat, & cōcoquendi facultatē quodāmodo refocillat. Conuenient itaq; in hoc casu, Galeno cap. 97. Artis medicæ autore, quæ sufficienter abstergunt, & parum adstringunt. Quapropter admiscenda semper adstringentibus medicamentis abstergentia. In reliquis causis lienterię omnibus eodem curationis modo utendum est, quo in diarrhœa & dysenteria affectis utimur.

Dyscente-
ria.

Tormina.

Cruentæ

dysenterię

quatuor

species.



De dysenteria. Cap. XV.

Υσγυρῳπία Græcis, ppriè nihil aliud est quàm exulceratio intestinorum. Latinis placuit hoc malū ap-

pellare tormina eo quod in eo intestina dolore admodū torqueantur. Neq; temere in dysenterię descriptione adiectum est propriè: sunt enim Græcis quatuor cruente dysenterię species, quemadmodum testatur Galenus lib. 3. De sympt. causis:

1. quarum prima est, in qua sanguis propter aliquam partem corporis præcisam, aut prioris uitæ excercitationem inter-
2. missam, per circuitus excernitur. Altera, in qua sanguis a-

quo

quo

quosus, hoc est aque, in qua carnes cruenta & recens ma-
 etate sunt abluta, similis, deijcitur: id quod ob iecinoris im-
 becillitatem accidere solet. Tertia, in qua & nigrior & splen-
 didior eo qui naturalis est excernitur, ex sanguine & atra-
 bile comixtus. De ijs certè nobis in presentia non est sermo.
 De quarta uerò, in qua paulatim & breuibus interuallis nō- 4
 nunquam sanguis syncerus, nonnunquam etiā grumosus cum
 pure, uel ramentis intestinorum, se penumero etiam densum
 sterces cruentis guttis respersum, deijcitur, nunc agimus.
 Hæc quidem, ut dictum est, ob intestinorum exulcerationem *Causæ,*
 fit, quæ interdum à causis externis, frigidityte scilicet, æstu,
 & humiditate accidit. Item perniciosorum medicamentorū
 potu, scammonie scilicet, & similium. A fructuū comestio-
 ne, cruditatibus, acrium ciborum acceptione, ab humoribus
 mordacibus & acris ex uniuerso corpore ad uentrem cō-
 fluentibus aut in ipso natis. Hæc quidē nunc à tenesmo, nunc
 per se incipit. Excernuntur primū biliosa, uaria, subpinguia: *Signa,*
 pingui nimirum quod intrinsecus intestinis adhæret paula-
 tim circumliquefacto. Quum uerò superficies intestinorum
 perfectè fuerit denudata, exulceratioq; supernè consistit,
 feculenta & cruenta deijciuntur. Vbi autem altius penetra-
 uerit exulceratio, etiam sordes mēbranulas admixtas habē-
 tes expelluntur. Quòd si non cohibeatur, breui uicinos lo-
 cos depascitur: saniosa uerò quædam excernuntur, qualia à
 mortuorum cadaueribus defluere consueuerunt. Siquidem
 igitur tenuia intestina exulcerantur, dolores circa umbili-
 cum consistunt, biliosaq; & porri colorem habentia, atque
 omnino uariegate stercore plurimū commixta excernuntur,
 cum labore & torminibus mordacitateq; ac exolutione, ut
 nō procul ab animi deliquio ægri absint: à sitiq; instantur,
 & febricitant, sterces quoque crudius prodit. Exulceratur

*Notæ ex-
 ulceratio,
 nis tenuiū
 intestino-
 rum,*

autem uerū rarò admodū, & ieiunū intestinū, quod si cōtin-
 gat, egestionēs crudiores apparēt, sanguinē nigriorē uehe-
 menter implicatū habentes, bilēq; abundē flauā. Sitis multa,
 itēq; nausēæ affligūt. Vomunt etiā aliquādo, & cibos auer-
 santur: dolor quoq; uehemens supra umbilicū confidet, quā-
 doq; & febres malignæ oboriuntur. Atq; ita affecti decolo-
 res fiunt, & ad animi deliquiū usq; exudāt. Vires ipsorū citò
 deficiūt, neq; procul ab interitu absunt. Sin crassa intestina
 exulceratione laborant, tum stercora quæ egeruntur syncera
 & multa sunt, & coaceruata, & cum flatibus prodeūt, ali-
 quādo etiā spumosa. Pinguis quoq; ijs commixta sunt, &
 cruor supernatat, ueluti latius lib. 6. De patiē. locis Galenus
 ostendit. Id ipsum autē nosse, non mediocriter ad curationem
 cōducit. Nam si in superioribus intestinis ulcus est, ab epotis
 medicamentis præsidium petendum est: si uerò in crassis &
 humilioribus, clysterē iniicere magis cōuenit. Principiū cu-
 rationis dysenteria laborantiū à quiete & modico cibo fiat,
 undecunq; tandem fluor procedat. Permittente itaq; febre,
 lacte recēs multo adhuc calido utendum est: aut pro eo lac
 coctum, quod in capite De diarrhœa descripsimus, exhiben-
 dum. Hoc enim primum depurgat, atq; simul ea quæ sunt in
 corpore contemperat, ac postremū aluum sistit. Oportet
 uerò in super & panē madefactum à lactis acceptione offer-
 re. Pulses etiā ex lacte apparatus, tum medicamenti rationē
 habent, tum nutrimentum optimum præbēt: uelut est oryza
 cum lacte, amyllum, & oua lacti admixta. Sorbitiones quoq;
 aut pulses ex alica, milioq; adiecto rhœ, cōueniunt. Appa-
 randa item puls ex siccis panibus affusa posca, aut palmula-
 rum, aut malorū cotoneorum, aut pyrorū, aut rhois succo.
 Lenticula quoq; probè assata cum plantagine, aut malis co-
 toneis contusis decocta exhibenda. Olerum usus non est ne-
 cessā

Notæ ex-
 ulceratio-
 nis crasso-
 rum intesti-
 norum.

Vitius.

cessarius: at tamen degustandas exhibebis, serim seu intubum
 satiuam & syluestre coctas, plantaginē, brassicamq; bis co-
 ctam. Damus & ouorum assatorū lutea. Carnes dysenteria
 correptis, quod alimenti ualentioris sint, & concoctioni re-
 nitantur, nō ualde cōmodæ existunt, dandæ tamē eis qui diu-
 turno malo uexātur. Ex ijs præ aut cæteris uolucriū eligēda,
 perdicis nimirū, palumbiū, & montanarum auicularum. Ex
 pedestribus carnes capræ & leporis cōueniunt. Iumentorū,
 & omniū aliorum quadrupedum carnibus interdicare opor-
 tet. In potu à principio quidē aqua pluuiā, quæ non sit ex adi-
 bus plumbo teetis delapsa, utendum est. Talis enim aqua sa-
 nis etiā potata dysenteriā conciliat. Quod si pluuiā optima
 non adsit, fontana, in qua chalybs ignitus extinctus sit, ute-
 mur. Si uerò laborauerit uētricus, aut ubi uires fuerint de-
 iectæ, etiā uinum præbendum. Sit autē adstringēs, & nō ual-
 de uetustum. Somnus sanè optimum dysenteria laborātibus
 præsidium. In curandi ratione uti oportet remedijs adstrin-
 gentibus obtundētibus reficcātibus & urinā mouētibus, atq;
 adeò fluxionē aliò transferētibus. Quæ adstringūt, hæc qui-
 dem sunt: lopathi semē, rhus, galla, malicorium aridum, rubi-
 radix, ladanū, acatia, hypocisthis, balaustiū, folia salicis, sym-
 phyti radix, folia & semen, rheum ponticū si haberi potest,
 altheæ radix, equisetū, corallium, mastiche, coagulū leporis,
 sanguis draconis, cortex thuris, lemnia terra, uerbasci radix,
 plantaginis semē, bellis minor, alcea, oxys, sanicula, ophrys,
 ophioglossum, polygonum, bursa pastoria, solidago sarace-
 nica uocata, pes leonis, numularia, solidago media, bistorta
 seu serpentaria mas, geranium sextum, herba diui iacobi ho-
 die nominata, mora acerba, acini uuæ, maceris cortex, &
 alia eius generis. Obtundunt autem & contemperant humo-
 rum morsum & acrimoniam, amyllum, tragacantha, gum-
 mi,

Potus,

Curatio,

Adstringē-
tia,Obtunden-
tia & con-
temperantia,

mi, adeps caprinus, hircinus, suillus, anserinus, & gallina-
 Reficcan- ceus. Reficcat coagulum leporis, cornu ceruinū uſtum, te-
 tia, ſtæ cancerorum fluuiialium, & ſaluia. Vrinam mouentia ſuo
 loco inuenies. Quare ſi craſſiora inteſtina exulceratione la-
 Curatio craſſiorum m borant, clyſteres adhibeantur, primum quidem ij quibus ab-
 inteſtino ſtergendi uis ineſt, qualis eſt qui habet: Decocti hordei in-
 rum, tegri lib. 1. mellis roſacei colati ꝓ 1. ſacchari rubei uocati ꝓ ꝑ.
 Clyſter ab uitellos oui numero 2. olei roſacei ꝓ 3. Commixtis omnibus
 ſtergens. fiat clyſter. Facta primum abſterſione, ea quæ glutinare poſ-
 Congluti- ſunt inſundantur, quale eſt quod accipit: Roſarū purpurea-
 nans, rum, plantaginis, foliorum ſymphyti, polygoni, uerbſci, ſin-
 gul. m. 1. gallarū, rhois obſoniorū, utriuſq; ꝓ 2. burſæ pa-
 ſtorie, m. f. balauſtiorū ꝓ 1. oryze toſtæ ꝓ 1. radicis ſymphy-
 ti ꝓ ꝑ. decoquantur ſingula in aqua chalybeata, donec tertia
 pars abſumatur. Dein colo trāſfundātur, accipianturq; iu-
 ris decocti ꝓ 12. ſucci plantaginis ꝓ 2. acatie, hypociſthidis,
 utriuſq; ꝓ 2. boli armenie, ſanguinis draconis, utriuſq; ꝓ 1.
 ſeui caprini ꝓ 1. oleorū roſacei, myrtini, cotoneorū, ſing. ꝓ 1.
 cōmixtis omnibus fiat enema. Interdū uehemētia doloris non
 tantū obtundentia uerumetiam ſtupēſcientia medicamenta
 Dolorem leniens in- requirit. Quare tum conuenit hoc uti clyſtere, quod habet:
 fuſum, Lactis caprini aut uaccini lib. 1. butyri ſalis expertis ꝓ 1. adi-
 pis caprini ꝓ 1. f. tragacanthæ, gummi, utriuſq; ꝓ 1. uitellos
 ouorū numero 3. catapotiōrū de cynogloſſa ꝓ 1. olei roſacei
 ꝓ 3. cōmixtis omnibus formetur inſuſum. Si uehemētiori ſtu-
 pēſactione opus fuerit, pondus pilularū augendū, aut priori
 portioni aliquot opij grana, tria nimirū aut quatuor, uel mi-
 nus aut plus pro uehementia doloris, & corporis conſtitu-
 Curatio exulcera- tione, adiſcienda. Ceterū ſi in tenuibus inteſtinis exulcera-
 tionis te- tio cōſiſtit, tū remedia quæ à ſupernis & per os aſſumūtur,
 ſinorū, magis deſiderat. Cōuenit itaq; decoctum ex adſtringentibus
 ſuprà

suprà commemoratis, admixtis serapijs rosaceo & myrti-
 no, cum alijs quæ in capite De diarrhœa dicta sunt medica-
 mentis, exhibere. Neq; temerè quis hoc propinabit medica-
 mentũ, quod habet decocti radicis symphyti, aut alterius ex
 adstringētium numero 3. serapij rosacei 3. serapij myrtini
 3. & pulueris pastillorũ è spodio, seminis plātaginis, boli ar-
 menie singula. 2. misceantur singula, & fiat potio. Extrin-
 secus præter ea quæ cōmemorata sunt in capitibus De diar-
 rhœa, et liēteria imponēdũ uentri hoc ceratũ, quod accipit:
 Oleorũ mastichini, rosacei, myrtini, cotoneorũ, singulorũ
 3. 1. farine hordei, scœnogræci, utriusq; 3. 1. & rosarum purpu-
 rearũ, plantaginis, utriusq; 3. 1. balaustiorũ, sanguinis draco-
 nis, utriusq; 3. & boli armenie 3. 1. hypocisthidis, acatie, masti-
 ches, singul. 3. 2. Cum cera & resina quod satis est, in forme-
 tur ceratum. Possunt & alia multa ad exemplum iam dicto-
 rum præsidiorum componi, quæ singula commemorare, &
 superuacaneum & inutile esse iudicamus.

Extrinse-
cus quæ ad-
habenda.
Ceratũ
optimũ

Detenesmo. Cap. XVI.

Tenesmus est assidua, & quæ differri ac euitari nõ po-
 test, desidendi seu egerendi cupiditas, qua tamen nihil,
 præter modica cruenta uel mucosa, egeritur. Latinis tenes-
 mus appellatur, barbaris uerò nostri temporis medicis te-
 nasmus. Fit nõnunquã propter frigiditatem extrinsecus oc-
 currentem, humores acres & biliosos, pituitam salsam, ulcus
 inflammationemq; in recto intestino obortam. Nonnun-
 quam etiam stercoris in intestino cæco coacti obstructio,
 tenesnum efficere potest. Causam externam frigidam facile
 de sermonibus ægri cognoscet medicus, quia nimirum podicè
 res frididas attigit: aut hyberno tẽpore frigus nimium pertu-
 lit, aut in aqua frigida diutius cōmoratus est. Humores ex ijs
 quæ

τὸν σπυρ-
μὸς

Tenesmus.

Causæ.

Signa.

quæ excernuntur dignoscere licebit, quæ uel biliosa, uel pituitosa erunt. In ulcere purulenta ac saniosa excernuntur, & in ano pungentis sensus inest. Inflammatio tumore recti intestini, & dolorem grauium unâ cum febre efficit. Stercoris multitudinē grauis distensionis sensus circa anum uentrē sequitur. Curandi ratio pro causarū diuersitate uariatur. Qua

Curatio.
Tenesmi
à frigore.

propter si tenesimum frigus præcesserit, uinū meracum calidum propinandum erit, ac pectinē, inguina, interfoemineūq;

ῥῆσιν

Græci ῥῆσιν uocant, oleis ac fomentis calidis irrigare & fouere oportebit, cuiusmodi sunt rutaceum & liliaceum. Furfures autē in uino decocti, & sacculo excepti, commodè

Clysteres.

sedi adhibentur. Clysteres quoq; è decocto mentastri, origani, calamintæ, chamæmelo, abrotono, semine anisi, fœniculi, & similibus paratos, adiectis oleis anethino, chamæmelino,

Later vetustus.

liliaceoq; mîcere cōuenit. Porrò mirificè confert, si statim ab excretionē admoueatur later per quā uetustus, & à fumo denigratus, unâ cum paleis in eo complexis tusus, dein

Curatio tenesmi à biliosis humoribus.

aceto feruenti subactus, linteoloq; illigatus sedi subditus. Cæterū si à biliosis humoribus in ano & intestino detentis fiat tenesmus, clysteres quibus abstergendi & abluendi in-

Clyster.

est facultas iniiciendi sunt. qualis est qui accipit: iuris decocti hordei lib. 1. sacchari rubei nominati ꝯ 1. æ. mellis rosacei ꝯ 1. lutea ouorum duorum, olei rosacei ꝯ 3. commixtis omnibus, fiat enema. Vitanda omnia acria, & utendum mediocriter frigidis & humidis, & omnibus his quæ bilis acrimoniā

A pituito-
sis humori-
bus,

cōtemperare possunt. Si à pituitosis humoribus procreetur, curabitur instar illius qui à frigore factus est, adiectis tantū ac commixtis ipsis clysteribus, quibus uacuandi pituitum facultas inest medicamenti, compositione nimirum Indi, aut diaphœnicōn, aut benedicta laxatiua uocata. Quòd si ab in-

Ab inflam-
matione.

flammatione tenesmus oriat, ptisana succus, paucis rosas pur

purpureis simul cum eo decoctis infundatur. Aut uehemen-
 tiori inflāmate infestante, hoc utendum infuso, quod ha-
 bet: Iuris decocti plātaginis ꝑ 5. olei rosacei ꝑ 2. oui unius can- Clyster.
 didum. Cōmisceātur singula, & fiat clyster. Extrinsecus in-
 ter fœmineum, seu perinaeon, hoc est locus inter penem
 aut anū, oleis rosaceo & myrtino irrigādus. Vel adhibeatur
 tale fomentum, quod accipit: Rosarum purpurearum, plan- Fomentum.
 taginis, utriusq; m. i. balaustiorū ꝑ 3. sidiorum ꝑ 1. baccarum
 myrti ꝑ 2. foliorum rubi ꝑ 1. decoquātur singula in aqua suffi-
 ciēti, donec tertia pars absumatur. In huius decocti iure im-
 buta spongia sedi admoveatur. Porro ubi opus est suppura-
 tione aut discussione, fomenta ex decocto radicis althæ, fœ- Discutien-
 nogræci, chamæmeli, meliloti, & furfurum cōposita adhibe- tia,
 buntur. Si ab ulcere fiat tenesmus, primum abstergēdi facul- Curatio te-
 tate præditis infusis, dein uerò glutinātibus, haud secus quā nesmi ab
 in dysenteria, utendum. Vnguentū præterea hoc sedi inditum ulcere.
 confert. Habet autē olei rosacei ꝑ 1. f. lenti cremoris tragacā Vnguentū
 thæ, gummi, utriusq; ꝑ 3. cerusæ, plumbi usti, utriusque ꝑ 1.
 aloës, thuris, utriusq; ꝑ 1. ceræ quod satis est, fingatur un-
 guentum, quo linamenta imbuta sedi indātur. Si dolor immē-
 sus admodum fuerit, prædictis opij ꝑ 1. adijci potest. Si à A stercoris
 stercoris multitudine oriatur tenesmus, tum initio clysteri- copia,
 bus mitioribus ac lenientibus paulatim stercora educi debēt,
 cuiusmodi est hoc quod accipit: Maluæ, althæ, mercurialis, Clyster.
 betæ, foliorum uiolæ nigræ, singul. m. i. seminis fœnogræci,
 lini, utriusq; ꝑ 1. ebulliant omnia in aqua sufficiēti ad tertias.
 Dein accipe iuris decocti lib. i. medullæ casie fistularis ꝑ 1. f.
 olei uulgaris ꝑ 3. salis triti ꝑ 1. fiat clyster. Insuper hoc unicē
 cauendum erit, ne purgantia medicamenta deuoranda exhi-
 beantur, quod inde summū ægrotanti exitiū immineat, attra-
 ctis nimirum aliunde & ex uniuerso corpore ad priorē ster-
 corum

corum copiam excrementis, ut fufius alibi docuimus.

De coli doloribus. Cap. XVII.

Cauſe.

Signa.
Crassi hu-
moris.

Acris &
erodentis.

Dolor qui in laxiore intestino, quod colon Græcè uocatur, accidit, multas, quatuor uerò præcipuas causas obtinet. Interdum enim propter crassos ac pituitosos humores intra coli membranas subsidentes oritur. Interdum etiã ob flatulentos spiritus, quibus non est exitus. Fit quoq; propter inflammationē, intestinum crassum distendentē, ac molestantē. Solet etiam accidere ob acres, & erodentes humores, qui intestinū prædictum uehementius affligūt. Quibus crassus & pituitosus humor dolorē excitat, hi per totū abdomē in alto excruciantur, præsertim ubi coli situs est, ibi enim quasi tundi & perforari intestinū sentiunt. Tormina quoq; hos affligūt, ructus nausea, uomitio uaria potissimū pituitæ. Aluius grauitè impedita nihil reddit, ac ne spiritū quidē trāsmittit. Stercus autē quādoq; excretū, bouino simile uidetur, leue & flatus plenū. Præcedit hos quā maxime frigidorū & crassi succi ciborum assiduus usus, satietas, cruditas, ociū, & ijs finitima. Qui autē ex flatulento spiritu dolent, tensionem magis experiuntur. Qui autē propter inflammationē, ijs interni feruoris sensus accidit, & febris nō ignaua, urinæ deniq; simul & stercoris retentio, pulsus quoq; iuxta uentrē molestat, sitis, æstus, nausea, & uomitiones bilis potissimum, quæ nihil leuāt malum. Hæc q; simpliciter inter colicas affectiones grauiſſima est, quæ in ileum transitionem minatur. Quibus acres rodentesq; humores dolorē mouēt, sicut etiã qui inflammationē experiuntur, os ardor, sitis & uigilia torquēt, imò & febricule, sed minus quā illos. Urina redditur acris, & biliosa deijciuntur. Sæpius autem alui deiectione maiorem excitat cruciatum, grauiusq; irritant calidiores cibi potusq;

potusq; assumpti. Quo uerò pacto coli & renum dolores discernendi sint, docet copiose Gal. lib. 6. De patien. locis ca. 2. ad eum itaq; locum lectorē ablegamus. Victus ac curandi ratio pro causarum diuersitate uariatur. Quum itaq; crassi ac lenti humores doloris causa existūt, uictus uniuersa ratio extenuans sit. Panis igitur quo uestitur ager, recēs ac in cli-
 bano aut furno probè coctus sit. Carnes cōueniūt in primis uolucrum, gallinæ nimirū, perdicum, palumborū, turturū, turdorum, & columbarum. Fugiēda omnia uolucrum generas, quæ in aquis degunt, tanquā ea quæ superfluitatibus multis abundēt. Ex quadrupedum animantiū genere conueniunt carnes uitulinæ, & hœdinæ. Legumina omnia uitanda, quod huic malo mirificè incommodent. In olerum genere utendū foeniculo, apio, asparago, & similibus. Allia quoq; cruda, & cepas assumere haud nocebit. Quid multa? alimenta sint cōcoctu facilia, & boni succi, atq; satietas & cruditas uitetur. Bibendum uinum subadstringens, album, tenue, pellucidum, mediocri ætate, temperatura dilutiore, bibaturq; modicè. Quod uerò ad curandi rationem attinet, medendum sic, ut non uehemēter calefaciamus: quippe ab huiusmodi præsidijs disfunduntur & inflantur omnes frigidi & crassi humores, qui intestina distendēdo, dolores uehementiores efficiunt. Cōuenit itaq; eos diffecare & concoquere citra uehementē calorem, & per usum eorum quæ minimè inflant. In exacerbationibus igitur irrigationes fiant ex oleo rutaceo, chamæmelino, & anethino. Fomenta item, & sacculi è floribus chamæmeli, anethi, meliloti, seminib; lini, fœnogræci, althææ, milio, & furfuribus. Mirificè quoq; conducunt clysteres ex oleis iam cōmemoratis, & prædictarum herbarū decocto, aut radicis cucumis syluestris, adiectis cumino, uel ruta cum adipe anserino uel gallinaceo, in eum quidē modum parati.

Victus co-
lici dolo-
ris à crasis
& pituito-
sis humo-
ribus.

Curatio
eiusdem.

Mal

- Cyfter.** Maluæ, altheæ, chamæmeli, mercurialis anethi, singul. m̄. i. origani, calaminthæ, pulegij, singu. m̄. f. seminum lini, sæno- græci, cumini, smyrnij, singul. 3 i. decoquatur singula in aqua fontana iustæ quâtitatis ad tertias. Deim accipe iuris decocti per colū transfusi lib. i. hieræ picræ ꝑ. f. benedictæ laxatiuæ 3 s. cōpositionis indi 3 i. f. mellis rosacci colati ꝑ. f. oleorum chamæmelini, anethini, rutæci, utriusq; ꝑ. i. lutea oui duo nu- mero, salis cōmuns 3 i. cōmixtis omnibus fiat enema. Glan- dium etiā admotiones, illitionesq; sedis è succo cyclamini cū melle & nitro, uel centaurio minore cū melle ac nitro pro- sunt. Exemplū glandiū est hoc : accipe mellis cocti ꝑ. i. f. spe- cierum hieræ picræ 3 i. colocynthidos 3 i. salis fossilis 3 f. commisceantur & fingantur glandes oblongæ. Vomitus etiā ante cœnā, si quis facile uomat, præ omnibus auxiliatur. Por- rò ubi dolores, facta iam uacuatione, ad plures dies produ- cūtur, in soliū olei calidi: aut si hoc haberi haud queat, in hy- dreleum descendere alienum non est. Inseffus quoq; utilis ex decocto altheæ, pulegij, foliorum lauri, sænogræci, chamæ- meli, artemisiæ, anethi, & similium. Cōuenientissimum uerò ad colicos medicamentū, uinū absinthites, existit, si præliba- tione à balneo indigēt. Estq; etiā nō sitiētibus ualde cōmodū. Decoctum quoq; herbæ ipsius, ubi semel tantum ebullierit, pari ad uinum quod alijs pro consuetudine bibunt, admixtū, Castoreū, utiliter à balneo præbetur. Castoreum deniq; assiduè potatū, malum prorsus demolitur, omnibusq; medicamētis præstat. Datur egrotantibus drachma una in tribus aquæ mulsæ cyathis. Quòd si dolor non conquieuerit, propinandum erit medicamentum diatrionpipereon, uel theriaca. Si uerò dolor est uehemens, mediocriter lenientibus ac mitigantibus uti cō- uenit medicamentis infernè inditis, aut potis. Nam quæ ua- lenter stupefaciunt uitare oportet, quod paulisper quidem leniant

leniant, sed diuturniorē affectum faciant, dum humores cras-
 iores reddunt, meatusq; intestini cōdensant. Anodynis itaq;
 propriè uocatis medicamentis, quorum aliqua initio huius
 capitis dicta sunt, iterum utendum. Porro si flatulentus spi- Curatio do-
 ritus doloris causa fuerit, clysteres qui flatus discutere pos- loris colici
 sunt iniiciendi, qualis est qui accipit: Abrotoni, origani, pu- à flatulen-
 legij, calaminthæ, chamæmeli, singul. m̃. i. rutæ, mentæ, men- tis spiriti-
 tæstri, singul. m̃. f. seminum anisi, fœniculi, carei, cumini, ane- bus.
 thi, smyrnij, dauci, singul. 3 2. coquantur omnia ad tertias, Clyster.
 dein accipiat iuris decocti colati lib. 1. hieræ, picræ, bene-
 dictæ laxatiuæ, utriusq; ʒ. f. castorei 3 1. specierum diacumini
 3 2. oleorum rutacei, anethini, utriusq; ʒ. 1. f. salis communis
 3 1. f. commixtis omnibus fiat clyster. Potest etiam prædictis Composi-
 addi compositio de baccis lauri appellata, qua ad discutien- tio de bac-
 dos flatuosos spiritus nihil est efficacius. Proderit quoq; eius cis lauri.
 compositionis quantitatem nucis auellanae in decocto aliquo
 incidentium & extenuantium medicamentorum indies pro-
 pinare. Extrinsecus autem abdomen ijs quæ flatus dissipant Flatus di-
 fouendum & irrigandum erit, cuiusmodi sunt, præter ea quæ scutientia.
 paulò antè diximus, nigella, ammi, oreoselinum, amygdale
 amaræ, piper nigrum, mentastrum, baccæ lauri, absinthium,
 semen urticae, acorus, maiorana, cinnamomum, & alia quæ li-
 bro primo De compositione medicamentorum commemo-
 rauimus. Ex ijs itaq; cataplasmata, fomēta, aut sacculos pa- Cucurbitæ
 rabis. Quod uerò omnia reliqua uincit, & incantamenti cu- appositio.
 iusdam simile quid efficit, Gal. lib. 12. The. meth. cap. ultimo
 teste, est cucurbita maxima leuis cum copiosa flāma toti ab-
 domini affixa. Aeger etiam à diluti uini, & frigida aque po- Victus,
 tu, lactis & aliorum refrigerantium, ac flatuosos spiritus
 gignentium alimentorū usu, sibi caueat. At uini potius me-
 racioris potu, uictusq; ratione reliqua calefaciēte ac incidēte

Colici doloris ab inflammatione curatio. utatur. Præterea inflammatione intestinum exercente, uena in cubito aperienda est. Si uero urinae difficultas superet ac dominetur, ex malleolo sanguis detrahendus erit. Prædictis etiã utendum remedijs, exceptis acribus, & uehementer purgantibus. Clysteribus uero potius lenientibus, item cataplasmatibus, & irrigationibus & in oleũ descẽsu utendũ. Cucurbitulas etiã ijs affigimus. Viſcus autẽ ratio tenuis sit, & ferẽ febricitantiũ, donec inflammatiõ soluatur. Atqui si propter acres rodẽtesq; humores dolitãt ægri, per sedẽ infundere cõuenit ea quæ humores eluere, atq; citra mordacitatẽ purgare possunt: cuiusmodi est ptisana succus, aut decoctum scœnogræci, seminis lini, chamæmeli & althææ, cum adipe recenti anseris uel gallinæ, & rosaceo oleo. Conuenit autem hoc potissimum enema, quod habet: Foliorum uiolæ, intubi domestici utriusq; foliorũ althææ, chamæmeli, singul. m. i. f. seminũ scœnogræci, lini utriusq; ʒ i. bulliãt in aqua iustæ quãtitatis, donec tertia pars absumpta fuerit. Dein accipe iuris decocti colo transfusi ʒ i. casia fistularis ʒ i. hieræ picræ ʒ 6. olei rosacei ʒ 2. olei anethimi ʒ i. pinguedinis anseris, gallinæ, utriusq; ʒ 3. uitellos oui numero 2. Cõmixtis omnibus fiat clyster. Porro non solum euacuare, uerum etiam temperare in festinantem humorem oportet. Quapropter balneis ex dulci aqua utendum: ea enim mitigare, & somnũ conciliare possunt. In quem etiã usum exhibenda scrapia uiolaceum & rosaceum, aliãq; eiusmodi, quæ contẽperare, ac uim mordaciũ humorũ obtundere ualent. Utendũ etiã cibo sorbili, ptisana nimirum, ac piscibus saxatilibus. Abstinentũ acribus omnibus & calidis tum cibis, tum medicamentis, fomẽtis, irrigationibus, cataplasmatibus calẽtib; necnõ uini potione, potissimũ ueteris. Et ut rem omnem paucis perstringã, tota uiscus ratio humidior & frigidior sit. Quum autem dolor nihil remiserit, sed uehe

Stupefactio.

uehementius subinde ſeuiet, ad ſtupefacientium uſum conſugere oportet. In hoc enim malo, nō ſolum quod ſenſum ſtupefaciunt, ſed & quia humores tenues craſſiores reddūt, caloremq; immodicum extingūūt, opitulantur. In horum uerō genere Philonium potiſſimum cōuenit, de quo integrā magna ex parte drachmā exhibere licebit. Catapotia quoq; de cynogloſſo inſcripta mirificè cōducunt, ſi, ut antea etiā monſtratum eſt, ex una drachma ſex cōficiūtur pilule, unaq; ante cubitum deuoratur. Ceterum multa admodum ſunt, quæ à tota eſſentia colicis auxiliātur cruciatibus. Inter quæ nō poſtremum locum obtinet lupi ſtercus album, ex aqua, aut uino albo tenui ſumptum. Melius autem ſtercus cenſetur, quod in terram non delabitur, ſed in fruticem aut herbam excernitur. Ea enim eſt luporum natura, quæ canum, ut ſuſpenſo altero poſteriorum crurum & meiant & cacent, in eminenti quopiam ex terra. Itaq; in ſpinis ſæpe aſtate ſtercus lupinum reperitur, & fruticibus, uepribus, herbisq; procerioribus. Amuleti etiam inſtar colicos dolores iuuat idem ſtercus lupi, illiſq; alligatum. Quòd Galenus etiam uerum eſſe experientia cognouit. Menta uiridis, Aëtio lib. 9. cap. 31. autore, aliquando diu decocta, & ad tres dies pota, dolorem prorſus è medio tollit. Plura alia eodem in loco reperiēs.

Philoniū.

Catapotia de cynogloſſo.

Quæ à tota ſubſtantia conſeſcunt colicis doloribus.

Menta uiridis.

De ileo. Cap. XVIII.

Eileum malum eſt tenuium inteſtinorum, grauiſſimos & letales dolores inferens. Sic dictum à doloris circūſcriptione. Εἰλεῖται enim Græcis eſt circūuolui, & circumagi. Quare rectè Latinis uoluulus & cōuoluulus appellatur. Barbaram ſeſtantes medicinam, Iliacam paſſionē nomināt. Contrahitur id uitij continua ciborū corruptione ac cruditate, maximè uerò ex pinguibus carnibus, quæ ſubinde corru-

Voluulus, Iliaca. Cauſæ.

ptionem expertæ & retentæ, obstructionē in tenui intestino creant. Oboritur etiam ex plagis & ictibus quibusdā ijs locis, in quibus tenue est situm intestinum, factis. Item ex frigore uehementi constringente, ac excrementa retinente. Ex accruata præterea frigida potione, maximè si à sudantibus plurimum accipiatur. Cōtingit & ijs quibus intestinum in scrotum unā cum stercore delapsum est, indeq; uiolenter retrusum, ex eoq; inflammatum existit. Fit quoq; ob letalium medicamentorū potū, & propter induratū stercus, circa tenue intestinum impactū. Magna uerò ex parte uel ab inflammatione, uel obstructione aridi stercoris, malum hoc oritur.

Quibus malum hoc familiare sit. Signa.

Chordapson.

Familiares quidem est hoc malum pueris, euadunt tamen naturalis humiditatis beneficio. Senibus nō admodum accidere solet, si tamē eo tententur, ferè nunquā cōualescunt. Accedit sanè hoc malo correptis dolor uehementissimus, & tumor aliquis in tenui intestini parte eminet, ut uideatur id ipsum ad chordæ similitudinē cōuolutum: unde etiam Chordapson nonnulli id genus mali appellauerunt. Adest etiā stomachi nimia humectatio, exolutio, ructus inanes, & nihil aleuantes, murmura intestinorum, cohibitio perfecta stercoris & flatuum. Si malum intendatur, omnia sursum feruntur: ob idq; & uomitus pituitæ ac bilis accedit, frigiditas totius corporis, dolorq; plurimis etiā spiradi difficultas. Morituris autē amplius sudor frigidus, urinae difficultas, podex ita adstrictus, ut neq; specilli extremū suscipere possit. Aliquando & stercus uomitu reijcitur. Quod ad curandi rationem attinet, pueros quidē irrigationibus, cataplasmatibus, clysteribus, glandibus, & fomētis, sicut in capite de coli doloribus est cōprehensum, curare oportet. Adultis uerò p causarum diuersitate medendū. Si igitur à cruditatibus, ac multisuarijsq; cibis ingestis, qui uentriculo adhuc insident, malum accedit,

Si à cruditatibus accidat.

accidit, uomitus cum ijs quæ suprà dicta sunt concitandus erit. Si uerò nihil crudorum ciborum in uentriculo cõtineatur, omni conatu enitendum, quo tum flatus tum stercora infra trahantur: idq; per clysteres, glandes, & illitiones, magna in singulis adhibita diligentia efficiendũ. Quare potest in iyci clyster eiusmodi, qui accipit: Mercurialis, ruta, foliorum Clyster. altheæ, cõtaurij minoris, singu. m. i. hyssopi, calaminthæ, absinthij, singu. m. i. f. radice altheæ 3 i. radice cucumeris syluestris 3 i. f. seminum lini, fœnogræci, utriusq; 3 3. seminis cumini 3 2. ebulliant in aqua iustæ quantitatis, donec tertia eius pars absumpta fuerit. Dein accipe iuris decocti colati 3 14. benedictæ laxatiuæ, ut uocant, 3 i. butyri recentis, mellis rosacei colo transfusi, utriusq; 3 f. oleorum rutacei, anethini, utriusq; 3 i. f. salis uulgaris 3 i. cõmixtis omnibus fiat clyster, qui ante cibum infundatur, malo autẽ urgẽte à cibo etiã. Præcipiendumq; ut quandiu quidẽ queant hunc ægrotantes retineant. Glandes quemadmodum in coli doloribus parandæ, adiectis semine rutæ, cumino, & brassicæ caulibus. Glandes. Longiusculas quoq; facere oportet, ut profundius penetrare possint. Præterea cyclamini succo, aut melle cum nitro podex Illitiones. illinendus. Cataplasmata & fomenta quibus hoc malum curatur, serè sunt talia, qualia in capite de coli doloribus dicta sunt. Conueniunt autẽ maximè fomenta ex lanis, oleo, in quo Fomenta. cuminum, anethum, ruta & nasturtium decocta sint, madefactis. Cataplasmata uerò ex semine lini, fœnogræco, farina Cataplasmata. hordeacea, loliacea, ruta, cumino, anethi semine & apij. In solium quoq; aqua & oleo refertum descendere conuenit: in aqua uerò althea, ruta, & anethum decoquantur. Post hæc Cucurbitulae. cucurbitulæ affigantur, primum quidem ad remotos locos, leues deinde ad ipsos etiam dolore affectos, scarificationesq; profundiores fiant. Purgationes etiam assumere conuenit, Purgatio,

potissimum si prius per ea quæ dicta sunt stercora ad inferiora tracta fuerint. Mirificè ipsis conducit, si uomuerint, anethum coctum, potumq; . A potu uerò panem in aquam feruentem conijce, eiusq; frustra calida confestim edenda præbè. Qui ex ueneno medicamento in ileon inciderunt, ijs aqua tepida multa bibenda detur, uomereq; cogendi. Deinde oleum calidum in potu dandum, aut pingua iura, ut rursus uomant. Postea diebus aliquot interpositis, theriace, cum uino dissoluta, detur. Cibis uescantur boni succi. Quòd si obstructio perseverauerit, aluus lacte scisso cum modico scammonie, uel aloës, uel alio quodam purgante medicamēto innanienda erit. Si ab inflammatione ileos orta fuerit, à uenæ sectione auspicandum erit, deinde cucurbita inflammationis partibus per ambitum scarificatis affigenda. Clysteres etiam ex decocto maluæ, scenogræci, seminis lini, cum oleo & butyro iniiciendi. Extrinsecus quoque ea quæ inflammationibus conducunt, & dolorem leniunt, apponenda.

Si ex delapsu intestini in scrotum, His etiam tenuissima uictus ratio præscribenda. Si ex intestini in scrotum delapsu ileos accadat, confestim tentandum est, ut decubitu sursum uersus uergente adornato, delapsum intestinum ad inguinum partes retrudatur, atque leniter citra uiolentiam ac compressionem, ligatura facia ue adhibita contineatur.

De lumbricis. Cap. XIX.

Tres lumbricorum differentie.

Teretes.

Lumbricorum, quos Græci ἐλμυνθας uocant, tres sunt in uniuersum differentie. Prima teretum seu rotundorum, altera latorum, tertia eorum quos ascaridas nominant.

Teretes lumbrici speciem habent omnibus perspicuam: secundum enim crassitudinem rotundi sunt, longitudine uerò palmares, & aliquando longiores, alijsq; sunt frequentiores.

Græcis

Græcis ἑλμινθὶδες σφογγύλαι nominantur. In gracilibus plerunq; intestinis consistunt, & uentriculum subeunt, ideoq; crebrò per os reiiciuntur: quibusdā etiam è naribus redduntur. Atq; hoc genus infantibus & pueris, atq; ijs qui ad pubertatem accedunt, peculiare est. Lati, qui à Græcis κείραι & ταινίαι, quòd scilicet instar institarum & fasciarū sint lati & longi, appellātur. Incredibilis uerò longitudinis sunt, ut Plinio lib. 11. c. 33. teste, tricenum aliquando pedum uisæ sint, aliquando etiā plurium. Nihil autem est latus lumbricus, Paulò & Aëtio autoribus, nisi permutatio intrinsecus tenuia ambienti intestina membranæ, in corpus quoddam uiuum, & animalis modo mobile. Ασκαρίδες tenues ac breues, uermibusq; similes lumbrici sunt. In recto intestino, & in extremo ani magna ex parte reperiuntur. Omnium generum origo est ex cruda, crassa pituitosaq; materia, & putredini accommoda, qualis in pueris maximè & alijs uoracibus colligitur. Eos qui rotundos lūbricos habet, sequitur incredibilis intestinorū & uentriculi morsus, tussiculæ tenues & exiguae, ac frequenter irritantes & siccæ. Nonnullos comitatur singultus, & somnus cum palpitatione, ij etiā præter rationem exurgunt. Nonnulli & cum clamore expergefiūt & profiliunt, & iterum sopiuntur. Quidam uerò & linguam exerunt, oculosq; claudunt, ac taciturni sunt, excitantibusq; indignantur, quòd scilicet ob imbecillitatē uigilare nequeāt. Quidam autem oculos sanguine suffusos habent, & pulsus inæqualē, obscurum, deficientem & recurrentem. Nonnullis quoque appetentiæ amissio accedit. Pueris dum dormiunt manducatio linguæ, cui accedit conformatio oris in modum lactentium, aut accipientium cibum. Aliquibus etiam dentium stridor accidit. Verùm hæc paulatim, & ex interuallis sunt. Quibusdam ad stomachum procurrunt,

Teretes q
bus familia
res.

Lati.

Latus lū
bricus qd.

Ascarides.

Causæ.

Signa ro
tundotum.

nauscarumq; & erosionum causæ fiunt, & laborantes cibum respuunt. Compulsi enim ad cibum nauscabundi, uix quod assumitur deglutiunt, uel etiam reuomunt. Plerisq; uerò aluus cibos corruptos deijcit, & tympani modo inflatur: reliquum uero corpus sine ratione contabescit, neque inedia præcedente, neque immodica euacuatione facta. Contingit etiam aliquando faciem fieri rubicundam, maximè circa malas: uerum color hic rursus in luorem transit. Alij instar delirantium absurda in somnis loquuntur. Alij decubitus trāsmutant, & ex loco ad locum sese uicissim proijciunt. Febres in eis sine ordine augescunt, cum uehementi extremarū partium refrigeratione, tertiam interim quartam, die uel nocte sine ratione accessionem habentes. Ceterum nō in omnibus omnium quæ nunc commemorauimus signa sunt singulatim inquirenda, sed quæ reliquis præpollent, ac principium te-

Signa latum.

nent: aliquādo etiā plurima. Lati lumbrici continuos stomachi morsus inferunt, & ad cibos impotentem & incorrigibilem appetentiam. Nam quod animal euasit in intestinis: obiectū rapit alimentū, ut alio statim opus sit, & nisi assumpserint, intestina rodantur. Eos qui sic patiūtur, consequitur corporis gracilitas & imbecillitas cū inæqualitate. Infallibile autē ac certissimū indicium, si cum recrementis quedam

Signa ascaridum.

semini cucurbitæ similia excernantur. Ascarides uehementē in ano pruritū excitant, assidueq; ad egerendum irritant. Et qui hoc malo afficiuntur, ut plurimum ab excretionē melius

Victus ratio.

habent. Victus ratio calida & sicca sit, potissimum si febre ægrotantes uacauerint, cibisq; utantur probi succi, & qui facile in totum corpus distribuuntur, nec lumbricorum effricem causam adaugeant. Quare omnia quæ pituitosos humores procreare possunt alimenta fugienda. Præterea qui lumbricorum malo affliguntur, liberalius sunt nutriendi. famemq;

memq; minimè ferant: quòd lumbrici, nisi cibum habeant què absumant, statim subinde solida corpora arrodant. Dabitur uerò tum præcipuè cibus, quum nò prorsus inaniti fuerint. Vinum bibant aquosum. Porro curandi ratio non differenda, & interdum simul febris, si adest, & lumbricorum habere curam: interdum autem parum de febre sollicitos esse oportet, ac studiosè lumbricos de corpore eximere. Quare cum multi hoc ipsum non animaduverterint, factum est ut nulla lumbricorum ratione habita, corrosi ab iisdem sint, & còuulsi interierint. Curatio uerò tam rotundorum quàm latorum in hoc consistit, ut hos prius occisos, expellamus.

Occiduntur autem amaris maximè medicamentis, inter quæ ubi febris abest simpliciora hæc sunt absinthium, seriphium, abrotonum, calamintha, marrubium, dictamnus, hyssopus, ruta, folia persicæ, coriandri semen, cornu ceruinum, lupini, menta, pulegium, origanum, centaurei minus, filix, gentiana, aristolochia rotunda, allia, brassicæ semen, & helenij radix. Simplicia
medicamē-
ta lūbricos
necantia,

His si febris adest inungenda sunt intubi utriusque semina, itemq; earundem herbarum succi, myxariaq;. Inter omnia autem laudatissimum est remedium aloë. Quia uerò infantes aloën grauitèr propter suam amaritudinem admittunt, sum- Aloe.

pinis fasciola ipsis detentis, ore adaperto ac diducto, i per fistulam quandam ualido munitam canali, inuitis illam niſcimus. Ex nunc autem comprehensis simplicibus medicamentis, Cōposita,

uaria composita effici possunt, nimirum decocta, pulueres, cataplasmata, emplastra & unguenta. Inter reliqua uerò is puluis unicè cōfert, qui habet: Seminis fantonici, quod lum- Puluis,
bricorū uocāt, ʒ 1. centaurei minoris, absinthij, cornu ceruini
usti, singul. ʒ 1. calaminthæ, pulegij, origani, singul. ʒ ʒ. abro-
toni, mentæ, lupinorum, foliorum aristolochiæ rotundæ, sin-
gu. ʒ 1. aloës ʒ 2. cōmixtis omnibus fingatur puluis, de quo

detur pondus drachmæ unius, aut semis, pro ætatis & habitus corporis ratione in lacte, aut melle, aut serapio è dulci

Lūbricos enecātia cū quibus pro pinanda. Vuguentū radice. Nam debent ea quæ lumbricos enecant, cum dulcibus liquoribus propinari, quo citius medicamenta dulcedine illa allekti lumbrici amplectantur. Extrinsecus etiam umbilicus felle taurino, aut hoc unguento illinendus, quod accipit:

Olei amygdalarum amararum, & absinthitis, utriusq; ʒ 1. fellis taurini ʒ ʒ. centaurij minoris, absinthij, lupinorum, singul. ʒ 2. foliorum persicæ, cornu ceruini usti, aloës, abrotoni, singul. ʒ 1. ceræ quod satis est, fiat unguentum. Aut im-

Ceratum. natur regioni totius uetriculi hoc ceratū, quod habet: Aloës, absinthij, farinæ lupinorum, singul. ʒ 2. nigellæ, mētæ, origani, pulegij, marrubij, singul. ʒ 1. centaurij minoris, calaminthæ, utriusq; ʒ ʒ. olei absinthitis, & amygdalarum amararū, utriusq; ʒ 2. olei costini ʒ 1. fellis taurini ʒ ʒ. cum cera & resina quantum sufficit, fiat ceratum. Ad eorundē exempla facile quispiam emplastra & cataplasmata componet, ita ut necessarium non sit singulorum formulas adscribere. Porro ab inferioribus etiā partibus mulsam iniicere copiosiore expedit, quo lūbrici mellis dulcedine illecti, deorsum repant.

Enecati lūbrici ut expellendi. Enecatos uerò per prædicta medicamenta lumbricos, citra dilationē expellere oportet. Vitiosa ex ipsis exhalatio pro-

Catapotia. cedit, quæ & appetitum deijcit, concoctionēq; ledit, sursum etiam delata uertigines, aliaq; mala creat. Expelluntur autem magna ex parte per glandes & per purgantia medicamenta potissimum uerò per hieram picrā, & catapotia pestilentialia, aut Rufi uocata quæ sanè mirā & in enecandis & educendis lumbricis efficaciam obtinēt. Cæterum qui cū lumbricis alui etiam profluuiū instantur, eos fluore inspissando, & cōcoctionem tum per cibos, tum per cataplasmata in melius permutando, curare oportet. Quantum enim pro-

fluuium

fluuium inualefcit, tantum etiā lumbricorum generatio augetur: uiciſſimq; fluxu ceſſante, lumbrici interquieſcunt. Quapropter ſumma diligentia annitendum, ut alius adſtringatur, firmitasq; ei adiſciatur. Propinandus itaq; plantaginis ſuccus, uel ipſa etiam arida plātago aſſumenda: ex æquo enim utriq; & fluori & lūbricis efficax eſt. Cataplaſmata quoque, cerata & unguenta ex cruda hordeacea farina, mālicorio, hypociſthide, & ſimilibus adſtringentibus componenda, adiectis tamen ijs quæ ad lumbricos interimendos idonea ſunt. Cōferūt autē adſtringētia medicamēta extrinſecus admotā hoc etiam nomine, quod uentriculum ex amarorum medicamentorum frequenti uſu læſum, iterum corroborarent. Licebit etiam in hoc caſu uermes terrenos exiccatoſ, & in puluerem redactos, cum hydromelite exhibere. Aſcarides in infantibus educendi ſunt cum glandibus ex melle & ſale paratis. In prouectioribus, aut clyſteribus ex acrimuria, aut decocto abſinthij, centaurij minoris, calamint hæ, lupinorum, pulegij, & aliorum ſuprà commemoratorum, adiectis oleis, paratis. Poſt clyſteres rectum inteſtinum ſimplicibus quidem acatia, hypociſthide, rhoïs ſucco, aut alio adſtringente ſublimendus eſt. Coacta enim ab adſtringentibus caro corroboratur, habilitatemq; ad animalculorum generationem amittit, atque aſcaridas ipſas excludit. Hoc uerò quod ſequitur, & pueris, & qui prouecti ſunt ætatis conducit, efficaciffimumq; exiſtit. Carnem ueterem ſalitam, pinguedine deraſa, ſublongam & rotundam formabimus, atque ita adaptatam podici intrudemus, ligamentoq; adhibito, quā diu ſuſtinere poſſint inditam ſinemus, deinde ſoluemus, ſimulq; aſcarides illi adhærentes educemus. Poſt hæc quæ prædicta ſunt inſundemus, atq; illinemus.

Aſcaridum
curatio,

Remediū
efficaciſſi-
mum,

De hæmorrhoidibus. Cap. XX.

Hæmorrhoides.

Cæcæ.
Apertæ.

Causæ.

Signa.

Curatio
cæcarum.Hæmorrhoides
periclitia.

Aιμορροΐδες Græcis uenarum in sede sunt explicatio-
nes dilatationesq; à crebro sanguinis defluxu sic ap-
pellatæ. Harum quidam aliæ sunt cæcæ, quæ scilicet intume-
scunt, & nihil aut parum admodum sanguinis excernunt. Aliæ
apertæ, quæ nimirum certis quibusdam temporibus pandun-
tur, & sanguinem emittunt. Fiunt autem hæmorrhoides, pro-
pter copiam sanguinis sæculenti & melancholici, quem ie-
cur ad ipsas reponit. Signa per quæ malum deprehenditur, non
admodum requiruntur. Oculis enim conspiciuntur cæcæ, &
dolorem uehementem, potissimum in excernendo stercore,
excitant. Apertæ uero sanguinem fundunt, ideoq; latere agro-
tantes haud possunt. Quum itaq; cæcæ apparuerint hæmor-
rhoïdes, & magnos in ano cruciatus excitauerint, corpusq;
plethoricum fuerit, uel poplitis aut malleoli incidenda erit.
Aluus etiam assatim mollieda erit, ne arida stercore dum ex-
cernuntur, dolorem pariant. Apponenda quoq; ubi uehementis
dolor fuerit, quæ illum mitigare possunt. E' quorū numero
est mica panis in lacte macerata, & cum oui uitello decocta,
ac instar emplastri admota. Prodest etiam solium ex deco-
cto maluæ, folijs uiolæ purpureæ, meliloti, fœnogræci, ca-
mæmeli, althææ folijs, lini semine, uerbasci floribus, & simili-
bus apparatus. Quod si quis eo uti non poterit, lanæ aut
spongæ in decocto iam dicto irrigatæ & madefactæ dolē-
ti loco adhibeantur. Quod si prædicta nihil contulerint,
sanguinem ab ijs elicere oportet. Quapropter cyclamini suc-
cum, aut cepæ, aut fel bubulum lanæ illitum intra anum im-
ponere oportet. Idem etiam potest centaury minoris succus
stercus columbinū, staphys agria, foliū ficus, si cum eo fri-
centur, & medulla colocynthidis in oleo amygdalarum ama-
rarum macerata. Inter reliqua uero alia multa hoc empla-
strum

strum unicè confert, quod habet: Stercoris columbini ꝑ f. se-
 minis staphydis agrie, lupinorū, utriusq; ꝑ i. f. amygdalarū
 amararū ꝑ i. medullæ colocynthidis ꝑ f. succi cyclamini ce-
 pæ, utriusq; ꝑ i. cōmisceātur singula, & ad formā emplastri
 redigantur, adiecto, si opus fuerit, oleo amygdalarū amara-
 rū, Glādes etiā oblongæ ex radice cyclamini paratæ, in anum ^{Glandes.}
 indi possunt. Hirudines quoq; in arundine inclusæ, ita ut ca-
 put dūtaxat exerāt hæmorrhoidibus ut aperiātur, imponi so-
 lent. Has si deinceps amouere haud poteris, cinere illarū ca- ^{Apertarū.}
 piti insperso decidere sua sponte facies. Ceterū si aperte ^{curatio.}
 fuerint, & sanguinē modicè ꝑ certā intervalla fuderint, mi- ^{Si modicè}
 nimè suppressendæ sunt: q̃ huiuscemodi sanguinis eruptio ^{fluant.}
 homines hoc malo detētos à multis alijs morbis tutos reddat.
 Id quòd in primis testatur Hippocrates, qui in Epidemijs ita ^{6. Epid.}
 scriptum reliquit. Habentes hæmorrhoidas neq; laterum do- ^{par.}
 lore, neq; pulmonis inflammatione, neq; depascenti ulcere, ^{3. Aph. 19.}
 neq; furunculis, neq; terminthis, pariter neq; lepra, neq; ul- ^{3.}
 tiligimibis corripuntur. Hæc ille. Quòd si uerò immodicè ac ^{Si immodi-}
 iusto longius sanguinem fundant, sic quod ægri hoc malo cō- ^{cè fluant,}
 tabescant, ac illorum robur deijciatur, suppressendæ conse-
 stim: quòd aliàs periculum sit, ne aqua inter cutem, iecino-
 re propter immodicam euacuationem refrigerato, sequatur.
 Cibis itaq; qui suprā modum inaniuntur, utantur pauci san- ^{Victus.}
 guinis efficacibus, & minimè recrementicijs, quiq; siccant,
 & adstringunt: cuiusmodi est alica & oryza. Ex oleribus
 intubum, cichorium, portulaca, & similia. Cibis rhu obso-
 niorum, aut succus immaturarum uuarum admisceatur. Si
 vires plurimum prosternantur, è carnibus expresso succo, ^{Si vires}
 cui cotoneorum succus permixtus sit, alendus æger erit. Vi- ^{multū de-}
 na bibenda adstringentia. Ceterū quod ad curandi rationē ^{ijciantur.}
 spectat, si plenitudo corporis affuerit, uenæ interioris in cu- ^{Si plenitudo}
 bito ^{adadur.}

bito dextrae manus sectio proderit. Sin minus, auersioni per cucurbitulas hypochondrijs & iecinori affixas studendū. In quē usum manibus & brachijs etiā uincula iniicere, & frictiones asperas adhibere conuenit. Præterea intra corpus assumēda erunt ea quæ adstringūt, ut est serapium rosaceū, myrtinum, cotoneorumq; corallia rubea, bolus armenia, passilli de succino, è spodio, de terra lemnia, & alia quæ in capite De cruento sputo sunt cōmemorata. Extrinsecus etiam ea apponenda, quæ sanguinē promanantem sistere possunt. E' quorū numero, Actio etiam ipso lib. 14. cap. 5. autore, aloē existit, cum posca imposita. Idem quoq; potest squama ferri, aut plumbum ustum. Vnicē autē cōfert medicamētum, quod describitur à Galeno lib. 5. Ther. method. & accipit: Thuris partē unam, aloēs partis unius semissim. Hæc cum oui candido donec ad mellis crassitudinē redeant subigūtur, & molissimo leporis pilo excepta uasis sanguinem effundentibus imponuntur, fascia ex tenui linteo forinsecus alligata. Proderunt quoq; unguenta, balnea, infusiones, fomenta, & alia huius generis ex medicamentis adstringendi uiribus prædictis cōposita: quorū sanē multa suprā in capitibus De diarrhoea, liēteria, dysenteria et tencismo diximus. Quòd si sacculorū usus erit, præstat eos in uino rubeo et adstringēte, priusquā admoueātur, bullire, aut saltē irrigare. Reliquæ medicamentorū formulæ ex capitibus nunc citatis petantur.

De procidentia ani. Cap. XXI.

Causæ.

Accidit interdum ut propter resolutionē aut imbecillitatem musculorum obliquorum sedē sursum reuelentū, anus procidat. Quare cū à prædictis nūc musculis annus retrahi ac sursum euelli nō queat, fit ut manibus aut medicamētis opem ferētibus egeat. Quū uerò prociderit anus, diligen

Curatio.
Sinulla sit
inflamatio,

diligenter cōsiderandum erit num ab inflammatione liber sit nec ne: si enim nulla inflammatione occupetur, statim impulsus in pristinū locum protrudi, ac reponi debet. Ne autē intrusus ac in locū suum repositus iterū excidat, adstringentia extrinsecus medicamēta apponenda sunt. Primum itaq; oleo Adstringētia. rosaceo calente circūlinendus, aut uino adstringēte detergēdus anus, ac subinde in suum locū repositus deligandus erit. Idq; statim simulatq; æger excreuit faciendū, ne cū ipsum ad egerendum iterum necessitas urget, denuo procidat. Linimētū. Linimentum autem ex acatia & hypocisthide cum uino adhibendum. Incoquenda quoque in aqua donec rubescat, galla, balauſtium, glandium calyces, malicorium, bellis minor, rhuobsoniorum, cortices cotoneorum, & similia, ac deinde ex eiusmodi decocto infusus & ablutiones parētur. Postquā uerò uino aut decocto adstringente sedes abluta fuerit, tum arida admouere ac inspergere medicamenta licebit. In quem usum bolus armenia, thus, sanguis draconis, galla, acatia, myrrha, hypocisthis, cornu ceruinum, & eius generis adstringentia medicamenta, de quibus iam sēpē dictum est, adhiberi possunt. Quod si uerò propter inflammationem anus in tumorem elatus impelli & reponi nequeat, ubi plenitudo fuerit, uena primum secanda erit, uomitusq; ciendus. Sedi etiam apponenda quæ adstringunt & reprimunt, sed statim inter initia. Si uerò nulla adsit plenitudo, æger in seſſione utatur ex decocto chamæmeli, maluæ, alibæ, seminibus lini, scœnogræci, & similibus concinnata. Aut in aquā calidam conscendat, & illic ad tempus immoretur. Spongiā quoq; aut lanam in decocto prædicto madefactā admouere licebit. Anus denique oleis chamæmelino & anethimo, quousque reponi possit, illinendus. Promptē autem cū illis insit discutiendis tumorem auferunt, atq; adeo ut reponi nulla difficultate possint,

possint, efficiūt. Postquā uerò iam reconditus est, tunc suprà commemoratis medicamentis adstringētibus, ne scilicet iterum procidat, utendum erit.

Derimisani. Caput XXII.

ῥαγάδες **σφιγκτηρί** **R**imæ sedis, quas Græcis ῥαγάδες uocant, sunt scissuræ, quæ in musculo anum claudente, σφιγκτηρίæ nominant, aut in circulo, & extrema ani corona fiunt, similes ijs
Causæ. quæ in labijs ob Boreæ flatum asperiores accidunt. Euenire solent propter acrium humorum defluxū, aut inflammationē,
Condylomata. aut condylomatum extensionē. Sunt autē condylomata, rugæ seu eminentiæ quedam in ano, reduplicatis eius corpusculis,
Signa. præter naturam insurgentes. Malum ipsum oculis obuiū est, ideoq; notis non indiget quæ in eius nos cognitionē ducant.
Curatio Quod quidē ad curandi rationē attinet, si rhagades ab acribus humoribus oriuntur, tum ij omnium primum purgandi ac comtemperandi erunt. Si uerò propter condylomata acciderint, itidem purgantibus medicamentis inter initia utendū erit. Alius etiā toto curationis tempore cibis humectantibus & pinguibus mollienda, ne ari lū sterco cōglutinationē remoretur. Huius autē generis sunt maluæ, spinachia, lac amygdalarum dulcium, oua sorbilia, iuscula pinguia, & id genus
Unguentū alia. Ceterum rimis ipsis hoc adhibendū unguentū, quod habet: Olei rosacei, myrtini, utriusq; ꝛ i. thuris, mastiches, lithargyri, sanguinis draconis, singul. ꝛ i. aloës, plumbi usti, cerussæ, balaustiorum, boli armenia, singul. ꝛ i. ceræ albæ quod satis est, fiat unguentū. Aut tale quod accipit: Olei rosacei ꝛ i. f. gallæ, myrrhæ, terræ lemnia, singul. ꝛ i. radicis symphyti maioris, aluminis scissilis, plumbi usti, singul. ꝛ i. oui affati uitellum, ceræ quod satis est, formetur unguentum. Iam commemoratis unguentis ter die rimas circumungere oportet,

oportet, lotas prius decocto rosarū, gallarum & fidiorum. Quòd si locum malè affectum ardor & inflāmatio affligat, Si inflāmatio addit, unguento candido, caphurato hodie uocato, illinendus erit.

De imbecillitate iecinoris. Cap. XXIII.

Imbecillitas iecinoris ab intemperie ipsa producitur ^{Causæ.} calida, frigida, humida, uel sicca. Calida intemperies tum eos ^{Intēperies calida.} qui prius adsunt humores, tum hos etiā qui per uenas mesenterij ad ipsum iecur feruntur, adassat, & ueluti cōburit. Frigida uerò intemperies pituitosum, & crudum humorē qui iam in iecore continetur, crassum & lentum agrēq; mobilē reddit: eum uerò qui ad ipsum defertur, semicoctum relinquit. Ceterum sicca intemperies sicciores & densiores humores facit. Humida autē tenuiores & magis aquosos. ^{Sicca.} ^{Humida.} ^{Hepatici qui.} ^{Signa calidæ intemperiei,} ^{Frigidæ.} Qui itaq; facultates & uires iecinoris habent imbecillas, ij hepatici uocātur, ut testatur Ga. lib. 5. De patiē. locis cap. 7. Calida autē intēperie iecur occupante, colliquationes fiunt, primum quidē humorum, deinde carnis etiā ipsius iecinoris, & bilis foetens & crassa per uentrē euacuatur: abundeq; colorata, febris urget, cibi fastidium, & uomitus biliosus. Sitis deniq; insestat, urina est rufa, pulsus celer. Vbi uerò frigida intēperies, adfuerit neq; assiduæ excretiones, neq; multæ fiunt: quippe malū lōgius plōgatur, et certis diebus uēter cumulatius pfluat: sed quæ egeruntur minus foetida sunt ijs quæ per calorē sunt collicata, neq; colorē etiā, neq; consistentiam, sed speciem præ se ferunt sanguinis putrefacti, et in grumos coacti. Et si quis diligēter cōsideret, neq; sanguis niger est, neq; grumus, sed ueluti limus & fex quedā sanguinis crassi, proximè ad atram bilem accedēs. Quin etiā plures & uarij excrementorum colores frigidam intemperiem monstrant. In ea quoque febris languida apparet, facies non concidit, ma-

stillaticis cassuthæ, & intubi satiui latifolij, fingantur orbiculi. Quin & Philonis antidotus semel tantum exhibitæ, omnē aliquando calidā iecoris intemperie mirabiliter sanauit. Extrinsecus adhibēda sumēta ex rosaceo, chamæmelino, coto Admouenda, neorumq; oleis parata. Aut absinthiū, aut palmulæ prædictis oleis incoquatur, & in ijs deinde lana uel spōgia madefacta, illi loco ubi iecur est situm, imponatur. Poterit etiā eius unguenti esse usus, quod accipit: Oleorum rosacei, cotoneorū, Vnguētū, nymphæ, singul. 3. i. santalorum alborum, & rubeorum, rosarū purpurearū, singul. 3. i. ramētorum eboris 3. i. f. seminis intubi satiui utriusq; 3. i. aceti 3. i. f. caphuræ grana 2. c. ræ qd' satis est, fiat unguētū. Epithemata etiā in hoc effectu Epithema, non parum conducere solēt, quæ in hunc uel similem confici possunt modum. Accipe stillaticij liquoris intubi satiui latifolij, lactucæ, oxalidis, rosarū, nymphæ, singul. 3. succi semperuiui 3. i. f. aceti 3. i. rosarū purpurearū, santalorū rubeorum, ramentorum eboris, singul. 3. i. specierum diarrhodōn abbatis, diatriōsantalōn, utriusq; 3. i. f. caphuræ 3. i. f. commixtis omnibus fiat epithema. Adhibēda uerò sunt epithemata æstate quidem actu frigida, hyeme uerò tepida. Vbi uerò frigida in iecimore fuerit intemperies, calefacientibus & robur Frigidæ in tēperie cu ratio. ac firmitatem addentibus medicamētis utendum est. In uictus Victus ratio, ratione, cibis concoctu facilibus & calefacientibus. Ex oleribus sanè satureia, hyssopo, fœniculo, oreoselino, abrotono, saluia & similibus. Cibi quoq; aromatis sunt condiendi, cinamomo scilicet, garyophyllis, & id genus alijs. Vinum bibendū tenue, fuluum, & odoriferum, fugiendus piscium esus, fructuum frigidorū, ociū, & in summa quicquid refrigerare potest. Intra corpus sumendū hoc decoctū, quod habet: Ræ Decoctum, dicum apij, fœniculi, oreoselini, singul. 3. i. eupatorij, hyssopi, mentæ, absinthij, cichorij, cassuthæ, origani, calaminthæ, asari,

asari, sing. m̄ 1. seminum anisi, fœniculi, dauci, cumini, carei, singul. 3 2. iunci odorati 3 1. f. mastiches 3 1. florū chamæmeli, rosarū purpurearum, utriusq; m̄ 1. cinnamomi selecti 3 1. f. coquātur omnia in lib. 1. f. uini, & lib. 1. aquæ fontanæ ad tertias, deinde colo transfundātur, adiectis serapij de eupatorio 3 3. & serapij de absinthio 3 1. & commixtis omnibus fiat potio, de qua mane in aurora, & à prandio iam cōfecta cōcoctione 3 3. f. sumātur. In eundem usum exhibenda ueniūt antidota calefacientia, nempe diacinnamomi, dianisi, saccharū saluæ, acorum conditum, radices pimpinellæ saccharo obductæ, & alia eiusmodi. Extrinsecus illimenda olea calida, ut est nardinū, chamæmelinū, absinthite, & similia.

Vnguentū. Vnicè uerò cōfert usus eius unguenti, quod accipit: Oleorū absinthitis, nardini, utriusq; 3 1. f. succi eupatorij 3 2. cinnamomi, garyophyllorū, ligni aloës, singul. 3 2. spica iūci odorati, mastiches, utriusq; 3 1. ceræ quod satis est, formetur unguentū. Poterit etiam adhiberi hoc ceratū, quod habet: Farinæ fœnogræci, lupinorum, utriusq; 3 2. radicis iridis, asari, utriusq; 3 1. eupatorij, absinthij, meliloti, iunci odorati, singul. 3 1. galliæ moscatæ 3 1. seminū anisi, fœniculi, utriusq; 3 1. mastiches 3 2. mirrhæ, thuris, utriusque 3 1. oleorum mastichini, nardini, rosacei, anethini, singul. 3 1. ceræ & resinæ quod satis est, informetur ceratū iecinori imponendū.

Epithema. Epithematis quoq; illius usus minimè aspernēdus erit, quod accipit: Seminū anisi, fœniculi, ammeos, singul. 3 1. f. cinnamomi, garyophyllorū, iunci odorati, singul. 3 1. decoquantur in lib. 1. f. tantisper dum medietas relinquatur, deinde colentur, & iuri per colum transuso admisceatur liquorū stilaticiorū absinthij & eupatorij, utriusq; 3 2. specierū diacinnamomi, diagalanges, utriusq; 3 1. cassutæ 3 2. aceti 3 3. commixtis omnibus fiat epithema. In humida uerò iecinoris

Humidæ in
reperiendi cu
ratio,

intem

intemperie uictus ratione deficcāte utendū, carnibus nimirum uolucrū aſis, uim tenui:ijs quæ ſudorē mouent, laco-
nico, & balneis etiā ſua ſponte proueniētibus. Parū in uni-
uerſum bibendū ac comedendum, piſces omnis generis, &
fructus quibus humectandi uis ineſt uitandi. Intra corpus ſu-
mendū ſerapiū de abſinthio, antidotus dialachæ & diacur-
cumæ. Extrinſecus autem quæ exiccāt citra inſignē calorē
adhibenda, de quibus omnibus dicemus copioſius infra in ca-
pite de anafarca. Sicca iecoris intemperies haud ſecus atq; ^{Siccæ intē-}
aliæ per contraria curanda erit. Quare, ut rē paucis per-^{perici,}
stringamus, uictus ratio cōuenit humectās, & balnea aqua-
rū dulciū, & alia quæ humectare poſſunt, de quibus ſuo lo-
co ſuſius dicemus. Hoc tamē, qđ antea quoq; monuimus, mi-
nimē interim negligendū erit, ut humectātibus ſemper ad-
miſceantur, quæ uiſceri robur addere poſſunt. Ceterum in-
ter ea quæ à proprietate totius ſubſtantiæ competere ui-^{Lupinum}
dentur, optimum eſt iecur, ſi diligenter exiccatum ^{iecur,}
& tritum drachmæ unius pondere cum uimō dolci aqua di-
luta præbeatur. Hoc enim multiplici experimento cogni-
tum, omnibus iecoris intemperiebus commodum exiſtit: ut-
pote, quod diximus, proprietate totius ſubſtantiæ hanc eſ-
ficaciam habens, non caleſciendo, aut refrigerando.

De obſtructione iecinoris. Cap. XXIIII.

Iecinoris obſtructio fit à flatibus uaporosis ac craſſis, cō-
coctūq; difficilis. Interdum uerō à craſſis & uiſcoſis hu- ^{Cauſæ,}
moribus, in ſinibus uenarū ex ſima iecinoris parte enatarū,
per quas ex uentriculo, & inteſtinis alimentū ad iecur di-
ſtribuitur. Porro ſi uaporosi & craſſi flatūs multitudo co- ^{Notæ,}
aceruatur, quæ exitum liberū non habet, atq; adeo obſtru-
ctionem parit, non grauitatis ſolū iuxta dextrū hypochon-
driū,

drium, sed & distensionis sensus oboritur. Obstructionem uerò à crassis uiscidisque humoribus, cōsequitur grauitatis cū dolore sensus, aliquādo quidē obtuse, aliquādo etiā uehemētis: & quandoq; quidem absq; febre, quādoq; cū febre. Crassa enim uiscosa, & multa, omnino reliquis plus obstruunt, & maximè quādo ægri à cibo uehemētiori motu utuntur. Si uerò acria sint & multa quæ in cibo sumuntur, dolor ex obstructione uehemētior fit: quum obturata corpora simul & tensionē perferant, simulq; pungātur. Cibi his qui sic laborant, dandi sunt calidiores, & qui tollendi obstructions facultatē habent. Cuiusmodi est porrū ex oxymelite, asparagus, scēniculū, oreoselinū, cappares, & alia olera & obsonia cocta, aut cum cōdimento aliquo calefaciente obstructionsq; auferēte sumpta. Vitanda sunt omnia crassioris succi alimenta, balnea item & exercitia à cibo. Vino in potu utendū tenni, ac ueteri. Præter uictus rationē attenuantiū quoq; et obstructions tollentium medicamentorū quāu celerrimus requiritur usus. Siquidē obstructio inueterata non tantū in iecore, sed & in omni corporis parte putrefactionem operatur, febremq; accendit. Præclare autē & citra omnē molestiam ab obstructione leuant inter simplicia medicamenta, lupiæcur, sumaria, eupatoriū, chamæmelum radix acori & dracunculi, asarum, anisum, apium, absinthiū, casia, iris, glycyrrhiza, rha ponticū, lupini, cappares, ammi, cassutha, oreoselinum, pistacia, amygdalæ amarae, spica nardi, stœchas, gentiana, plantaginis radix, semen, & folia sicca: anagallidis fœmine succus, eichoriū, halicacabū, intuba utraq; asparagus, & ruscus. Ex quibus subinde uaria medicamenta composita cōcinnari possunt, potissimum autē decocta, admixtis oxymelite simplici, scyllitico, serapio acido composita, de absinthio, hyssopo, calamintha, marrubio, & id genus alijs. Ad eundem

Victus.

Curatio.

Simplicia iecinis obstructionē tollentia.

eundem usum licebit exhibere pastillos de eupatorio, de absinthio, rhabbarbo seu scenitico, & ijs similes. Conferunt quoq; antidota dialachæ, diacurcumæ, dianisi, & huius generis alia quædã. Inter cætera autem medicamenta simplicia Pistacia. suprâ cõmemorata ad auferendas obstructions unicè cõducunt pistacia. Quapropter nõ solũ utile, uerũ etiã iucundũ erit, si pistacia decem aut duodecim per noctem in uino Aruifio, quod hodie deprauata uoce Malmasinũ uocant, macerata, in aurora perfectis iam coctionibus sumantur. Extrinsecus quoque admouenda epithemata, unguenta, emplastra & cerata, quæ in capite superiore De frigida intemperiei iecinoris curatione dicta sunt. Atq; nunc quidem commemorata medicamenta sufficient, si malum nondum inueteratũ fuerit. Nam ubi in uetustatem abierit malum, uenæ etiam sectio, & purgatio, si nihil aliud prohibeat, adhibenda erunt. Purgationem autem perficient catapotia de rhabbarbo, de agarico, aut alia antidota quæ crassos & tenues humores per aluum purgare possunt. Purgandum autem per aluum tum maximè, quando caua iecinoris laborant. Per urinam autem trahere oportet, ubi gibba eiusdem malè habuerint, quod Gal. lib. 2. ad Glauconẽ cap. 3. monet, multisq; alijs locis. Vacuato corpore per uenæ sectionem & purgantia medicamenta, ea subinde quæ suprâ comprehensa sunt medicamenta propinabuntur. Hoc potissimum antidotum, quod habet: Antidotũ liquidum. Radicis iridis & chamæpityos, seminum anisi, apij, singul. 3 1. asari 3 1. & cinnamomi, zingiberis, carei, chamemeli, singul. 3 1. stœchadis, gentianæ, marrubij, singul. 3 1. cum oxymelite scyllitico quòd satis est fiat antidotum liquidũ. Hoc sanè mirificè obstructions, nõ solum eas quæ in cauo, quàm quæ in gibbo iecinoris hærent (per urinas enim uehementer expurgare solet) penitus tollit.

De inflammatione iecinoris.

Cap. XXV.

Causæ. **I**N iecinore perinde atq; in alijs uisceribus, & ob easdem causas, fit inflammatio. Inflammatione uerò laborante iecinore, omnibus quidem ex æquo in dextro hypochondrio dolor & grauitas est, suprâ ad iugulum usque, infrâ uerò ad spurias costas perueniēs. Tumor quoq; dextri hypochōdrii consequitur, præsertim si gibbosa pars sit inflammata. Febris accedit acuta, tuſsis exigua & sicca, sitis inexhausta, cibi fastidiū, difficultas spiritus. Lingue color in primis quidē ruber, deinde uerò niger est. Vomitus tum syncera bilis, tum eius quæ ouorū uitellus assimilatur, pōst autē & eruginosa. Aluus adstringitur. Color etiā corporis mutatur in arquati morbi speciē, singultus quoq; cōsequitur. Accessionis autem tempore quidam delirio apprehenduntur, & acrem urinam excernunt. Porro quæ in simis iecinoris partibus eueniūt in inflammationes, fastidium, nauseam, uomitum biliosum, sitim ingentem magis inducunt. Quæ uerò in gibbis partibus oriūtur, maiori quàm priores inter spirandum dolore laborantem afficiunt, magisq; tuſsim excitant, atq; dolorem usq; ad dextræ partis iugulum, adeò ut detrahi uideatur extendunt, ut copiose Gal. lib. 6. De malè affectis locis, cap. 5. docet. Accidit autem interdum, ut muscoli iecinori incumbentes inflammantur: quare nonnulli decepti, iecinoris eam esse inflammationem suspicantur. Necessarium itaque inter se has ipsas distinguere. Iecinore enim inflammato, tumor secundū lineamenta rotundus, figura, uidelicet iecinoris, succumbit, quiq; ad corporis decubitus simul cōformatur. Maior enim apparet corpore ad sinistrum latus reclinato, minor autem rursus ad dextrum deuoluto, nimirum iecinore sub spurias costas cedente, neq; uisui, neq; tactui similiter succumbente.

Amplius

Simarū par
tiū iecino-
ris inflāma-
tiōis signa.
Gibbarū.

Amplius autem in iccinoris inflammatione incumbens cuticula, naturali modo habere conspicitur. Musculis autem inflammatis, cutis circumtenditur, ut si quis digitis apprehensum attrahere uelit, ea minimè sequatur. Tumor præterea iuxta situm musculorum iccinori incumbentiū oblongus apparet, & uisui & tactui manifestus. Ceterum ubi iecur iam inflammationē cōtrahere cœpit, cōfestim sanguinis detractio nem, si ætas & uirtus permiserint, experiri oportet. Ergo Gal. lib. 13. The. meth. cap. 9. autore, pariter tum reuellendus tum uacuādus qui ad iecur fluit, sanguis erit, interna in dextro cubito secta uena, propterea quod & è directo sit & ampla uia cum uena quæ caua dicitur, societate habeat. Hac nō comparente, media secanda est, quod si nec ea se ostenderit, reliqua quæ superior ac tertia est incidenda. Copiosus autē & quantum satis est, si uires ferre queant, educendus. Mis- sione sanguinis facta, post exiguum interuallum simplici ac leui clysteri aluus eluenda: præsertim ubi sponte non egerat. Sequenti à uenæ sectione die cucurbitæ cū scarificatione affigendæ, rursumq; post unam diem apponendæ nō pauci enim à secunda earum adhibitione opem senserunt magis quàm à priore. Fomentis quoq; utendum ex lanis oleo imbutis, cataplas- matis, ceratis, & epithematis. In quibus omnibus ad- mouendis unice hoc obseruandum erit, ut cæteris medicamē- tis emollientibus & discutientibus, semper adstringentia cō- misceantur. Fomentum itaq; fiat ex oleo cotoneorū, aut ma- stichino, aut rosaceo, aut myrtino, adiecto uino odorifero. Vel admoueatur spongia madefacta in decocto absinthij, meliloti, rosarum purpurearum, chamæmeli, anethi, plātagi- nis, intubi satiui, & id genus aliorum. Cataplasmata uerò, & emplastra è seminibus lini & fœnogræci farina hordeacea, malis cotoneis, meliloti flore, absinthio, & similibus in hunc

Musculo-
rum.

Curatio.

Venæ se-
ctio.

Clyster.

Fomenta.

Cataplas-
mata.

Emplastrū uel similem modum sunt paranda. Emplastrum quod habet: Farinæ hordeaceæ ꝛ ꝛ. carnis cotoneorum cōtusa ꝛ ꝛ. absinthij, florum meliloti, iunci odorati, singul. ꝛ ꝛ. seminis lini ꝛ ꝛ. oleorū rosacei, cotoneorū, chamæmelini, absinthitis, singul.

Ceratum. ꝛ ꝛ. aceti ꝛ ꝛ. cōmixtis omnibus fiat emplastrū. Ceratū quod accipit: Carnis palmularum ꝛ ꝛ. myrrhæ in uino ueteri adstringente macerata, styracis, mastiches, singul. ꝛ ꝛ. florum meliloti, comæ absinthij, chamæmeli, singul. ꝛ ꝛ. ꝛ. croci ꝛ ꝛ. oleorum cotoneorum, mastichini, rosacei, singul. ꝛ ꝛ. cū cera & resina quod satis est, fingatur ceratū iecmori imponēdū.

Epithema In eundem usum epithemata quoq; ex decocto rosarum, plātaginis, absinthij, chamæmeli, aut earundē liquoribus stillati-
ta. tīs componi possunt. In quibus sanē omnibus construendis unicē studendū, ut adstringentia ubi uehemens adhuc est in-
flammatiō, relaxantibus ac emollientibus præualeāt. Contrā
uerō ubi caloris uehementia remissior fuerit, emollientia ad-

Nihil actū frigidū re-
core inflā-
matione la-
borāte ad-
hibendum.
stringentibus. Cauendum præterea, ne prædicto actū frigida
admoveantur, sed prius modicē calefacta. Porro in iecmoris
inflammatione, ubi magni & uehementes circumstant dolo-
res, etiam medicamenta dolorem leuantia in potu sunt exhi-
benda: ita tamen, ut assiduus eorum usus deuitetur. Simplici-
bus autē potionibus frequentius utendum. Senecionis itaq;
decoctum tanquā maximē commodum, aut succus glycyrrhi-
zæ cum aqua calida exhibendus. His nō minus confert intus
borū succus, adiecto modico melle. Ad hoc enim quod refri-
gerat, ac firmitatē uisceri addit, etiā ora uenarum iecoris ex-
purgat. Caterum aluus etiā irritanda est urtica uel mercuria-
lis coctæ esu. In declinatione etiam morbi, aluus per chylsteres
inaniri postulat. In quē usum polypodiū et epithymū ex mul-
sa porrigūtur: idq; potissimū, si in cauo uisceris fuerit inflā-
matio. Caua enim iecmoris, ut antea quoq; dictum est, per
aluū:

aluum: gibba uerò per urinas expurganda sunt. Porro in ie- ^{Vidus.}
 cinoris inflammatione exquisitissimo uictu, Galeno lib. 13.
 The. meth. teste, opus est. Poscit autē iecur ipsum cibos po-
 tissimum qui obstructa recludere possunt. Eiusmodi uerò o-
 mnes sunt tenui cōsistentia, & quæ citra rosionē detergant,
 qualis est ptisana, mulsa, & similes. Alimentū igitur optimū
 est sic laborantibus cremor ptisanæ, in quo apiū decoctū sit.
 Ius etiā pulli gallinacei, in quo petroselinū decoctū sit, dari
 potest. Bibēda uerò mulsa, aut hordeidecoctū, uel intuborū
 satiiorū. Quòd si inflamatio principiū pmutationis ad sup-
 purationē iam obtinet, tum omnia prædicta augebūtur, do-
 lores nimirū, febres, deliriū, anxietas, cibiq; fastidium. Adiu-
 uare igitur permutationē ac puris eruptionē oportet, ut sci-
 licet quā celerrimè fiat, ne maiora inde corpora corrumpā-
 tur, idq; per usum cataplasomatis, quod accipit: Radicis al-
 theæ 3 1. f. seminis scenogræci, lini, utriusq; 3 2. foliorum al-
 theæ, maluæ, utriusq; m. 2. caricarū nume. 6. Ebulliāt in aqua
 donec mollescant, deinde contundantur, & fingatur cata-
 plasma. Neq; temerè fecerit, qui emplastrū quod puris per- ^{Emplastrū}
 mutationem iuuare potest adhibuerit, quale est quod habet:
 Farinæ hordeacæ, & scenogræci, utriusq; 3 3. radicis altheæ
 3 6. radicis liliorum alborum 3 1. f. seminis lini 3 1. florū cha-
 memeli, meliloti, utriusq; m. f. bulliant omnia in aqua, donec
 ad crassitudinem iustam coëant, deinde admisceātur olei cha-
 memelini 3 1. olei liliacei 3 1. f. bulliant denuo, & formetur
 emplastrum. Ex iam dictis etiam fingi potest ceratum, adie-
 ctis nimirum butyro, ladano, resina, & cera. Quum autem
 perfectū iam suppuratio fuerit, dolores remittent, omnesq;
 accessiones mitiores apparebunt. Iuxta hoc Hippocraticum. 2. Aph. 476
 Dum pus conficitur, dolores ac febres accidunt magis, quam
 iam confecto. Rupturæ autem tempore dolor, rursum ma- ^{Ruptura,}
 gis

gis augetur: quare etiam tunc rupturā adiuuare oportet, per ftercoris caprini, & columbini, seminis urticae, sinapi, aliorumq; ad superficiē attrahentiū usum: & per potiones calorificas, ut est polij, fumariae, radice chamædrios, & similiū decoctum. Facta ruptione, aqua mellis, aut ciceris decoctū, aliāq; quibus abstergerendi facultas inest, quae infra in capite de renū exulceratione cōmemorabuntur, propināda. Et si puris transmissio per uenas fit, urinam mouentia admiſcenda sunt: ſin per aluū, ea quae leniter subducunt, ſerū nimirum caprinū, tamarindi, caſſiaq; fiſtularis exhibēda. Deī ſi ſta abſterſione, quae conglutinare poſſunt, propinanda.

Abſtergē-
tia.

Diaretica.

Glutinan-
tia.

De intemperie lienis. Cap. XXVI.

Quemadmodū reliquae corporis partes octo intemperierū generibus affliguntur, ita & lien. Verū frequentiffimè frigida & humidam ſuſtinet intemperiem. Singulariū autē cauſas non eſt cur reſeramus: eadem enim ſunt, quae aliarū partium corporis. Petēda itaq; ex lib. Galeni de morborū cauſis, cap. primo, ſecūdo & tertio. Signum autem certū & compendioſum intemperiei in liene, ea quae eduntur ac bibūtur exhibeant, & quae forinſecus cuticula iuxta ſiniſtrum hypochondriū accedunt. Si enim frigida intemperies iuxta ipſum fuerit oborta, omnis cibus & potus qui efficaciter refrigerare poteſt, facilè & manifeſtè lienem lēdit. Omnia etiam frigida extrinſecus admotā of-
fendunt, atque adeò frigida lienis arguunt intemperiem. Eam uerò ipſam omnia calida conſolantur. Quòd ſi calida fuerit lienis intemperies, à nullis quae in cibo aut potu exhibentur, aut etiā extrinſecus accedunt, dolorem perſert. Et ſi quidē caliditas augeſcat, nō ſolū nihil tumori apponitur, ſed & contractionē amplius ſuſtinet, praefertim ſi febris adſit
Caterū.

Cauſae.

Signa intē-
periei nu-
dæ qualita-
tis.

Frigidæ.

Calidæ.

Ceterū & cibi & potus calefacientes, & quæ extrinsecus corpori calorem addunt, calidas etiā intemperies augent & exacerbāt. Solatio autem sunt eis omnia refrigerantia. Simi- Siccæ.
liter etiā sicca intemperiei in liene signa colligere oportet, maximè quū pro magnitudine propriæ naturæ non eminet. Ea itē quæ extrinsecus corpori adueniunt, atq; intra ipsum deuorātur, si exiccandi facultate prædita sunt, lienem exic- Humidæ.
cant. Porro ubi humida intemperie lien laborauerit, atq; ea amplius inualuerit intantū eius excrementū facit, ut etiam uentrem ac iecur pertingat. Species quoq; doloris unā cum prædictis signis infestantem intemperie demonstrabit. In ca- Dolor.
lida enim & frigida intemperie minus dolent, aut nihil omnino, neq; quicquam etiam in humida, nimirū uerò in sicca. Ex prædictis etiam cōiecturam facere licet compositarū in liene intemperierū. Ferè enim in totū ubi calida intemperies fuerit intensa, sicca eam consequitur, & ad frigidā inueteratam humida cōcomitatur. Quandoquidē uerò & humo- Signa intē-
periei cum
fluore sub-
stantie
res in lienem confluentes tumores producant, eorum quoq; diligentē considerationē facere oportet, quales nam sint tandem, ex ijs quæ iam dicētur. Bilioso enim fluore existēte, uni uersum corpus calidius apparebit, etiam si non adsit febris, oculiq; & urinæ per bilem coloratæ. Siccitatē semper accu- Biliosæ.
sabit æger, & de siti conqueretur ac bili os infestante. Cibū fastidit, & uigilijs infestatur, frigidamq; desiderat, unā cum hoc quòd linguā subflauā obtinet. Exacerbationes tertianæ fient, suntq; ipsi ægri moribus iracundi, & qui præcipitater excandescunt. Si uerò atræ bilis sit fluor, eius color tum in lingua, tum in reliquo toto corpore apparebit: & appetētia aderit ciborum non naturalis, mœstiq; ac subtristes ægri sunt, reliquaq; atræ bilis indicia eis adsunt. Exacerbationes uerò quarto quoque die affligent. Vbi uerò pituitosus hu- Pituitosæ.
mor in

mor in lienem defertur, cōsimilis pituita aderit color, ægriq;
 minimè sitient, & cibum appetent, nisi salsa fuerit pituita:
 tunc enim cibum fastidiunt ægri, potusq; magis sunt appe-
 tentes & sitibundi. Quin & diebus singulis exacerbationes
 ingruent. Urinæ quoq; candidæ sunt, ipsiq; ægri moribus pi-
 gri & segnes. Quidā uerò ex eis qui frigidā affectionē ha-
 bent, magnum & durum lienem acquirunt. Quòd si sangui-
 neus existat in lienē cōfluens humor, possibile est ipsum co-
 lorem tum iuxta linguam, tum circa cutem permutari. Quod
 autem ad appetentiam ciborum & fastidium attinet, medio
 quodam modo habent ægri reliquisq; magis languēt, quam-
 quā nō parē uisceris tumorem habeāt. Venæ uerò uniuersi
 corporis sanguinæ plenæ apparent, & urinæ subflauæ. Hæc
 indicia prolixius ex Actio cōmemorauimus, quòd nimirum
 cōmunia, & omnibus ferè reliquarum partium intēperiebus
 cum affluxu humorum adaptari queant. In uniuersum quidē
 lienis intēperies nudæ qualitatis, ferè citra tumore fiunt. Eas
 autem tum per cibos & potus, tum per simplicissima medi-
 camenta, ac fōmentorū irrigationes, olea & unguenta, &
 id genus alia quæ intemperiei cōtraria sunt, corrigere opor-
 tet. Calidæ. Calidam itaq; intemperiem lienis curabis perinde atque
 iecinoris, per cibos nimirum ac potus refrigerātes, inunctio-
 nes ex rosaceo & meūno atq; alia quæ ca. 23. huius libri cō-
 prehensa sunt. Frigidæ. Frigidam similiter, ut iecinoris, per ea quæ
 moderatè calefacere possunt emēdabis. In humida lienis in-
 temperie, præter ea quæ capite paulò antè citato cōmemo-
 rata sunt, proderit quinq; folij radix, & plantago sicca, spu-
 ma & flos salis, ammoniacum, succus salicis, & similia, si ex
 ijs affuso sufficienti aceto, unguentum aut ceratum conficia-
 tur, qualia paulopost describemus. Conuenientissimæ etiam
 huic sunt frictiones, quæ discutiendi facultatē obtinent. Sic-
 cam

cam lienis intemperiem balneum, dulcium & calidarū aqua= Sicca.
 rum curat: item munctio ex oleo dulci. Cibi citra refrigerat= Curatio in
 tionē humectātes, uelut est ptisanæ succus. Porro si lien in= temperiei cū
 temperie cum fluore substantiæ afficitur, tunc ubi sanguinea fluore sub=
 fuerit, ex uena cubiti interna sinistri brachij (lienarē uocāt) flantiz.
 sanguis mittendus erit. Aut si ea inueniri haud potest, ex ea
 quæ inter annularē et auricularē appellatos digitos sita est.
 Deinde intrinsecus & extrinsecus adhibenda, quæ lien ro= Sanguinea,
 bur adicere possunt medicamēta: ut sunt cortex radice cap=
 paris, scolopēdrium, hæmionitis, adiantum, iris calaminta,
 & ijs similia, quæ iccoris quoq; robur & firmitatē conser=
 uare ualent. De quibus in sequentibus capitibus fusius dice=
 mus. Si reliqui humores ad lienem cōfluxerint, primū redun= Reliquorū
 dans humor purganti medicamento uacuandus erit: dein reli=
 quo tempore quæ intemperiem relictam corrigere, & lienē
 etiam corroborare possunt, admouenda.

De lienis inflammatione. Cap. XXVII.

Lien, ut reliqua uiscera, inflammatione corripitur, quo= Causa,
 ties sanguis calidus præter naturam ad eū cōfluit. Co= Indicia,
 gnoscitur grauitate & tumore sinistri hypochondrij, qui ad
 tactū nō cedit: dolore & distēctione loci, febre, & æstu. Irruē
 tis uerò humoris copia, ex magnitudine & uelocitate gene=
 rationis ipsius inflātionis deprehēditur. Victus ratio eorū
 qui inflātionem lienis laborāt simplex sit, atq; ea quæ facile Visus
 cōcoquantur in cibo exhibeantur, uelut est ptisanæ succus,
 panis madefactus: & alia quæ suprà in aliorū uiscerum inflā
 mationibus sæpē à nobis dicta sunt. Quòd si inflātio diu=
 tius duret, auicularū etiā carnes eis cōcedēdæ, & pisces saxo
 sis aquis degētes. Potius ægri sit cinnamomi decoctū, aut ui=
 nū aquosum. Curatio ipsa à uenæ lienaris, aut eius quæ inter
 mino

Clyster. *minorem & annularē digitum est, incisione auspicetur, modo nihil sit quod eam fieri uetet. Venter per clysterē assidue eluatur, potissimum si uenæ secāde medela relinquantur. Deinde imponantur lieni medicamēta adstringētia, quæ id quod influit reprimere, & lienis firmitatem conseruare possunt. Neq; tamen sola adstringentia sunt adhibenda, sed illis admisceantur quæ citra euidentem calorē extenuant, incidunt, & relaxant: ne scilicet crassus in eo succus obturatus uehementius incrassescat, quēadmodū Galenus lib. 11. The. meth. diligenter ac eruditē monuit. Quapropter si moderata fuerit inflammatio, uinum uetus ac austerum tenuiumq; partiū oleo dulci permixtum, & lana succida exceptū imponemus: Si uerò maior sit caliditas, rosaceum sit oleum, aut melinum, & chamæmelinū cū aceto. Miscebis autem illa inter se hūc ad modū. Olei rosacei, cotoneorū, singul. ꝯ. 1. olei chamæmelini ꝯ. 1. aceti optimi ꝯ. 6. cōmisceantur omnia pro fomento, ac irrigatione. Quòd si iam dicta olea non adsint, folia rubi, aut mala cotonea in oleo decoquantur, & quedam etiam tenuiū partium addantur, ut est absinthium & pulegium. Cauendū etiam ne aliquid actu frigidum lieni imponamus, sed quicquid est eorum medicamentorum quæ extrinsecus admouentur, tepido calore præditum sit. Post fomenta & irrigationes ad cataplasmata transeundum: in quorum compositionem hordeacea, & loliacea farina, cum caricis, lini semine, oleo in quo absinthium ac pulegium sint decocta, assumantur. Ceterum cauendum, ne post irrigationes & cataplasmata locus denudetur: sed ubi hæc fuerint ablata, mox cerata aut emplastra eiusmodi, qualia in capite de iecoris inflammatione descripsimus, imponenda. Siquidem simili genere medicamenta ambo uiscera postulant: tantò autē ualentiora lienis sint, quantò crassiore utitur alimēto. Quare ex capite de iecimo*

**Quæ im-
ponenda lieni.**

Fomenta.

**Nihil actu
frigidū lie-
ni imponen-
dum.**

**Lienis me-
dicamenta
ualentiora
sunt.**

iecinoris malis, medicamentorum formulas huic loco cōuenientes petes, hoc tantum obseruato, ut ijs semper acetū, & quippiā quod lieni gratū sit, eiusq; robur peculiariter tueri possit, admisceas. Quòd si in suppurationē ipsa lienis inflammatio tendat, quod tamē rarò cōtingit, adiuuare eam oportet, ne plura corpora putrescant, per cataplasmata quæ pus producant, de quibus in iecinoris inflammatione diximus.

De lienis scirrho. Cap. XXVIII.

Inflammatione lienis minus rectè curata, lien tumore dū- Causa.
rum, quem Græci σκίρροϋ uocant, contrahit. Cuius mali Signa.
causa est humor quidam, qui lieni pertinacius adhæret. Est
uero quando citra inflammationē oboritur durities, puta in
tumore nimio. Tactu facilè malum, ex quacunq; fuerit occa-
sione, deprehenditur. Victus ratio debet esse extenuās, quare Victus.
in cibo sumenda ea quæ concoctu facilia sint, & succum bo-
num ac tenuē generēt. Fugienda omnia quæ duræ carnis sunt,
& crassos generant succos, quæq; concoctioni renituntur.
Bibendum uinum substantia tenuē, colore fuluum, ætate non
admodum uetus, omniq; adstrictione uacans. Plurimum etiā
fiduciæ in exercitationibus ponendum, quibus ante cibum
uti conuenit, corpore superuacuis non abundante. Manife-
stum autē est, quod uociferationes quoq; opportune & in
tempore factæ, in hoc malo summè opulentur. Quod ad Curatio.
medicamentorum rationē attinet, certè ualentioribus admo-
dum non solum extrinsecus, uerumetiam intrinsecus utendū
erit. Intra corpus itaq; ualidissimæ potiones, nam eas sine mo-
lestia tolerant, exhibendæ. E quarū numero primas sibi par-
res uendicant cortices radicū capparis, hemionitis, tama-
ricis radix & germina, in aceto uel oxymelte cocta. Itē cen-
taurij minoris succus epotus, & lupinorum amarorum de-
u coctum

coctum: cum ruta & pipere assumptum. Anagallidis foeminae scrupulus cum posca, aut oxymelite potus mirifice cōfert.

Ferrum in
aqua extin-
ctum.

Conuenientissimum etiā lieni indurato remedium existit ferrum aqua, aut uino, aut posca sæpius subinde extinctum. Ea ipsa enim aqua, aut uinum, aut posca in principio exhibita, iucunda & utilissima existit, & per plures ex ordine dies datur. Itaq; febrientibus aquam, aut poscam præbeto: eis uerò qui tenerā carnem habent, ac febre carent, uinum. Sit autem ferrū quod in ipsis extinguitur, stomoma. Est autem stomoma, ferrū quod in usum aliquem formatū est, hoc est, instrumenti alicuius formā redactum, ac chalybe roboratum à uerbo

Stomoma
ferrum.

στούμων, quod roboro ac quasi os, & aciem gladij firmo significat. Ipsius quoq; stomomatis ferri squama agrestioribus hominibus utiliter exhibetur. Præclare hæc lienem liquefacit, ut quæ consumendi facultatem habeat. Tamen ne inde uenterculus malè afficiatur, aliquid ei admiscere conuenit roborantium medicamentorum, ut est scolopendriū, absinthij coma, casia, anisum, serpillum montanū, aut id genus aliud. Extrinsecus fomentum hoc admoveatur, quod habet:

Fomentum.

Centaurij minoris, hæmionitidis, rutæ, singul. ῑῑ. 1. radice corticis capparis ʒ. 1. decoquantur omnia in aceto, et simulatq; cocta fuerint spongia in decocto irrigata lieni calida imponatur. Præterea mirum effectum ostendit hoc etiam unguentum, quod habet oleorum è capparibus, liliacei, irimi, singul. ʒ. 1. medullæ osium cruris bubulini ʒ. 2. lenti cremoris radice altheæ, scæno-græci, seminis lini, singul. ʒ. 1. pinguedinis taxi, gallinacæ, anserinæ singul. ʒ. 2. corticū radice capparis, tamaricis, costi, centaurij minoris, singul. ʒ. 1. ammoniaci, bdellij, galbani, singul. ʒ. 6. gummi prius in aceto dissoluti cum cera quod satis est, formetur unguentum. Plurimum quoq; conferre solent emplastra & cerata, ad eum composita modum.

Vnguentū.

dum. Accipe oleorum liliacei, irimi, de capparibus, singul. ʒ. i. farinae hordeaceae, foenograci, seminis lini, singul. ʒ. i. corticū radicū capparidis, hēmionitidis, utriusq; ʒ. i. f. radicis altheae ʒ. i. bdellij, ammoniaci, galbani, singul. ʒ. i. f. opopanax, myrrhae, thuris utriusque ʒ. f. cum resina terebinthina & cera quod satis est, informetur ceratum. Porro oportet medicum diligenter ad affectū respicere, & pro eius ratione tum addere, tum adimere ea quae emolliunt, aut attenuant, & discutiant, aut quae robur addunt. Pro sunt deniq; non parum cucurbitula cum scarificatione affixa.

De lienis obstructione. Cap. XXIX.

Accidit interdum ut non solū propter attractricis quae est in liene facultatis imbecillitatē, uerum etiā meatus per quē atræ bilis feculentus humor ex iecinore in lienē deriuatur obstructionē, impurus ac uitiatus sanguis subinde in uniuersum distribuatur corpus. Quod si cōtigerit, tūc color corporis uitiatus ad nigredinem uergit: nonnunquam etiam immedicabilia ulcera hoc modo affecti obtinēt. Cause ex ijs quae in cap. De iecinoris obstructione diximus, facile sciri possunt. Malū uerò cognoscitur ex grauitate quae est circa si-

Signa.

Curatio.

Præparatio humorum.

nistrū hypochondriū, uitiato præterea totius corporis, præsertim uerò faciei, colore: spiritus difficultate, turbulētis somnijs, & alijs quae ex ijs quae suprā dicta sunt sua spē innotescunt. Curatur is affectus uictus ratione extenuatoria, & medicamentis obstructionē tollētibus, quorū magnā copiam studiosi in ca. De iecoris obstructione inueniēt. Vtraq; enim uiscera similibus genere medicamentis indigēt. Lien tamē tantò fortioribus eget, quanto crassiore utitur alimento. Quia propter quatenus ad humorū crassiorū ut uacuationi promptius obediāt preparationē attinet, ijsdē certē medicamentis

opus erit: hoc duntaxat obseruato, ut hic sint omnia ualidiora, & sibi cōmixta habeāt quæ robur uisceri addere possunt. Preparati humores dein uacuandi sunt per ea medicamenta quæ crassos & seculentos humores purgāt, quorū iam crebro facta est mētio. Posthæc & intrinsecus & extrinsecus ea sunt admouēda medicamēta, quæ capite præcedēte, et in capite de iecoris obstructione cōprehensa sunt. Quapropter hæc loca abunde satis medicamentorū nobis suppeditabunt.

De ictero. Cap. XXX.

Icterus.

Iκτῆρ & nihil aliud est Græcis, nisi bilis, modo flaua, modo atræ, per uniuersum corpus effusio. Celsus auriginem appellat hoc malū, alij arquatū & regium. Harum uerò appellationū omnium causas diximus cap. 36. Cōpendij nostri.

Causæ.

Fit interdū iecinore nihil patiēte bilis effusio ad cutē, in indicationibus morborū. Nonnunquam ubi citra febrē sanguis

Crisis.

ab extranea aliqua occasione corrūpitur, ac biliosus efficitur, sicut à uenenatarū bestiarū morsibus cōtingere cōsueuit.

Morsus uirulentorū.

Inflāmatio aut intēperies iecinoris.

Ita quidā quum morsus à uipera esset, uniuersum corpus porraceo colore maculatū habuit. Quinetiā fieri potest ut propter inflāmatōē aut naturalis tēperiei iecinoris permutationē, eiusmodi humorū corruptio accidat, ut aliquādo herbis pallore albicātibus totum corpus manifestè assimiletur, aliquando etiā plumbi colorē induat. Quemadmodum etiam eiusmodi colores nigriores fiūt, si ob lienē malè affectum acci-

Imbecillitas folliculi fellis.

cidant. Fit etiā nonnunquam propter imbecillitatē uesicæ bilis susceptricis, quæ biliosum humorem, ueluti consueuit, in sese ex iecinore non atrahit, atq; adeò impurum sanguinem relinquit. Aliquando etiam propter obstructionem & debilitatem uasorum, quorum ora ex ipsa ad iecur deriuantur, humorem biliosum non attrahit. Nonnunquam etiam pro-

Obstructio & debilitas uasorum eiusdem.

pter

pter meatus qui ad intestina uadit obstructionem. Caterum ^{Signa icte-}
ut icteri causas probè discernamus, excrementorum figura ^{ri.}
& color necessario considerata erunt, quum in aliquibus
multum colorata per flauam bilem appareant, perinde atq;
in alijs etiam urina. In quibus igitur ratione iudicationis bo- ^{A crisi.}
nae in febribus biliosus humor ad cutē prorūpit, ijs & excre-
menta & urinae naturali modo se habere uidebuntur. Si autē ^{Ab inflam-}
cum febris & biliosis deiectionibus inuadat, & in dextro hy- ^{matione ie-}
pochondrio grauitas adsit, feruens iecoris inflāmatio signi-
ficatur, cuius ui sanguis in bilē mutatus, per uniuersum cor-
pus defertur. Sin feruor citra grauitatem in ipso substat, ex
sola calida iecoris intēperie uitiiū oritur. Quibus uerò citra ^{Ab intēpe-}
febrem unā cum grauitatis alicuius sensu circa dextrū hypo- ^{rie eiusdē.}
chondrium alba excrementa deiiciūtur, in ijs uesicae bilis su- ^{Ab obstru-}
sceptricis meatuum obstructionē esse factam putandum est. ^{ctionē.}
Si uerò citra grauitatē talia deiiciantur, uires horum esse im- ^{Ab imbe-}
firmas existimandum est: uel attractricis, quae humorem bi- ^{cillitate.}
liosum ex iecinore elicit: aut expultricis, quae ad intestina eū
dem propellit. Statim etiam ijs urinae biliosissimae affatim
excernuntur. Porro quibus atrae bilis humor unā cum san- ^{Icterus a-}
guine ad cutē delatus est, hi omnino grauius patiuntur. Con- ^{ter,}
sequitur enim ipsos tristitia praeter rationē, & mordacitas
eorum quae circa uentrem sunt, difficultasq; spirandi, & ci-
bos auersantur, & nigrae urinae excernunt. Stercora uerò
chalcanti colorem referunt, & aluus ijs magis resiccatur.
Caterum eos qui ex flaua bile icterū contrahūt, nulla mor-
dacitas eorum quae circa uentrem sunt consequitur: neq; etiā
tantopere auersantur cibos. Stercora candida egeruntur, uri-
nae autem crocei coloris, turbatae tamen permanēt. Commu- ^{Signa com-}
niter tamē omnibus ictericis pigricies ad motum accedit, & ^{munia icte-}
ad dulces cibos animum habent alienatum. Pru ritus etiam ^{ricorum.}

uniuersi corporis comitatur. Candida oculorum, & partes faciei temporibus propinquæ, itēq; malæ pallorē ostendunt.

Curatio i-
cteri iudi-
cationis ra-
tione acci-
dentis, Venæ etiam sub lingua repletæ reperiuntur, & abundantem humorē significant. Ictero itaq; ratione bonæ iudicationis, febribus perfectè solutis correpti, facillimè curantur, si laua-
cris aquarum dulcium utantur, ac olei discussorij perfrictio-
ne, ac omnibus quæ cutē rarefaciūt, qualia sunt oleū chamæ-
melinum, anethinum, irinum, & similia. Rosmarinus etiam herba oleo incocta plurimum discutit. Viētus ratio uniuersa in ijs ut sit humida, & humorum crassitiē extenuās oportet.

Ex morfu-
virulento-
rum. Qui ex uirulētorum animalū morfibz ictero corripitiūtur, curadi ferè sunt sicut ij qui à rabido cane morfi sunt, de qui-
bus suo loco abundè satis diximus. His qui ob calidam ieci-
noris intemperiem, aut inflammationem eiusdem arquati
fiunt, curationem quæ supra De iecoris malis dicta est, ad-
hibere oportet. Quapropter quæ illic commemorauimus, huc transferenda erunt. At si propter obstructionem uesicæ
fellis susceptricis fiat icterus, tūc duo maxima remedia prin-
cipatum obtinent, uenæ sectio, & purgatio. In quibus igitur
multitudo sanguinis unā cum bile in uniuerso corpore abun-
dat, & quos circa iecur aut lienem grauitas aut distentio in-
festat, nihil uenæ sectione utilius fieri potest, modo non sit
quod hāc fieri impediat. Secunda uerò uena est in dextro cu-
bito interna, idq; iecore malè habente: liene autem laborante,
in sinistro, sanguisq; particulatim & per uices detrahendus,
ne per coaceruatam euacuationē uires ægri prosternantur.

Ab obstru-
ctione.

Venæ se-
ctio.

Quod si à uenæ sectione excludimur, cōmodissimè clyster ad-
hibetur. Cōmodè autem & à uenæ sectione clyster iniicitur,
utpote qui propter stercorū euacuationē spirandi facilitatē
efficit, intestinaq; irritando, ac mordendo humores ad cutis
superficiē delatos, ad ipsa retrahit ac reuellit. Sit uerò ad eum
compo

compositus modum. Accipe intubi utriusq; marrubij, eupa- Clyster,
torij, adianti, origani, absinthij, singul. m. i. seminum anisi,
fœniculi, petroselini, asparagi, singul. 3 2. f. radicū glycyrrhi-
zæ, apij, fœniculi, sing. 3 1. bulliāt in aqua sufficienti ad ter-
tias, & colo trāsfundatur, accipiāturq; iuris decocti 3 13. ca-
sæ fistularis 3 1. hieræ picræ 3 6. antidoti de succo rosarū 3 2.
oleorū anethini, irimi, utriusq; 3 1. f. salis 3 1. cōmisti omnibus
fiat clyster. Verū purgationes huic malo magis proprie
& familiares sunt, sic tamen ut edulij & potionibus, itemq;
medicamentis humores prius attenuentur. Cibis igitur uten- Viātus,
dum concoctu facilibus & extenuantibus, uolueribus mon-
tanis, piscibus saxatilibus, oleribusq; urina cientibus, præser-
tim intubis, asparago, smyrnio, fœniculo, & similibus. Car-
nes ferinæ mansuetis magis sunt aptæ, potissimum caprea-
rum. Pro intinctu seu embammate ualet acetum, in quo ari-
stolochia macerata sit. A fructibus abstinendum. Bellaria
tamen sint amygdallæ, sed modicè sumantur, & cicer modi-
cè torrefactum. Eius etiam decoctum assiduè potatum, non
parum confert. Vinum conuenit album & tenue, non ualde
uetustum. Quod ad medicamenta ipsa attinet, sumenda ea
quæ in capite de obstructione iecinoris, & lib. i. cap. 11. dicta
sunt. Præ alijs autem maximè confert apij, petroselini, adia-
ti, calaminthæ, uerbenacæ rectæ, rubiæ radicis, aristolochiæ,
serpylli, hypericiq; decoctum. Extenuatis & præparatis tan Purgatio,
dem humoribus medicamentum quod flauam bilem purgat
exhibendum. Sunt autem ictero laborantibus purgationes
dandæ fortiores: ob uentriculi enim siccitatem imbecilliores Validæ
minusq; efficaces in ipsis cognoscuntur. Quæ uerò præ purgatio
alijs conferunt, est dilutum rhabarbari lib. i. cap. 7. descri- nes ictericis
ptū, ac hiera picra, antidotus de succo rosaceo, de psilio, & dandæ,
diaphœnicôn. Quod si primo medicamento purgante ni-

Quæ visce-
ra expur-
gent.

Succus cor-
ticis rapha-
ni.

Vitiatusco-
lor faciei et
oculorū vt
amouēdus.

hil proficias, rursus ad ea quibus tollendi obstructions fa-
cultas inest reuertendum, et post triduum rursus uiolentius
purgandum. Si liene laborāte malū oriatur, ad caput de me-
lancholia, et lienis obstructione recurrendum. Purgatione
facta per aluum, deinceps ea quæ uiscera expurgant exhibē-
da sunt medicamenta. In quē usum unicē confert radix cycla-
mini trita et pota. Hæc enim nō solū uiscera repurgat, uerū-
etiam ad bilem in uniuersa cute excludendam per sudorem
aptissima est. Quare post eius potionem sudorum exclusio-
nem, per uelamenta ac concalesctionē in lecto iuuare opor-
tet. Dantur autem ex ea drachmæ duæ aut tres, ex aqua mul-
sa. Præclarè quoq; facit corticis raphani succus, uino mera-
co dulci permixtus, aut uino mulso, sic ut succi ʒ 2. uini ʒ 1.
contemperentur. Vermes etiam terreni exiccati ex uino mul-
so per triduum dati, iſterum per lotium eiſcient. Datur item
ualde commodè cichorij et intubi succus, febrietibus quidem
per se, febre carētibus cum uino. Cassuthæ quoq; succus mi-
rifice prodest. Commodissimum etiā est chamæmelum, quæ
et leucanthemus appellatur, itemq; buphthalmum. Cete-
rū medicamenta quæ in potu accipiuntur omnia si fieri po-
test in balneo exhibeātur, ubi nimirum ægri in calidum soliū
conscenderint. Plurimū quoq; uictus rationi uiriū refocilla-
trici hoc tēpore intentum esse oportet, per quā facultas ex-
cretrix reparetur, etsi qua pars læsa sit corroboretur, atq;
præsens coloris corruptio repurgetur. Quapropter conue-
niunt exercitia, gestationes, inunctiones ac exudationes. In
hūc usum pyriateria, seu uaporatoria sicca conferunt, in
quibus oleum in quo serpyllū aut rosmarinus herba decocta
sit, corpori illinendum. Quod si uerō quippiā ex iſtero cir-
ca faciem et oculos relinquitur, urinæ autem apparent pu-
ræ, aluiq; consucto more egerit, narium infusis utendum. In
quem

quem usum cyclamini succus, item nigella cum aceto, anagallidis & betæ radices succus infunditur. Acetum etiã acerri-
mum naribus attrahat æger in folio desidens, contineatq;
pressis naribus paulisper, & mirificè uacuabitur.

De malo corporis habitu. Cap. XXXI.

KΑΧΕΪΑ Græcis nihil aliud est nisi malus corporis ha- καχεΐα
bitus. Eiusmodi uerò est qui in aquositate diffunditur,
& in quo uniuersa corporis miscella laxior fit ac mollescit.
Hoc malū ut plurimū ex longo morbo cōgregatur: iam uerò Causæ.
& ex uiscere quopiā in scirrhum indurato consequitur, po-
tissimū iecore & liene. Neque rarò in dysenteria diuturna,
& affectionibus coeliacis contingit, ob consuetam item ali-
quā cohibitā excretionem. Corpus ipsum totum cum uirore Signa.
albicans redditur, ac inualidum, ita ut crura inter eundū ua-
cillent, & in principio quidem concoctiones impediuntur,
manente etiamdum appetitu: postea uerò & fastidium acce-
dit, & respiratio ipsis fit rara ac debilis, quæ motibus & a-
ctionibus cōdensatur. Alius etiã inæqualia recremēta excer-
nit. Capiuntur hoc malo maximè senes, & pueri, qui facile Qui hoc
malo præ-
sertim ca-
pantur.
pereūt propter uitalis facultatis imbecillitatem, & quòd ob-
cutis raritatē succi in eis promptè transpirēt. At uerò qui in
uigore sunt rarò incidunt, & facile se inde extricāt. Malum
hoc si diutius durat, in aquā inter cutē trāsit, ideoq; eius cu-
ratio nō differenda. Victus in uniuersum sit tenuis, & siccus. Victus ra-
tio.
Cibi itaq; sint simplices, & qui facile concoqui possint, ac
optimum procreare sanguinem. Vitent bellaria omnia, item
nidorosa, humoris crassi & uiscosa, & quæ difficulter con-
coquantur. Vinum cōuenit eis album, tenue, odorum. Quod
uerò ad curationem attinet, siquidem ex consueta excretio-
nis cohibitione malum accadat, irritare ac prouocare eam Curatio ca-
chexiæ ob
cōsueta ex-
cretionem
cohibitam.
ipsam

ipsam excretionem oportet. Quapropter sanguinis detractione, si nihil sit quod eam impediat, quæ paulatim et paratitit uicibus fit ad tertium usque; aut quartum diem utendum in ijs, qui ob hæmorrhoidum aut mensium retentionem malum inciderunt. In ijs autem qui copia uitiosorum humorum laborant, sanguinis missio noxia est, quare cõuenienti potius aliquo medicamento purgante uacuandi sunt. Corpore uacuato aquarum sponte natarum usus sit, maxime aluminosarum et nitrosarum, mox sulphurearum. Variè quoque exercitentur deambulationibus, gestationibus, uociferationibus, frictionibus, per linteola, et alia moderata exercitia. Deinde inunctio ne ex oleo utatur, cui quedam quæ humores resiccant, ut sunt nitrum et sales, sint infarsa. Ad lassitudinis autem curationem balneum per interualla quedam adhibeatur. Mirificè quoque ipsos iuuat absinthij potio, et adhibiti dropaces. Quod si iecur malè afficiatur, aut aliquod aliud ex uisceribus, mederi his ipsis per remedia ad singula ipsorum supra præscripta cõuenit. Si malum in hydropem deciderit, aquæ inter cutem curationi subiicietur, quemadmodum exponemus.

Ob vitio-
forū humo-
rum copiā.

Ob malè
affectū vi-
scus.

Aquæ in-
ter cutē spe-
cies.

De aqua inter cutem. Cap. XXXII.

ἀσκήτης.

τὴν πᾶν-
νίτης.

ἀνάσπερ-
κα.

HYdropis, seu aqua inter cutem tres sunt species: una enim Græcis ἀσκήτης, alia τυμπανίτης, et tertia ἀνάσπερκα, ἰπποσάρκα, ἀσκήτης, et λυσιφλεγμα-
tia dicitur. Ascites fit, quum inter membranam peritoneam appellatam et intestina plurimus aquosus humor coaceruatur. Sic autem Græcis dicta est, quod ἀσκή, hoc est utri modo
τυμπανίτης. membrana ipsa repleta esse aqua uideatur. Tympanites acci-
dit, ubi flatus ac spiritus superuacui plurimus in prædictis
ἀνάσπερκα. uentris locis colligitur. Anasarca contingit, quando per uni-
uersam corporis molem humor disseminatur, ut instar
spon-

spongiarum aut papyri uniuerſa caro perhumida & mada-
 facta prorsus appareat. Fit hydrops ob insignē iecoris frigi-
 ditatem, aut propter alias partes impense refrigeratas, que Causæ.
 iecur in eundē deducere affectum possunt. Coafficitur uerò
 iecur lienī refrigerato, uentriculoq; & intestinis, maximē ips
 que sunt iuxta intestinum ieiumum, pulmōni deniq; & renti-
 bus, ac septo transuerso. Cōtingit etiā ex immodica hemor-
 rhoidum euacuatione, aut ē fluxu muliebri, aut ob menstruo-
 rū retētiōē, aut propter aliū quēdā magnū uteri affectū. In
 ijs enim omnibus nullum præter naturā tumorē iecur habet,
 & tamē aqua inter cutē corpus corripitur, ex sola refrige-
 ratione iecore in principio affecto, post uerò aliquando &
 durum fit. Quod palām in illis uidere est, qui ex intempesti-
 ua frigide aquæ potione iecur acruatim refrigeratum ob-
 tinent, ut statim hydrops consequatur, priusquam ipsum in
 scirrhosum tumorem eleuetur. Multi autem & à podagra,
 & coxendicum dolore uexati, aquam inter cutem inciderūt.
 Frequentissimē autem eos qui cibum non sentiunt, & malo
 corporis habitu præditi sunt, itemq; ictero infectos, hy-
 drops consequitur. Cœliacam item affectionem, & dysen-
 teriam. Communiter omnis hydrops spirandi difficultatem,
 & tumorem, & grauitatem, & uitiatum colorem inducit, Signa com-
munia.
 ex uirore nimirum albicantibus ægris. Fastidiunt etiam ci-
 bum, potum autem largiorem appetunt, maximē qui ex ascite
 laborant. Etenim humor qui in locis prædictis detinetur,
 falsus est & putrefactus: quare febris etiam sequi, ut pluri-
 mum, solet. Aqua inter cutem minus fœminæ quàm uiri ten-
 tantur. Pueri uerò magna ex parte hydrope anasarca corri-
 piuntur. Inter uerò suprā commemoratas tres species, tym-
 panites omnino periculosior, minus ea ascites, dein anasar-
 ca. Victus autem omnium hydropicorum communis est,
 ut ci

Hydrope
 qui magis
 tenentur.
 Victus ra-
 tio cōmu-
 nis,

Panis.

Sales.
Potus.

Exercitia.

ut cibus sit cōcoctu facilis, & sufficienter coactus, atq; aridus. Exolutus enim & humidus aptus est ut in aquositate cōmutetur. Panis itaq; optimus clibanites, qui salem, ammi, fœniculū, anisum, aut cuminum habeat admixtum. Debet is etiam probè fermentatus esse, sic enim minus adstringit, aut obstruit. Ex auibus conueniunt sicciore, uelut perdicæ, turturæ, turdi, merulæ, & similes. Ex terrestribus, caprea, lepus. E' mansuetis & cicuribus, pulli gallinacei aſi, extreme suum partes. Ex aquaticis, cancri fluxiales. Oua etiā assata profunt. Olerū rarus sit usus. Quæ uerò eis exhibētur, acriora sint, & extenuandi calefaciendiq; ui prædita: uelut est apium, petroselinum, daucus, eruca, pulegium, brassa, allia cocta, cepæ, porri capitati. A leguminibus uerò abstinendū in totum. Pro liquamine utantur aceto cum pipere, cinnamomo, & similibus. Sales sint ex fœniculo, hyssopo, rosmaryno, apioq; compositi. In potu tantum præbendū, quantum ad frāgendam aliquo modo sitim sufficit: suprā modū enim incommodat hydropicis plurimus potus. Bibendū autem uinum tenue, & quod urinam ciet. Dulcia uerò uina, & mulsum, uitanda. Acetum uerò mirificè illorū sitim restinguit. Porro maximam quoq; ciborū partem in cœna accipiant. Plurimos fructus, & secundas mensas uitent. Concedenda tamen nuces, amygdalæ, mala punica, pira cocta, & carica. Omnia tamen sumant moderatè, nec quotidie. Lectus non ualde mollis sit, præsertim eorum qui anasarca laborant. Substernantur autem herbæ resiccantes, uelut est pulegiū, calamintha, origanum, & similia. Mirum est enim quantū huiusmodi resiccent per somnum, ut constet iam quosdam frumenti accruis obuolutos & absconditos à somno surrexisse firmos. Exercitationes etiam, si æstas & dies serenus fuerit, in sole fiāt, capite tamen uelato. Sin frigus sit, in domibz.

mibus per subiectum ignem concalescentis, aut iuxta ignem. Expedit uerò in primis equitatio, & huc atq; illuc in sella circumferri. Cæterum pedibus si per vires laborantis fieri potest, deambulare multum, & quandoq; currere, quàm gestari, satius est. Obuoluendi etiam ægri in pellibus sole ustitis, aut in arenam calidam defodiendi. Post exercitia sudores per linthea asperiora extergantur. Optimè quoq; conducit, si quotidie ter quater uel frictione utantur. Hæc enim meatus conuenientes aperit, humores quoque desiccant, extenuant, atque dissolvit. Valde itaq; celeriter & sudores elicit plurimos, & carnem cogit. Perfricandi uerò sunt manibus aridis, aut ex sale in aqua aut oleo calefaciente trito. Posthæc cum aqua aluminosa, aut sulphurea, aut salsa lauandi. Nonnullis enim qui anasarca correpti fuerunt, & huiusmodi balneis assueuerunt, ea ipsa ad deterrendum morbum, tum ad habitum ualentiores reddendum suffecerunt. Atque hæc uictus rationem speciebus aquæ inter cutem communem commorasse satis sit. Quantum uerò ad curandi rationem attinet, omnium hydropicorum commune remedium statim initio est humoris redundantis euacuatio. Hæc uerò nunc per uenæ sectionem, nunc per purgantia, & per ea quæ urinam mouent medicamenta perficitur. Quæ autem speciatim huic uel alteri conuenit speciei, in sequentibus docēbimus capitibus in quibus particulatim singularum curationes persequemur.

Curatio cōmunis.

De anasarca. Cap. XXXIII.

IN anasarca quidem totius corporis moles, & uniuersa Signa caro, ut dictum est, instar spongiæ madida & laxa apparet, atq; adeò totum corpus intumescit, ac mortuo simile euadit. In ea curandi ratio à sanguinis detractioe aspicienda, maxime

Curatio
Venz se-
tio.

maximè si mali origo ex suppressis hæmorrhoidibus aut mē-
 fibus existit, & uirtus atq; ætas permiserint. Hac nanq; ra-
 tione plenitudo quæ infestat exhauritur, & languētis natu-
 ra exonerata alacrior fit, & mali causa minuitur, ac dea-
 Purgatio. inde minore negotio redit sanitas. Prauis humoribus p san-
 guinis missionem detractis ac uacuat, ad purgantium me-
 dicaminum præsidia ueniendum. Quòd si tamen extenuatio-
 ne ac humorum ad expulsionē præparatione opus sit, deco-
 cta & alia quæ suprà in capitibus De iecoris tum imbecil-
 litate tum obstructione dicta sunt, exhibeantur. In quem sanè
 usum etiā serapia ex absinthio, intubo satiuo latifolio, eupa-
 Purgantia torio, & byzantino propināda. Purgantia uerò medicamēta
 simplicia. simplicia sint rhabarbarum & agaricum. Composita autē,
 catapotia de rhabarbaro, de hiera simplici, de agarico, &
 similia. Initio etiam hierapicra conueniet, quòd hæc ipsa ob-
 structiones auferat, ac uisceribus robur addat. Cauendū igitur
 unice erit, ne ualidiora, quæq; nullum robur iecori adij-
 ciunt medicamenta purgantia exhibeantur. Quin infestans
 humor sensim & paulatim per leuiora medicamenta educē-
 dus. Semel enim & confertim euacuantes, mirificè uires de-
 ijcimus, iccurq; refrigeramus. Singulis igitur septimanis al-
 uus subducenda, semperq; à mitioribus ad ualentiora sensim
 transeundum. Conuenient itaq; antidota diaphœnicôn & m-
 di in hac hydropis specie. Præclarè etiam purgat radix sam-
 buci in uino decocta. Prodest itidem & ebuli radix: eadem
 Radix sam-
 buci.
 Robur ad-
 dentia ieco-
 ri, & urinæ
 mouentia. namq; utrarumq; uis est. Porro reliquo curationis tempore,
 quo purgantibus medicamentis abstinet, exhibenda quæ ie-
 cori robur addūt: quorū multa suprà ubi quæ ratione eius-
 dem tum imbecillitas tum obstructio curanda essent, docui-
 mus, dicta sunt: & quæ urinam mouere possunt. In quæ usum
 non absurdè antidotus diarrhodôn abbat, aromaticum ro-
 faceum,

faceum, dialacha, diacurcuma, pastilli de eupatorio, rhabar= Tritura.
 baro, absinthio, theriaca, & similia exhibebuntur. Caterum,
 unice proderit hoc medicamentū, quod habet: Specierū dia=
 curcuma, dialachæ, utrarūq; ÷ 1. specierū diatriasantalōn,
 diarrhodōn abbatis, utrarūq; 3 ℥. specierū aromatici rosac.
 ÷ 1. rhabarbari selecti 3 ℥. seminū intubi satiui latoris, me=
 lonū, fœniculi, sing. ÷ 2. absinthij, chamæmeli, cassuthæ, sin= Aliā.
 gu. ÷ 1. nucis moschatæ, iunci odorati, spica nardi, sing. ÷ 5.
 sacchari cādidißimi 3 1. misceātur sing. fiatq; tritura. Mirifi=
 cè quoq; confert hoc, quod accipit: seminum carei, fœniculi,
 anisi singul. ÷ 2. seminum cumini, & hiperici, utriusq; ÷ 1.
 seminum ammeos petroselini, dauci, smyrnij, singul. 3 ℥. ra=
 dicum iridis & asari, utriusq; 3 1. absinthij ÷ 1. glycyrrhizæ
 3 1. sacchari æquale omnibus pondus. Commixtis singulis for=
 metur tritura. Et sanè danda opera ut in anasarca magis sint
 sicca quàm humida medicamenta, propter totius uidelicet
 corporis habitum aquosiorē. Porro extrinsecus planè adhi=
 benda sunt ea medicamenta, quæ humores desiccare possunt,
 ut sunt cataplasmata, emplastra & unguenta, aliāq; quibus
 desiccandi facultas inest. Conuenit ita cataplasma ex hor=
 deacea farina, fabaceaq; fœnogræco, radice ebuli, baccis lau=
 ri, absinthio & origano in uino decoctis confectum, & toti
 uentris capacitati impositum. Item stercus bubulum conue=
 nienter resiccatū, nō ineptè cum posca, aut oxymelite impo=
 nitur, infarcta ac sup infusa sulphuris quarta parte. Caseus
 quoq; recens multum coaguli habens, optimè ad omnes tu=
 mentes partes impositus facit. Deniq; stercoris colūbini &
 caprimi, buphthalmi & chamæmeli æquales partes tuse, in
 acerrimo aceto et melle coctæ adhibeātur. Emplastris insup
 utēdum ex fermēto, caricis, nitro, iride, meliloto, salvia, pule=
 gio, cardamomo, sulphure uiuo, baccis lauri, staphyde agria,
 sale

Extrinse
 cus quæ ad
 mouēdame
 dicamenta,

Cataplas
 ma,

sale ammoniaco, mastiche, thure, abrotono, aristolochia rotunda, fino columbino, cū oxymelite cōpositis. Verūm ceratū pinguius & resinosa, utpote quæ inflent, & tumores, eo quod diffationē impediunt, distendāt, unice uitāda sunt. Debent tamen crura, manus, aliæq; corporis partes in tumore sublatae in sole, aut iuxta ignem, hoc medicamēto crebrò inunguntur, quod habet: Vnguentū agrippæ ꝛ i. axūgiæ suille ꝛ i. f. farina rūs seminis lini, fœnogræci, fabarū, hordeaceæ singul. ꝛ 2. seminum alibæ, nigellæ, dauci, singul. ꝛ 1. f. sulphuris uiui ꝛ 3. boli armenie ꝛ 2. radice iridis ꝛ 2. f. aluminis scissi, thuris ntriusq; ꝛ 1. f. euphorbiꝝ ꝛ 1. oleorum irini, liliorū alborum, chamemelini, singul. ꝛ 1. f. cum cera quod satis est, singatur unguentum, quo liquefacto ad prunas creberrimè partes tumide illinantur. Quæ ad uictus rationē attinent, ea ex præcedenti capite sunt petenda.

De asite. Cap. XXXIII.

Signa. IN asite uenter totumq; abdomen intumescit, eoq; cōcussio talis auditur sonus, qualem uter aqua non omnino plenus reddere solet. Reliquæ uerò partes corporis, superiores præcipuè, minimè inflantur. **Victus.** Victus ratio in hac aquæ intercutem specie sit ex montanis auiculis, & alijs concoctu facilibus, & bonum procreatibus succum, ut dictum est supra **Curatio.** cap. 32. Curandi ratio à purgatiuum medicamētorum usu aspiciabitur. Sint autē talia, qualia capite præcedente commemorauimus. Reliqua uerò omnia superat brassica marina, quā Soldanā & Soldanellam hodie uocāt, in potu assumpta. **Brassica marina.** **Soldanella** Hec enim in educenda hydropicorum aqua mirificum ostendit effectum: ita ut non pauci solius eius usu sanitati sint restituti. Dantur ex ea drachmæ duæ, plus aut minus, pro corporis diuersitate, in uino, aut lactis sero. Conferunt etiā plurimum

rimum catapotia de sagapeno, & drachmæ duæ aut tres suc-
 ci radicis iridis, adiectâ sacchari uncia una. Clysteres etiam ^{Clyster.}
 adhibendi acres, nisi uenter sua sponte humescat: tunc enim
 exiccare ipsum magis conuenit. Inter alios autem is potissi-
 mum cōmendatur, qui habet: Florum daphnoïdis 3 2. radicis
 polypodij, agarici, utriusq; 3 1. f. cassuthæ 3 3. decoquantur
 in uino aut aqua, donec tertia pars absumatur. Deim accipe
 iuris decocti colati lib. 1. benedictæ laxatiuæ uocatæ 3 1. anti-
 doti indi 3 2. f. mellis rosacei 3 1. olei rutacei, chamemelini,
 irini, singul. 3 1. salis fossilis 3 1. f. commisceantur omnia, &
 fiat clyster. In eundem usum colocynthis, cartamus, bacca
 lauri, semen anisi, ammi & carei, ruta, radix cucumeris syl-
 uestris, alijs quibusdā adiectis, si uidebitur, decoqui possunt.
 Post prædicta auxilia, uētri uniuerso aliquod ex præscriptis
 cataplasmatibus & emplastris imponatur. Adhibeantur etiam
 inunctiones, urinam & sudores mouētia auxilia, atq; exerci-
 tia, de quibus ante copiose diximus.

De tympanite. Cap. XXXV.

IN hoc uitio uenter inflatur distēditurq; & cōcussus tym- ^{Signa.}
 pani sonitum edit: reliquæ uerò corporis partes emacian-
 tur. Victus rationem prioribus speciebus similem requirit, ^{Viāus.}
 in ea tamē præcipuē uitanda sunt omnia flatuosa. Exercitia
 etiā multa, & sitis ingens egrotantibus strenuē succurrunt,
 auxilianturq;. Curationis initium à purgantibus medicamē- ^{Curatio.}
 tis, quorum copiam in superioribus inuenient studiosi, esto.
 Ceterum non temerē etiam clysteres, quibus flatus discutiē- ^{Clyster.}
 di facultas inest, infunduntur, qualis est qui accipit: Radicū
 apij, sceniculi, utriusq; 3 1. seminū anisi, sceniculi, dauci, smyr-
 nij, petroselinij, cumini, singul. 3 2. carei 3 3. rutæ, asari, folio-
 rum ebuli, meliloti, singul. m. 1. bulliant in aqua ad tertias,
 x deim

dein accipiatur iuris decocti colo trās fusi ꝯ 12. hieræ picræ, benedictæ laxatiuæ, utriusq; ꝯ ʒ. antidoti de baccis lauri ꝯ 3. oleorū rutæci & anethini, utriusq; ꝯ 1. ʒ. salis ꝯ 1. ʒ. Commiſceatur, fiatq; clyſter. Danda quoq; ſic affectis ſunt quæ urina mouet, atq; ijs quæ flatuſ diſcutiūt tā intrinſecus quàm extrinſecus utendū, quorum copiā in capite De coli doloribus ſtudioſi reperiēt. Vēter certè quotidie panico, milio, ſale, furfuribus, folijs rutæ, chamæmeli floribus, cinere calido, ſacculis, inſutis ſouendus. Poſteſt et imponi ceratū, quod habet: Florū chamæmeli, meliloti, ſing. 3 1. ʒ. mentaſtri, ſatureiæ, aſari, ſing. ꝯ 1. ſeminū aniſi, ſœniculi, rutæ, cumini, dauci, ſingul. 3 1. cardamomi ꝯ ʒ. myrrhæ, caſtorij, utriusq; ꝯ 1. olei rutæci ꝯ 3. olei anethini ꝯ 1. ʒ. reſinæ & ceræ quod ſatis eſt, fiat ceratū. Cucurbitulæ præterea leues, cū multa flāma, crebrō toti uentri in fixæ mirificè conducunt. Venter deniq; aſpero luteo tantisper dum rubor excitetur, perfricandus. Intrinſecus utendū antidotis dianiſi, diacummi, & lauri baccis: uel iſta quæ habet, Specierū dianiſi, diacumini, utriusq; ꝯ 1. ſpecierū antidoti de baccis lauri 3 1. ſpecierum diagalangæ 3 ʒ. ſeminū aniſi, carei, dauci, ſœniculi, ſingu. ꝯ ʒ. foliorum rutæ, ſeminum apiij, ſmyrniij, ſingul. ꝯ 1. ſacchari ꝯ 6. diſſoluti in ſtillatijs liquoribus ſœniculi & apiij, ſormentur morſuli. Reliqua remedia ex capite De coli doloribus petenda.

De renibus cruentam urinam excernentibus. Cap. XXXVI.

Cauſæ,
Imbecillitas
renum.
Amplitudo
oſculorum,

Renum nonnunquā malū accidit, in quo tenue ſanguinis ſerū mingitur. Eū uerō propter renum imbecillitatem, urina ſubinde ſecernere nequeuntium. Aut propter amplitudinē oſculorum, ex uena caua urina ad renes excolantū. Quum enim ampliores ac patētiores meatuſ fuerint, quid

quiddā etiā ex sanguine uenæ emittunt, aliāq; itidē crassa. *Sæ.* Circuitus
 pē etiā renes iuxta circuitus quosdā sanguinē excernūt, simili *quidam.*
 modo ut ex hæmorrhoidibus fieri cōsuevit. Quidā deniq; san- *Venæ ru-*
 guinem ex renibus excernunt, propter uenæ rupturā in reni *ptura.*
 bus factam: ueluti cōtingit ijs qui graue onus leuarunt, aut *Erosio.*
 ualde saltarunt, aut ex alto ceciderūt, aut aliud quippiā tale *Signa imbe-*
 uiolentum pertulerūt. Aliquādo autē & ob acres ē supernis *cilitatis.*
 defluentes humores erosio uenarū euenire solet. Porro si ma- *Amplitu-*
 lum propter renum imbecillitatē accidat, sanguis qui excer- *ditinis oscu-*
 nitur, serosus admodū est. Sin propter osculorum amplitudi- *torum.*
 nem, tum nihil dolēt. Si certis circuitibus excretio sanguinis *Circuituū,*
 fiat, tum uel plenitudo totius corporis, aut cōsuetorū exer- *Rupturæ*
 citiorū neglectus, aut mēbri cuiusdā resectio præcessit. Quod *venæ.*
 si ob uenæ rupturā eueniat, tunc sanguis copiosissimē excer- *Erosionis,*
 nitur. Sin ab erosione, tunc sensim & paulatim excernitur,
 dolorq; renes excruciat. Curabis itaq; eam cruenta urinæ ex-
 cretionē, quæ propter renum debilitatē, aut amplitudinem
 osculorum urinas ad renes excolantium accidit, quiete, ci-
 bis adstringentibus, potionē uini nigri, & alijs quæ in capi-
 te De cruento spūto sunt comprehensa. Ab ijs uerō potissi-
 mum quæ urinam cient, & à coitu omnino abstinendum.
 In potu autem præter ea quæ capite iam citato dicta sunt,
 exhibendum symphyti maioris radicis decoctum, & traga-
 cantha in uino nigro macerata. Sistit etiā sanguinis ex reni-
 bus eruptiones cornu ceruini drachma una ex uino. Folia
 itē salicis trita cū uino, lysimachie succus, lapidis hæmati-
 tis drachma una, radicis spinæ albæ, & polygoni decoctum.
 Bolus denique armenia drachmæ pondere sumpta. Serapiū
 rosaceum, myrtinum, pastilli de succino, de terra lemnia, &
 de spodio nominati. Ouillum præterea lac unicē commen-
 datur, si ieiuno ʒ 4. quibus drachma una boli armenij com-

Localia. mixta sit, propinetur. Extrinsecus autem renibus & lumbis imponantur ea quæ ad sanguinis per sputū reiectiones, & in capite. De dysenteria, alijsq; sanguinis eruptionibus descripta sunt, & quæcunq; unâ cum eo quod adstringunt & siccant, robur etiâ addere possunt: qualia sunt rubi folia & quercus, glandes, myrti bacca, malicoriū, balaustia, & similia. Posthæc habitus corporis cibis boni succi, lacte, & animalium carnibus suillis quoq; , at macris, reficiendus est, ut uniuersum corpus ad pristinas uires reducatur, & renes corroborati propriū munus obeant, & serosum humorē à sanguine secernant atq; excolent. Caterū si renes secundū circuitum sanguinē excernunt, aut propter uenæ rupturā, aut erosionē acrium ē supernis defluentium humorū, tunc statim uena quæ in cubito est eiusdē lateris secanda erit. His quidē qui per circuitus sanguinē excernunt, paulò antè circuitū, reliquis uerò statim à principio. Sanguinis tamen detractio nē partiri melius erit, ut paulatim eius reuulsio & auersio fiat. Loci autē circa renes spongijs posca imbutis cooperiatur, aut lanis succidis cum rosaceo & aceto. Post hæc unguenta, emplastra, & cerata locis paulò ante citatis descriptis, imponantur. Commodè quoq; cucurbita adhibetur, præsertim si suspicio sit inflammationē adesse in ijs, q ob uenæ rupturā sanguinē mingunt. Conueniunt etiâ potiones suprâ in capite. De sputo cruëto cōmemorata. Aeger interea etiâ à falsis & acerbis omnibus arcendus. Vbi uerò iam sanguinis excretio cessauerit, uictus ratione utendū est, unde non multus sanguis gignatur, maximè in ijs q per circuitū excreuerunt. Supernæ quoq; corporis partes assiduè exercenda. In ijs uerò qui ob uenā ruptā sanguinē mingunt, si exulceratio in locis relinquatur, ipsam post sanguinis suppressionē curabimus per ea quæ in capite De renū exulceratione dicitur.

De renū

Derenum inflāatione. Cap. XXXVII.

Renes plurimis de causis inflammatione corripitiur. Causæ.
 Nam & humores corrupti, & plagæ, & attritiones,
 & medicamentorū potiones inflammationē eorundem pro=
 creant: præsertim autem equitationes assidue & uehemē=
 tes. Accedit agris dolor pulsatilis retro iuxta primam dorsi Signa
 uertebra, paululū supra spurias costas. Dolor uerò sursum
 usq; ad iecur distendit, præsertim dextro rene malè affecto.
 Deorsum uerò usq; ad uesicam & pudendū, lumbosq; &
 coxendices, pectinem item & fœmorā. Consequitur etiam
 stupor propinqui cruris. & neq; rectā erigi possunt, neque
 pedibus ingredi. Et siue sternutatio, siue aliqua alia concus=
 sio irruat, uehementi dolore lancinantur. Frigent eorū ex=
 tremā, & magis suræ ac pedes. Adest urinae emittēdæ diffi=
 cultas, minguntq; assidue ac laboriosè: initio quidem tenuia
 & aquosa, in quibus nihil subsidet: inflammatione uerò in=
 peius proficiente, rubicundiora: deinde etiam crassa & mu=
 cosa, adsuntq; febres uehementes. Quòd si amplius inflam=
 matio augeat, hæc omnia fiunt uehementiora. His accedit
 nausea, & stomachi morsus, uomitusq; bilis. Quidam uerò
 ipsorum usq; ad animi deliquiū angūtur & exudāt. Sistitur
 ipsis uenter adeò ut inflentur, & assidue ructus emittāt. Se=
 quitur fastidium uehemens, & quibusdā continuæ fiunt ex=
 acerbationes: quibusdā uerò per interualla. In uniuersum
 autē uentris egestio, & urinae multæ excretio dolores ipsos
 præcedunt. Aegrū in lecto mollissimo decumbere oportet, Victus,
 ac primo die à cibo abstinere, non tamen in multos dies in=
 etiā extendere. Vrinae enim puriores & acriores per in=
 etiā redditæ, uehementissimos morsus infligunt. Itaq; in princi=
 pio sorbitionibus tenuibus morsus leniētibus nutrire oportet, ut

tet, ut est ptisanæ succus, aut hordei alica. Malua etiā inter o-
lera summè cōfert. Potus sit aqua decocti cinnamomi. Quid
Curatio. multa? uidetur ratio sit tenuis, et talis qualis in alijs inflāmatio-
nibus. Quod ad curādi rōnē attinet, initio statim detrahendus
sanguis est. Secāda uerò erit uena, Gal. in lib. De ratiōe curādi
per sanguinis mīssionē teste, quæ in poplite est, aut certè quæ
in malleolis, idq; in crure è directo renis patiētis. Interdū etiā
eodē autore, mīssio ex cubito sanguini auscultāt, ubi uidelicet
Localia. recens fuerit phlegmone, copiaq; sanguinis affuerit. A uenæ
sectione ad localia uocata progrediendū medicamenta, cata-
plasmata uidelicet, fomenta, linimenta, emplastra, & similia
quæ mediocrē refrigerādi & leniendi uim obtinent, ex oleis
rosaceo, cotoneo crū, chamæmelino, farinis hordeacea, faba-
cea, fœnogræci, lini semine, & similibus, quæ in capitibus
De iecoris & lienis inflāmatione dicta sunt, parata. Quod si
per ea quæ extrinsecus admouentur, dolor non leuabitur, cū-
cubita lumbis ac illijs est adhibenda, & fissuris impactis plu-
rimus sanguis est extrahendus. Deinde spongiarū fōtu uten-
dum, & alijs quæ dolorē leuare possunt. Cauendum autē uni-
cè, ne hoc tēpore ea quæ urinā mouent medicamenta bibenda
dentur, Galeno etiā nostro monitore, qui lib. 13. The. meth. ne
idipsum fiat, studiosè & diligēter prohibet: obledunt enim
uehementer, mordaces humores inflāmatis partibus indu-
cendo. Cauendum quoq; à purgātibus medicamētis erit ini-
tio inflāmationis. Clysteribus tamen mollibus, potissimum
si uēter nihil deiecerit, ex maluæ decocto, aut seminis lini, &
fœnogræci, aut succo ptisanæ cōfectis, adiecto oleo uiolaceo
aut chamæmelino. Verum cauendum ne magna copia infun-
datur, quod alias intestina repleta & distenta renes compri-
mant. Ceterum ubi perfectè iam sedata ac concocta fuerit
inflāmatio: id quod cognoscitur omnimoda doloris remis-
sione,

fione, tunc etiā per urinam prouocātia purgādum erit. A cō
coctis enim inflammationibus urinae prodeūt multae & cras
sae, ac in ijs quod subsidet bonum est, atq; adeò morbū pror=
sus iudicat. Quae autem sint medicamenta urinam mouentia,
diximus lib. 2. De cōpos. medi. cap. 7. Potissimum uerò inter
olera cōferunt foeniculum, apium, & pastinaca probè per=
coctae. Quòd si uerò per praedicta medicamenta malum non
propellitur, & neq; dolor, neq; febris, neq; grauitas horum
usu conquieuerint, urinæq; difficultas ac frequens stillicidiū
ægrū molestauerit, pus hac in parte colligi indiciū est. Tunc
itaq; quā celerrimè suppurationē, ac puris eruptionē ad=
iuuare oportet. Quae in re spongiae aqua & oleo assidue im=
butae proderunt, sōtus gratia admotae. Eundē etiam usum ca=
taplasmata praebēt, quae ex farina hordeacea, fursuribus, fi=
cubus, althea, & similibus supra in capite De iecoris inflā=
matione dictis, constant. In solū quoq; ex emollientibus her=
bis, malua, althea, chamemelo, lini semine, foenograeco, para=
tum descendere summè confert. Quòd si uerò perfecta iam
suppuratione (id quod cognoscitur si febres & dolores mi=
nores fuerint, grauitatis autē sensus circa renē malè affectū
remanserit) ruptura, moretur, in potu exhibenda quae urinā
ducunt, ut est foeniculi, pulegij, origani, & similium decoctū.
Haec enim rumpūt interdum suppurationē, & pus per urinā
expurgant. Quòd si autē usus illorum nihil contulerit, acris=
bus clysteribus aluius subluenda erit, ueluti cucumeris sylue=
stris radicis decocto & diluto, uel alliorum, uel raphani. Ma=
cerare autē haec in muria oportet, parumq; olei admiscere,
quo infusa lubrica reddantur. Haec sanè per clysterem infun=
denda, iubendiq; ægri quò plurimo tempore apud se deti=
neant. Consueuerunt enim sēpē ipsam suppurationem rum=
pere, unā cum hoc quòd uentrem emolliunt. Remorantem

Suppura
tionis notæ

Signa per
fectę suppu
rationis

Rupturæ
factæ indi-
cia,

quoq; rupturam iuuat cuminum cum passo, ruta cum uino mulso. Porro ruptura facta, caruncula parua, oblonga cum urina excernitur. Et si maligna fuerint ulcera, humores foetidi, liuidi & mucosi: si uero non maligna, pus ipsum album, equale, leuc, & absq; odore graui, ac paucū excernitur. Post puris eruptionem lac cum melle præbendum, & alia quæ in capite De renum ulceribus commemorabuntur.

De calculo renum. Cap. XXXVIII.

Causæ.

Renum calculis prouectæ ætatis homines frequentius quàm pueri apprehenduntur. Causa autè generatio- nis horum calculorum sunt assidue cruditates, unde humoris crassi & terrei multitudo coaceruatur, & ardor ignea ue circa renes caliditas, quæ humores adassans, eos cogit, & in lapidem indurat, ad modum toforū qui in aquis reperiuntur, quæ in areis, præsertim balnearū, uasis coquuntur. Cōsistūt autè lapides in renibus iuxta uentriculos ipsorum, aut parui, aut maiores: & aliquando quidē pauciores, aliquando autē plures, & magnitudine, & forma, & colore, & asperitate, inter se differentes. Nigri enim & subalbidi & pallidi reperiuntur. Ex eorum numero rotundi & leues facile excernū-
tur, non item qui alia quacunq; forma præditi sunt, maxime tamē oblongi & asperi difficulter excernuntur. Accedit agris grauis in renibus dolor aculeiq; infixi sensum præbens, tumore tamen nusquam foris apparente. Spina agrè flecti potest. Crus quod è directo est renis patientis, stupet, adest fastidiū & uomitus. Urina circa obturationis principium pauca, & aquosa mingitur. Postea uerò perfecta earum suppressio cōtingit, aliusq; nihil excernit, uerū promptitudines multas ad egerendum facit. Excernitur autem aliquando sanguis, propter uiolentiam calculorum, præsertim asperiorū. Urina
etiam

Lapidū dif-
ferentiæ.

Signa.

etiam arenosam subsidentiam habet, potissimum ubi lapis ex renibus fuerit emotus. Quas singulas serè notas Hippocrates lib. 6. Epid. par. 1. aph. 5. ijs complexus est uerbis: In renē „ dolor grauis, quando cibo replentur inuadit, pituitamq; uo- „ munt. Quum uerò dolores intentiores fuerint, aruginosa: „ atq; tum leuiiores quidē fiunt. Dolore autem leuantur, quādo „ cibo uacui fuerint. Arenæ rufæ subsident, cruentaq; mingūt. „ Stupor cruris quod ē directo est. Hæc ille. Caterum quum Curatio. lapis in renibus obturatus uehementissimos dolores intulerit, ne scilicet sanguinis multitudo, intensioe & dolore in patientē particulam procumbat, in corpore plenitudine laborante & robusto, cōfestim poplitis uena, iuxta Hippocratis loco iam citato consiliū, incidenda erit, eius nimirum Venæ sectio. cruris quod stupet, & ē directo renis patientis est. Qui Purgatio. uerò cacochymia uitiosoꝝ ue humore laborant, ijs purgatio redundantis succi conuenit. Neq; sanè hæc omittenda est, nisi aliud quidpiam id fieri prohibeat. Id quod etiā Hippocrates iubet, dū iuuenes elleboro purgādos esse docet. Quod si uerò sectionē uenæ, aut purgationē adhibere minimè licebit, aluum per clysteris infusionē eluere oportet. Quod tum maximè faciendum erit, ubi multa in intestinis excrementorum copia fuerit. Cauendum tamē unicè erit, ne sint ualidiores, atq; adeò ne aliunde humorum copiam ad intestina trahant, ne meatus urinarij angantur & cōprimantur: sed sint tales, quæ duntaxat excrementa in intestinis detenta uacuare possint, ut est is qui habet: Maluæ, altheæ, mercurialis, trichomanis, parietariæ, singul. m̃. 1. si symbrij cardamines m̃. 1. & se- Clyster. minum petroselini, apij, sceniculi, lini, singul. 3. radices aconiti & 1. & furfuris & 1. ebulliant in aqua iustæ quātitatis ad tertias, & subinde colo transfundantur, accipianturq; iuris decocti & 11. casie fistularis & 1. hieræ picræ & 1. mellis rosæ

Clysterib⁹
crebriori-
bus nō vit-
dum. **cci colati** 3 i. f. oleorum anethini, rutacei, chamamelini, sin-
gul. 3 i. salis 3 2. commixtis omnibus fiat clyster. Nulla tamē
ratione committendum, ut clysteribus, alijs ferē omnibus re-
medijs neglectis, ut pleriq; medicorū hodie faciunt, assiduē
utamur, sed bis aut ter: sic tamē ne ultra consuetum tempus
retineantur. Retenti enim diutius quā par est, cōpressionē
atq; angustiam renum, ac urinariorum meatuum efficiunt,
ut copiosius lib. 2. Paradox. cap. 15. diximus. Porro excremen-
tis alui expurgatis, quæ laxare meatus possunt medicamenta
adhibenda erunt. In quē sanē usum hoc unguento renum et
lumborum regio inungenda, quod accipit: Oleorū anethini,
amygdalarum dulcium, utriusq; 3 2. olei chamamelini 3 i. f.
adipis gallinacei, anserini, utriusq; 3 2. butyri salis expertis
3 i. ceræ quod satis, fiat unguentū molle. Insefionibus quoq;
utendum ex decocto calaminthes, origani, sisymbrij carda-
mines brassicæ, foliorū altheæ, malvæ, et similiū. Aut æger
in solum tepidum aquæ dulcis frequenter demittendus. Fo-
menta item ex fursuribus cum folijs altheæ decoctis loco do-
lenti adnota mirificē conferūt. Cataplasmata quoq; ex sari-
na tritici, seminibus lini et fœnogræci, lupinorum, peuce-
dani radice quā minutissimē trita, et chamamelo parata.
Bonum est et panē passō decoctum circa lumbos ac uentrē
imponere. Neq; temerē quidem fecerit, qui cataplasmata et
alia paulō antē commemorata uesicæ et pestini adhibuerit.
Oportet utrō coaceruatim alia super alia cataplasmata ad-
ferre, priusquam scilicet primum frigescat. Siquidem frigus
contrahit et constringit, atq; adeo in renibus et urinarijs
meatibus lapidem retinet. Quod si non lubet totidem cata-
plasmatis uti, calefactorio alio extrā contegere oportet, ne
refrigerentur: id quod cōmodē fieri potest per saccellos, aut
alia usporatoria quæ cataplasmati imponūtur. Hæc interdū,
idq;

idq; non raro, ad lapidis per urinā eiectionē sufficere solent. Quod si uerò malum non abegerint, ea etiā quæ urinā cient bibēda dabis. *Vrimam* autē multā hæc quæ sequuntur ducunt, *Vrimā ducētia,* acorū, hypericū, petroselinum, oreoselinum, lithospermum, ammi, dauci semen & fœniculi, asarū, radix bryoniæ, & rubiæ tinctorum, cortex radicis capparis, asparagus, & ijs similia. His autē admisceantur ea quæ deducūt ad renes, ut sunt *Deducētia ad renes,* radix penchedani, bryoniæ, apiū, & radícula: itē quæ calculos in renibus cōfringunt & atterūt, siū scilicet, adiantum, bdellium, agni seu uiticis semen, rusci radix, saxifraga, betonica, damosoni radix, ciceris iusculum, radix cyperi, lithospermū, tecolythos (lapidem iudaicum officinæ uocāt) xanthium, altheæ semen & radix, pruni gummi, uermes terreni cocti, & ex marinis spongijs lapilli. Horum singula partim decocta, partim tenuissimè trita præbeto bibenda. Ceterum ea quæ urinam cient ac lapidem frangunt, tunc exhibere conuenit, quum uehementes dolores remittunt: id quod accidit lapide iam trāsimoto, & è sede sua agitato. Quod si tamen obfirmati ac uehementer impacti sint in renibus lapides, plurimus potus uitandus, itemq; ea quæ urinam ducunt. Nam quem secum excrementorum non contemnendam copiam ad renes deducant, sit ut meatus urinarios obstruant, & calculorum è renibus transitum impedian. Fomentis autem & cataplasmatibus, in seſsionibusq; renes & meatus urinarij, ut dictum est, relaxandi. Venter quoq; per infusa leuia euacuandus, ne urinarij meatus comprimantur. Post hæc uerò doloribus aliquantulum lenitis, cucurbitæ etiam utiliter ipsis adhibentur, & præsertim præsius affixæ, inflammatione uidelicet id non impediēte. Adeo enim coaceruatim transmovent sæpè cucurbitæ ipsos lapides, ut repenti dolores suppressant, lapide nimirum in uesicæ amplitudinem trāsueſto.

Quapropter in principio supernè à rene cucurbitæ sunt af-
 figendæ, & ad inguina attrahendæ oblique secundū meatū
 urinariorū situm. Porrò delati ex renibus in uesticam lapi-
 des, & præ magnitudine circa collum uesticæ detenti, sæpè in
 extremū periculū agrū deducunt, tum propter dolorū acu-
 men, tum quod urinā excernere non permittunt. Decubitus
 igitur formā in talibus moliri oportet, ita ut supini collocē-
 tur, & longè altiores coxarum uertebras habeant. Deinde
 multiformiter eos cōmouere, quo omnibus machinationi-
 bus adhibitis lapidem ex ipso uesticæ meatu excidere facia-
 mus: post uerò ægros iubere ut alacriter urinā eijciant, &
 ea eiecta sinere. At uerò ubi lapis non fuerit eiectus, rursus
 mouere, atq; hoc ipsum sæpè repetere. Quòd si hac ratione
 nihil profecerimus, catheter instrumētum proliciendæ urinæ
 aptum immitendū, eoq; lapis à collo uesticæ propellendus, &
 urina educenda. Post uerò per potiones lapidem in amplitu-
 dine uesticæ existentē cōfringere per medicamēta cōueniētia
 annitemur. Si uerò ex uestica quidem excidat calculus, iuxta
 medium autē meatū ipsius pudendi obfirmetur, & uulne-
 rādo exulcerationis periculū inducat, aqua calida paulatim
 ab alto pudendorum partibus donec rubore suffundatur in-
 stillanda, aut pudendum in oleum calidū, quod relaxandi uim
 obtinet, demitendum. Decoctum etiam quoddam ex ijs quæ
 urinam ducunt, plurimū exhibendū est, iubendusq; æger ut
 multam urinam congreget, camq; postea excernat, ac dili-
 gentius expellat. ita enim detractus lapis celeriter excidere
 consuevit. Quū uerò neq; hoc modo eum extrahere licebit,
 secandum erit pudendum, uulnuscūlo supernè iuxta glandis
 magnitudinē incusso. Infernè enim secare non expedit, quā-
 do quidem ferè semper in fistulam proficit, ac postea per
 ipsam fissuram urina excernitur. Lapide tandem amoto
 præseruare

Lapis si cir-
 ca collū ue-
 sicæ detē-
 tus fuerit.

Decubi-
 tus,

Cathetere
 quādo utē-
 dum.

Si lapis in
 medio pu-
 dendī mea-
 tu retine-
 atur.

Præseruare hominem, ne rursus renes lapide infestentur, oportet. Maximi autem ad lapidis generationē præcauendā ^{Præseruatio à lapide,} momēti est cibus boni succi, cōcoctu facilis, & moderatus. Quare cauere sibi ab omnibus cibis duræ substantiæ conuenit, & quæ agrè manducatione atteruntur. Exercitia enim mediocria sint, rarusq; omnis generis leguminū frumentaceorumq; usus, casei itē, lactis, & quæ ex ipso præparantur obsoniorū, uini deniq; nigri, copię carniū, & omniū summatim crassi succi, nimisq; calidorum & acrium. Eos autē quos calculus afflixit, admonere oportet, ut à cœna sæpius uomant, & absinthiū assiduè bibant: & certis tēporibus, si quidem sanguis abūdare uideatur, uenā secent: aut si uitiosi humores coaceruētur, conuenienti ipsorum temperamento purgatorio medicamento utantur. Oportet etiam ipsam aquam per omnem uictum esse purissimam & percolatā. Vinum item tenue, album, neq; ualde uetus: hoc enim urinae ciendæ idoneum. Urinam quoq; ciētibus tum cibis tum medicamentis utendū. Quare indies pastinacam admodum percoctam, foeniculū, sium, pulegiū, & similia edere oportet. Inter medicamēta uerō is puluis multæ est efficaciæ, qui habet: Radicū foeniculi, asparagi, cœnanthes, singul. 3 1. radicis rubiæ tinctorum 3 1. radicis aristolochiæ rotundæ uocatæ, altheæ, utriusq; 3 1. glycyrrhiæ rasæ 3 2. lapidis è spongijs marinis, tecolythi, hoc est iudaici, utriusq; 3 1. seminū ammeos, dauci, oreoselini, saxifragæ candidæ, foeniculi, anisi, lithospermi, singul. 3 1. seminū melonum & citruli excorticatorum, utriusq; 3 1. seminis halicacabi 3 1. helxines seu parietariæ, maluæ, utriusq; 3 1. polij montani, adianti, pulegij, asari, sing. 3 1. sanguinis hircini arefacti & præparati 3 1. bdellij, ammoniaci, utriusq; 3 1. oculorū cancri, cinnamomi selecti, iunci odorati, singul. 3 2. contusa omnia redigātur in puluerē

Puluis ad calculosos renes,

puluerē minutissimum, de quo detur pondus drachmæ unius quarto quoq; die: aut singulis septimanis in aurora ex uino tenui. Porro sanguinis hircini, cuius in prædicto puluere mentio fit: præparationem tradit Aëtius lib. 11. cap. 12. Plura alia remedia dicemus in capite De calculo uesicæ.

De ulceribus renum. Cap. XXXIX.

Causæ.

Signa.

4. Aph. 75

Vicius

Renum ulcera accidunt propter uenarum quæ in ijs sunt rupturam. Item suppurationem inflammationis, & acres ac mordaces humores huc delatos. Deprehenduntur renes exulcerati dolore in lumbis cum grauitate, & sine impedimento urina redditur, id quod in uesicæ ulceribus nō fit. Urinæ quoq; pus cōmixtum reperitur, carnosæ particulis, aut pilis instantibus iuxta Hippocratis sententiā, qui ita scriptum reliquit. Si sanguinē aut pus mingant, aut renū aut uesicæ exulcerationē significat. Et statim posthæc: Quibus in urinam crassa existent caruncula parua, aut ueluti capilli unā exeunt, his à renibus excernuntur. His itaq; apparētibus æger cruditates uitet, & facietatē: Ne qđ igitur crudū in cibo accipiat, & neq; quod egrē cōcoquitur, aut facile corrūpitur, aut inflationes parit. In primis autem ab ijs absteineat quæ facile accescunt. Item omnia acria & feruentia, & quæcunq; bilem gignere possunt, ut est sitis multa, abstinentia, inedia, labor, ira, sollicitudo, exercitatio, uigilia, & immodica condimenta. Vitanda uerō maximē erit immodica equitatio, & omnis uehemens concitatio: non minus tamen ijs perpetuum ocium, & balneorum assiduitas. Utendū pane recenti, & decenter apparato. Carnibus uolucriū montanarū, hædis quibq; & similibus tenerā carnē habentibus. Piscibus saxatilibus, squamosis, in craticula assis. Cancris præterea fluuiales, sorbitio ex pituita, & amyllum cum lacte coctū mirificē cōfert.

fert. Dandū & lac ouis permixtum, iusculumq; gallinaceū pingue. Oua etiam sorbilia per se conueniunt. Ex oleoribus autē malua, intuba, rumices, portulaca & lactuca cōducunt. Omnia tamē hęc cocta: crudi enim nihil, ut dictum est, eger sumere debet. Ex fructibus uua passa nō incommoda est, & nuces pineæ: amygdalæ etiam, decorticatæ tamen, & probe mūdātæ. Multus potus, et meracior uitādus. A frigido quoq; potu in totum abstinendum. Frigidū enim, ut ait Hippocra^{s. Aph. 2c.} tes, ulceribus inimicum. Pro potu utatur uino diluto, ac parum adstringēte: aut lac caprinū, aut ouillum, aut amygdalinum bibat. Coitus nō solum ulceribus, uerum etiam omnibus alijs renum malis insensissimus, potissimū ubi senes, & natura imbecilliores eo usi fuerint. Vitanda ea quæ urinā ciunt. Balnei, ut dictum est, rarus sit usus. Naturales uerō & sponte natas aquas experiri non inutile fuerit, maximē aluminosas, sulphureasq;. Frigida lauare commodissimum est. suprà modum enim ulcerationes agrè sanabiles, tū externas, tum internas destruit. Conferent etiā naturales aquæ post maturā deambulationē potatæ. Curandi ratio, ubi propter acres & mordaces humores ulcera renum accidunt, ab eorundem humorū uitiosorum & erodentium purgatione auspicianda. Qui uerō sic afficiūtur, eos uomitu quoq; uacuare oportet. Vomitus. Non autē ad uitiosos duntaxat humores uacuādos cōfert uomitus, uerum etiā si quis singulis mēsis audacter uomuerit, is renum ulcus, & quicquid inde mali accidere potest, dissoluet: humorum siquidē motum in contrarium auertet. Sunt etiam interea propinanda medicamenta quæ morsus acrium humorū obtundūt, ut est malua, intubum, rumex, portulaca, semē melonum, cucumeris, & cucurbitæ, serapium uiolaceū, rosaceum, nymphææ, & eorundē sacchara. Ceterum uitiosis humoribus uacuatis, aqua mulsæ bibenda, aut decoctum

Curatio,

Vomitus,

Morsus ob
tūdētia me
dicamentis

foeno

foenograci cum melle, aut cucumeris, aut maluae, aut melonũ semẽ cum hydromelitæ. Lac præterea cum melle præbendum, recens multum & calidum: ad ulcera enim purganda cõducit. Serum item caprimũ, decoctũ hordei, uuarum passarum, & glycyrrhizæ, quæ quidẽ, perinde atq; eius succus, mirificè cõfert. Quũ uerò iam purgata & munda fuerint ulcera: quod inde tibi palim fiet, si neq; tectoriũ ulceri obductũ cum urina excretũ apparet, neq; pus excretũ est seculentum, sed subalbum, leue, æquale, & paucum: tũc ea quæ resiccat, adstringunt, & glutināt medicamẽta adhibeantur. In quẽ sanẽ usum datur bolus armenia, gummi, tragacantha, amyllum, terra lemmia, & similia alibi cõmemorata. Præter cætera tamen mirificè cõfert is puluis qui accipit: *Terræ lemmiæ, boli armenia, utriusq; 3 1. f. tragacanthæ, spodij usti, utriusq; 3 1. amyli, nucum pinearum tostarum, utriusq; 3 f. seminum lini, cucumeris repurgati, melonum, singul. 3 2. seminis apij 2 2 sanguinis draconis. Conterantur singula, inq; puluerẽ redigantur tenuissimum, de quo dentur quotidie ægrotanti 3 2. cum lacte recens multo. Porro extrinsecus quæ renes exiccare ac roborare possunt admoueantur emplastra, cerata & unguenta ex oleis rosaceo, myrtino, farina hordei, thure, mastiche, rosis purpureis, similibusq; composita, quorum formulas è superioribus petent studiosi. Plura remedia alia infra in capite De ulceribus uesicæ recensēbimus.*

Glutinantia,

Puluis.

Renes ex-
siccantia &
roborantia.

De diabete. Cap. XL.

Diabete
quid.
σῆλαξος

Diabetes diuturnum est malum circa renes consistens, multam sitim inducens: unde quoq; σῆλαξος Græci idẽ mali nomināt: unā cū hoc quod quicquid bibitur, simul ut & quale assumptum est, per urinam redditur. Quidam hõc malum, ut testatur Galenus cap. ult. lib. De sympt. diff.

urina

urine fluorem, & aquam inter cutē ad matulā uocant. Origo ^{Causæ,} ipsius ex tetricis rerum facultatis imbecillitate cōtrahitur, attractricis uerò tanto robore, ut totū corpus ob immodicū calorē exhauriat. Renum itaq; proprium malum, Diabetes existit, quo uidelicet immodicē humorē appetūt egrotantes, ipsumq; propter debilitatē retentiue in eis facultatis continere nō possunt, sed cum aceruatim in uesicā excernūt. Concomitatur egros pertimax sitis, neq; ulla satietas ex ali- ^{Signa,} cuius liquoris exhibitione contingit: ideoq; assiduē potum assumere coguntur, propterea quod citissimē per urinā expellatur id quod ingestum est. Viscera etiā egrotantibus uidentur, intumescunt lūbi, testes, & coxæ. Quod si amplius adhuc mordēs caliditas in uisceribus augeatur, superior uenter corrugatur, & uenæ in ipso eleuantur, uniuersum habitum gracilem habent, & tabes totius corporis grauis accedit. Ceterū curationis scopus in ijs consistit, ut humorum ^{Curatio,} acridinem obtundamus, sanguinemq; ac cum eo permixtum serosum humorē admotum tardiorē reddamus, & renum intemperie corrigamus. Mox itaq; ubi cœperit malum, non- ^{Si malū recēs fuerit,} dum ad perfectionem progressum, optimū est cubiti uenam secare, & moderatē sanguinem auferre. Utendum etiā mediocriter urinam cientibus quæ uitiatum, inq; renes imbibitum humorem expurgēt. Quod si uerò inueteratum sit ma- ^{Si inueterauerit,} lum, neq; uenæ sectione utendum, neq; quicquam quod urinā mouet exhibendum. Hæc enim corporis tabem & colliquationem, quæ sponte sua in hoc malo accedit, accelerant. Concidunt enim inueteratis uires, & ex uenæ sectione totū corpus acrius redditur, & urinam cientia in ipsis multiplicat, augentq; malum. Maximum uerò ac præcipuum eius mali remedium est, ut quod potatū est statim reuomatur. Sit autem perquam frigidus potus ipse, quādoquidem reliqua etiā

- Vicius.** uictus ratione frigidiorē uti conueniat. Cibi igitur exhibendi boni succi, quiq; difficulter commutari possunt, et mordacitate careāt, aut qui mordacitatē et acrimoniam obtundere ualeāt: ut sunt oua sorbilia, alica ad sorbitionis modū appa-
rata, carnesq; porcinae macra plurimum coctae. Neq; uerō incommodē exhibetur eis caseus recens cōpactus, salis expers, et lac per silices, aut ferrum ignitum scissum, seroso adempto humore. Pro sorbitione etiā ptisanæ succus frigidus probatur. Ex oleribus autē intubum, lactuca, et portulaca. Ex fructibus pyra, poma, mala punica. Inter pisces, saxatiles conueniunt. Vinum bibendum rufum, crassum, aqua amplius dilutum, ad salsuginosorum humorum, qui sitim inferunt, prolu-
tionē. Vinum enim corporis temperaturā ad dulcorem permutat. In potu quoq; exhibendus succus malorum granato-
Medicamēta, rum, succus medicatus ē ribes, aut oxyacantha. Quod ad me-
dicamētorum rationē attinet, polygoni seu sanguinarie suc-
cus rectē ipsis ex uino nigro propinatur. Symphytum item, palmularumq; et baccarū myrti, pyrorumq; decoctum. Se-
rapia rosaceum, myrtinum, et similia. Pastilli quoq; ē spo-
Localia. dio, ex polygoni succo, aut uino nigro propinandi. Extrinse-
cus hypochondrijs, lumbis, et pectini illitiones, cataplasma-
ta et cerata refrigerantia adhibenda: qualia sunt quae ex aceto
rosaceo, polenta, lactuca, lenticula palustri, parietaria, folijs
uitis, portulaca, et similibus cōficiuntur. In quem etiā usum
proderit inunctio ex oleis rosaceo, et myrtino: aut illitio ē
succo solani, aut pampinorū uitis facta. Farina quoq; hor-
deacea, aceto et rosaceo subacta, cataplasmatis modo hypo-
Emplastrū chondrijs imponenda. Ut edū deniq; hoc emplastro, quod ha-
bet: Farinae hordeaceae ʒ ʒ. pampinorum uitis, extremitatum
salicū, bursae pastorie, sing. m. f. corticum granatorū ʒ ʒ. f.
portulacae m. i. seminis cotoneorum ʒ ʒ. rosarū purpurearū
m. i. f.

m. i. f. Ebulliāt singula in aqua, donec ad mellis crassitudinē perueniāt. Deinde addantur olei rosacei & olei myrtini ꝑ. i. denuoq; bulliant, & fingatur emplastrum. Ex iam cōmemoratis potest fieri ceratum, adiectis hypocistide, acatia, bolo armenta, resina & cera. Porro sudores quoq; excitandi erūt, ut scilicet uitiosi humores ad exulationē uertantur. Optima uerò est in dolio facta ex herbis aut alijs rebus calidis euaporatio ad sudandū, eo modo facta, ut caput extra doliū promineat. Vel uis aqua calida plenum pedibus egrotantis inq; lectulo decumbentis admoueat, atq; sudor eliciatur.

Sudorum
euocatio.

De vesicæ calculo. Cap. XLI.

Ceneratur in uesica lapides pueris frequētius quā etia Pueri lapi
te prouectis: uoraces enim sunt pueri & perpetui mo de vesicæ
tus, cibisq; utcunq; oblati ac nociui utūt, & neq; horam magis labo
cibum capiendi seruant certā & ordinatā. Quinetiā prius rāt quā re
quā prior assumptus cibus cōcoquatur, aliū ingerūt. Ideoq; num.
cū uehementius à cibo moueantur, fit ut crudus & inco
ctus in uenas cibus distribuatur. Mollia autē cum sint adhuc
illorū corpora, & quæ faciliē cedāt, ob id obturationē circa
renes non perferunt. Quum uerò crassissima urina in uesicā Cause,
amplitudinē perferatur, ibidē ueluti sex uini & limus aque
subsistit, ac postea propter caliditatē, qua pueri præditi sunt,
desiccata & firmata lapidescit: id quod extrinsecus etiam in
aquis suapte natura calidis, & in uasis in quibus quotidie ca
lescit aqua, accidere cōspicimus. Hinc est quod aquæ impuræ,
& multo limo refertæ, itē quæ duriores & uehemēter frigi
dæ sunt, ladipis in uesica generationē adiuuāt. Duæ itaq; po
tissimæ generationis lapidis in uesica causæ, crassities urinae,
& puerorū calor. Quod Hippocrates etiā lib. 6. Epid. par. 3.
aph. 11. ijs uerbis innuere uoluit: Considerandum, an à mia

„ Etione facta concretio puerulis magis, eò quòd calidiores sint, accadat. In cuius quidē sententiæ explicatione quæ anno-
 Signa, tauimus in nostris commentarijs sanè multa ad institutū sci-
 entia reperient studiosi. Prurunt laborantes calculo uesicæ crebro, & contrectant pudenda, quæ etiā intenduntur, ac
 Curatio, continuò ad mingendum urgentur, stillicidioq; urinae uexantur. Curatio huius mali eadem firè est, quæ renum quum calculo laborant. In eo tamen diuersa, quòd ualidiora requirant
 Lapidis atterentia, medicamenta lapides uesicæ: & quod uesicæ adhibenda sunt, quæ renibus alijs admoherentur. Lapidēs autē in uesica oborti, ijs potissimum medicamentis atteruntur, semine nimirum & radice sceniculi, smyrnij, granis pæoniæ nigris, artemisia, chamæmelo, althææ radice & semine, sio, adianto, rumicis radice, lapidibus spongiarum, tecolytho, lithospermio, rusci radice & semine, lapide qui ab ægris cum lotio eiectus est trito & potato, semine xanthij, cortice capparis, abrotoni semine, hyacinthi, uiolæ albæ, apij, petroselini, & alijs ijs similibus quæ urinam ciere possunt, & quæ in capite de renū calculo sunt commemorata. His coniungendum laudatissimū
 Passer troglodytes, remedium passer troglodytes, qui minimus passerculus est, iuxta sepes & muros uictum quæritans, ut Aëtius & Paulus tradunt, caudam semper subreptam & albo colore retro interpunctam habens, iuxtaq; summum alæ lineamentum cinerei coloris. Hic sanè totus sale conditus, & crudus in cibo sumptus, morbum perfectè sanat. Calculos enim iam creatos per urinā expellit, in posterumq; generari prohibet. Sanguis deniq; hircinus ad calculos cum renum, tum uesicæ præfens remedium est. Nam præexistentes soluit, atq; per urinā excernit, & ut alij amplius nō generentur prohibet, ac dolorē
 Si uesicæ lapis per urinae meatum excerni haud possit, sed illic sunt obturati & impacti, atq; adeò urinae

na suppressionē efficiunt, ægrum supinum decumbere oportet, ita ut coxarum partes magis sursum uergant, indeq; huc atq; illuc multiformiter commouere, quo ex meatu excidat lapis, post uero ita adhuc supinum & positu sursum uergentem mingere iubere. Si uero neq; sic excernere queat, per catheterem instrumentum urinā prolektare: deinde ea quæ lapidem in uesica atterere ualent medicamenta exhibenda. Quod si neq; per hæc curatio procedat, ad sectionē ueniendū erit. Lapide igitur hac uel illa ratione extracto, uictus ratio cōstituenda est eiusmodi, ne subinde renascatur, quam in capite de lapide renum descripsimus.

De sanguinis ex uesica eruptione, & grumis eiusdem. Cap. XLII.

Rumpi nonnunquam in uesica uenam accidit, atq; tum Cause, partim quidē sanguis foras mittitur, partim uero intus condensatur. Sanguine uero condensato, & grumis iam Signa, coactis, æger animo linquitur ac pallefcit, pulsusq; exiguos & obscuros, et densos habet, mœrore angitur, refrigeratur, uiribusq; destituitur. Quū uero grumus aliquādo in urinæ rium meatum inciderit, tum is etiā urinæ excretionem supprimit. Porro quā celerrimē uelut etiam in alijs sanguinis Curatio, eruptionibus auxilium ferre oportet. Quapropter si nihil prohibeat, uenā in cubito secare, partita sanguinis detractio ne cōuenit, ut hac ratione sepē & paulatim sanguis detractus reuellatur. Aegri uero in decumbendo sursum uersus collocentur, & coxendicib. ipsorum leuandis, & simul refrigerandis spongiæ poscæ imbutæ subdantur. Extremæ quoq; partes cōstringendæ, & pectē ex spongijs poscæ imbutis irrigandus. Vrgēte malo summē profunt cucurbitulæ ilijs ac lumbis affixæ. Post irrigationes cataplasmatibus ex polygono, ru-

bo, plantagine, balaustijs. Itē ceratis ex hypocisthīde, acatīa, bolo armenīa, et ijs similibus in capitibus De sanguinis spuato, & dysenteria cōmemoratis. Vesicā infundēdus polygōni, plātaginis, aut millefolij succus, cōmixtis acatīa, bolo armenīa, pastillis ē spodio, et similibus. Inseffus etiā ex cōsimili materia cōstructi cōueniūt. Nam et posca, & lētisci decoctum,

Sanguinem
educētia
medicamē-
ta.

Grumos
sanguinis
dissolue-
tia.

Localia.

Ceratum.

itemq; rubi, ac similiū eis cōuenit. Dandū quoq; in potu me-
dicamēta eductioni sanguinis apta, ut sunt rheū ponticū te-
nuissimē tritū, et pæoniæ grana rubra duodecim, terra lēnia,
hippuris, cētaurij magni radix, thuris cortex, & similia. Cæ-
terū qbus sanguis in uesica, in grumos cogitur, primū ten-
tandū est ut medicamētis cōueniētibus dissoluatur ac diffun-
datur. In potu itaq; præbēda est artemisia, elichrysūm, absin-
thiū, abrotonū, ramēta uitis, raphani semē, leporis aut hœdi
coagulū, unūquodq; cū oxymelite. Imō ipsum oxymeli per se
exhibitū, mirificē prodest: grumos enim dissoluit, ut subinde
paulatim cum urina prodeant. Extrinsecus autē balnea, un-
guenta, irrigationes, & alia quæ relaxandi uirū obtinent adhi-
benda, quæ sanē singula ex capite De renū calculo sunt petē-
da. Præter cætera uerò ceratum hoc plurimum cōfert, quod
accipit: Oleorū liliacci & chamæmelini, utriusq; ʒ 1. ꝑ. cala-
minthæ, cumini, foliorū sambuci singul. ʒ 3. bituminis iudaici,
ci, ammoniaci, utriusq; ʒ 2. coaguli leporis ʒ 3. atrotoni, fari-
næ seminis fœnogræci: utriusq; ʒ ʒ. ambar subalbidū, sperma
cœti uocāt. ʒ 1. cū resina et cera quod satis est, fiat ceratum,
quod pectini imponatur. Quod si hoc modo nihil ꝑficiat,
sed urina supprimatur, necessitatē inducet catheteris adhi-
bendi. Per quē ubi urinā eduxerimus, rursus quæ dicta sunt in
potu exhibeamus, & extrinsecus quæ grumos dissoluit ad-
moueamus. Si uerò neq; sic grumi dissoluantur, ad sectionem,
haud secus quā uesica calculo laborante ueniendum.

De

De inflammatione vesicæ. Cap. XLIII.

Morborum qui circa vesicam oboriuntur grauiſſimus
 & maximè mortalis inflammatio exiſtit. Cõſequun- Signa
 tur ægros hæc ſigna. Febri acuta inſeſtantur, uigilant, delirã-
 tes aliena loquuntur, uomunt bilioſa pura & urinã reddere
 non poſſunt. Durus fit peſten, & pubes cū uehementi dolo-
 re, & egerendi appetētia, ueluti in tenesmo fieri ſolet. Quod
 uerò egeritur tenuè eſt, & ſubſidentiã non habet. Aliquando
 etiã inflationes ſequūtur, & aluus adſtriſta eſt, in teſtimo re-
 cto ab inflammatione ueſicæ cõpreſſo. Sic laborantibus ſi ni- Curatio.
 hil aliud phibeat, citra cunctationē uenã poplitis ſecato, uel
 ex malleolis ſanguinē detrahito. Viſtus quoq; rationē, per-
 inde atq; in alijs inflammationibus tenuem adhibeto. Vino
 deniq; abſtinendum, atq; aqua in qua parum cinnamomi de- Localia
 coctum ſit, utendum. Extrinſecus ea ſunt adhibenda, quibus
 leniēdi ac mitigādi dolores poteſtas ineſt. Quapropter oleo
 in quo anethum, lini ſemen, interdum etiã ruta & althæa in
 cocta ſint, ueſicæ locus irrigandus. Frigida autem & repri-
 mentia medicamenta prorſus admouere nō oportet: idq; pri-
 mum quod ueſica neruoſa admodum ſit. frigidū enim, Hippo- Aph. 18
 crate teſte inimicū neruis. Dein quòd frigida occludāt et ſtrin-
 gant, atq; adeò urinæ ſuppreſſionē, quæ huic malo ſua ſpōte
 accidit, augeant. Poſtremum quòd frigida, ne humores inflā-
 tionē efficiētes diſcutiantur aut concoquantur, prohibe-
 beant. Quare potius mediocriter calida ſunt admouenda,
 quæ quidem dolorem leuare poſſunt, urinæ fiſtulam & mea- Clyſteres
 tum laxare, atq; inflammationē diſcutere. Clyſteribus quoq;
 lenibus ac mollibus aluus ſubluatur, & poſt ſtercorum edu-
 ctionem oleum anethinum, aut tale aliquod, leniendi dolo-
 ris gratia iniſciatur. Præſtat autem & papaueris calycem

simul cum oleo incoquere, & adipem anserinum aut gallina-
 ceum recentē in ipso oleo cliquatum simul infundere. In ue-
 hementiori dolore solutam in oleo anethino drachmā unam
 pilularum de cynoglossa infundere oportet: aut opium cum
 myrrha & croco lane illitum in podicē indere. In decoctum
 itē seminis lini, scenograci, radicis althæe, seminis dauci, &
 similia inuideat aeger, admoveaturq; quo in aqua decocti
 desidens mingat. Vesica enim nō satis robusta est ad ample-
 ctendā expellendamq; urinā: quare ipsum ægrum, aut aliquē
 ex adstātibus scitē ac placidē pectinē premere oportet, neq;
 Fomenta. id ultra modū, ne dolor inde intendatur. Ceterum post cly-
 steres & iniectiones, fomentis etiā per aquā calidā, & oleum in
 Cucurbita. uesticis bubulis aut alijs uasculis semiplenis admotis utendū:
 aut sacculis, ut in capite de pleuritide est ostensum. Quod si
 neq; sic malum cesset, cucurbita unā cum scarificatione locis
 afflictis affigenda erit. Porro abstinentum ab ijs, quæ urinā
 uehementer citant, potioq; multa uitanda. Vbi euidentis decli-
 natio apparuerit, ad ea quibus discutiendi & emolliendi uis
 Catheteris inest, de quibus iam sæpē dictū est, transeundum. Catheteris
 immisio. immisione uestica inflammatione laborante nō facillē utendum,
 in uiris potissimū: cum enim nō nisi laboriosē immittere queat,
 dolores exacuit, & inflammationē auget: uerū in mulieribus
 ipsum adhibere nihil absurdum, breuis enim in ipsis urinae
 meatus existit, & rectā situs, ut citra dolorem hoc molimen
 admittant. Si uerō urinae suppressæ periculum admodum ur-
 geat, necessariō in uiris etiā ad catheteris usum confugimus:
 non sanē quod mali molestiam tollat, sed ut potius urgentem
 urinae suppressionē corrigat, & à præcipiti periculo liberet.
 Post urinae prolestationem rursum ad auxilia quæ dolorē le-
 uant ueniendum usq; quo inflammatio soluitur aut suppu-
 retur. Solet autem sæpē inflammatio repente solui, erysipe-
 late

late iuxta cutis superficiem oborto, & permanēte, neq; rur-
sus intro recurrente. Imò & urina multa eiecta sepè iudica-
tum est malum. Nihilominus tamen etiam si hæc apparent,
ijsdem remedijs insistere oportet: quandoquidē ut plurimum
tensione perfectā oborta, continuæ exacerbationes, fiunt,
& mali constitutio diuturna. At uerò ubi periculosa accessi-
ones cessarint, & morbi constitutio iam fuerit inueterata,
ad unguenta quæ humores ex profundo euocant & transfe-
runt, & ad emplastra quæ cutem rubefacere possunt, trans-
eundum est. De quibus alibi diximus.

De vlceribus vesicæ & eius ceruicis.

Caput XLIII.

EXulceratur vesica aut propter abscessum, aut tuber- Causæ.
culum quod præcessit, aut rupturam, aut fluxionis ero-
sionem, aut aliā similem ob causam. Aegros comitatur dolor Signa.
vesicæ acutus omni quidē tempore, mictionis & excretionis
puris. Et ubi sordida fuerint ulcera, fœculenta simul excer-
nuntur & mucosa, & quæ crassam subsidentia in star farinæ
habent. Interdum autem & pelliculæ tenues in star foliorum
& lanarum cum urina excernuntur. Si uerò serpendo depa-
scant ulcera, subcruenta excernuntur, & saniosa, & fœtētia.
Ad hæc accedunt difficultas emittendæ urinae & pudendi ar-
rectio ac petulantia. Dolor uerò non solū cum urinae meatus
fuerit exulceratus, sed & quum in profundo exulceratio cō-
sistat. Cognoscetur autem num in profundo exulceratio sit,
aut iuxta urinae meatum fistulam ue, ex eo, quòd si amplitu-
dine vesicæ fuerit, dolor circa pubem consequatur. Sin iuxta
ceruicem vesicæ ulcera existant, tempore mictionis tantū, &
maximè ubi mingere inceperint ac desierint, dolor sentitur:
atq; id amplius contingit, si urina sit acrior. Qui hoc malo

affliguntur, ij aut assidue decubunt, aut erecti stare nequeunt, neq; reclinati quiescunt. Ab immenso ac continuo dolore, febribus, uigilijs, & colliqutione perimuntur: alij quidem citius, **Infanabilia** alij tardius. Ceterum **insanabilia**, aut saltē curatu difficillima aut saltē curatu difficilia sunt uescicæ ulcera, tum quia ipsa nervosa est, tum etiam quia ulcera eius urina, quæ natura acris est, assidue cōtingat, atq; adeo erodat, nec glutinare permittat. Et si enim plurima excernitur urina, tamen uniuersa uescica euacuari non potest, sed semper ex urina quippiam in ipsa relinquitur, quod assidue ulcera contingit. Imò cum urinae copia euacuatur, tum uescica contrahitur atq; concidit, ut quod in ea relictum est quantūuis exiguum, id ipsum omnes eius partes cōtingit. Verū cum sæpè etiā præter expectationē quedam eueniant, cura aggredienda est, per quam, si nihil aliud, certè accessorij dolores minuuntur. Primū igitur persuadendū est laboranti, ut decumbat, & in lecto quiescat, idq; maximè ubi febres simul adsunt. Deinde remedia febribus intermittētibz adhibenda. Maximū uerò hic fuerit lactis potus, neq; post ullū aliud remediū secūdo loco id habendum. Nā & asperitates lenit, & ulcerationes eluit, malūq; extergit. Reliqua uerò uictus ratio talis sit, qualis ea quæ in renum exulceratione adhibetur. Per medicamenta etiā agrū cōsolari oportet, ne urina acris generetur, quæ mordeat, & irritet ulcera. Et si quidē cum inflammatione exulceratio cōsistat, cataplasmata ex lini semine, & fœnogræco, aliāq; quæ suprā in capite de uescicæ inflammatione dicta sunt, apta erūt. Porro si exulceratio pascendo serpat, subadstringentia extrinsecus imponēda sunt medicamenta, atq; hæc quidem calida, ut scilicet ob calorem partes circundolitantes leniendo iuuent, ob potestatem uerò ipsorum uicinos locos depascere prohibeant. Sunt autē adstringentia medicamenta, galla, malicorium, alumē, acatia, hypocisthis, & si

Adstringē
tia medica-
menta,

& similia sæpè antea, & alibi à nobis commemorata. Vten-
 dum etiã ijs quæ per catheterẽ infunduntur medicamētis. In-
 fundendum autẽ exulceratis atq; adeò exasperatis locis lac re-
 cens mulctum, aut optimũ rosaceum tepidũ. Si uerò nihil ho-
 rum adsit, aqua dulcissima tepida assidue infundenda, morda-
 citatis potissimum tẽpore instante. Per sedem quoq; ptisanæ
 succus, aut decoctum ex semine lini, cucumeris decorticati,
 fœnogræci, maluæ, aut lac cum rosaceo infundendum. Porro
 ubi clysterem adhibere uis, ei qui uesicam habeat malè affe-
 ctam, non supinum ipsum decumbere oportet: nō enim per-
 mittit uesica infusum intrā transire, utpotè recto intestino
 incumbēs: uerũ in genua pronũ reclinare hominẽ oportet,
 atq; ita infusum adhibere. In hac enim situs figura uesica se-
 cedit, & intestinum laxat, quo infusum assumere queat. Fre-
 quenter autem & in aquam calidam desideat æger, & in de-
 cocta relaxantia: nam hæc dolores leniunt. Atqui ubi ulce-
 ra iam pascendo serpunt, per catheterem in uesicam inij-
 cienda sunt, quæ depastionem sistere possunt: ut sunt aca-
 tia, hypocisthis, terra lemnia, bolus armenia, & alia paulò
 antè commemorata. Quòd si uerò sordida sint ulcera, me-
 dicamenta infundenda sant, quæ expurgandi & abstergerendi
 facultatem obtinent, uelut est mulsæ dilutissima, uel lac cum
 paululo mellis, uel cum cucumeris semine decorticato. Si ue-
 rò acrimonia consequatur & mordacitas, lac recens mulctũ
 cum optimo amylo infundatur, aut pompholyx pluribus
 aquis elota & exiccata, atque subinde cum lacte diluta. Cum
 uerò expurgata fuerint ulcera, iuuare oportet ut ad cicatri-
 cem perducātur, atq; id per inseciss adstringētes, & eiusdẽ
 facultatis emplastra, fomenta, & irrigationes. Cæterum si
 multo tempore exulceratio duret, quemadmodum magna
 ex parte accidit, tunc sanè & exacerbationes, & interualla,
 sine

Figura sit
 in exhibē-
 dis clysteri-
 bus in hoc
 malo.

Si exulce-
 ratio diu du-
 ret,

siue remissiones, ægros apprehendunt. Quare in exacerbationibus, quidem cataplasmata, & irrigationes leniendi uim habentia admoueantur. Remissionis uerò tempore, ijs quæ malum destruere possunt utendum. Pectinem itaque rubefaciencia ac sinapismi imponantur, ac uictus ratione uiribus

Si non mā-
fuescat ma-
lum. reparandis idonea æger utatur. Quòd si non mansuescat malum, crustas circa pubem infligere oportet, aut per medicamenta, aut per ferrum, sinereq; ut multo tempore ulcera se

Dolorē le-
uantia me-
dicamenta. per effluxionem expurgent. Non ineptè uerò medicamenta dolorem leuantia in potu exhibueris, si uehementes instent dolores. In hunc sanè usum, præter cætera quæ alibi produ-

ximus, conueniunt pastilli de halicacabo cum opio. Plurimū etiam exulcerationis dolorem mitigant semen cucumeris, maluæ, papaueris albi, tragacatha, amyllum, nuces pineæ, &

Mixtura, amygdalæ. Potest itaq; hoc medicamentum exhiberi, quod accipit: Sacchari uiolacei 3. seminis maluæ 3 2. quatuor seminum frigidorum maiorum, singul. 3 1. glycyrrhyzæ rasæ 3 1. f. gummi 2. boli armenię 3 f. pastillorum è terra leu-
minia 3 1. cum serapio è glycyrrhiza in unitatē coëant. De eo quotidie in aurora exhibeatur quantitas nucis auellane. Porro in uesticam quoq; iniicienda quæ dolores leuant, & exulcerationem sanant medicamenta.

De stillicidio urinæ. Cap. XLV.

Stranguria **Σ** Τραγγειά Græcis, stillicidium urinæ Latinis dicitur, & nihil aliud est quàm ubi paulatim & guttatim urina destillat, atq; assiduā ad mingendū irritationē facit. Accidit propter urinæ acrimoniā, uel exulcerationē uesticæ, uel abscessum iecoris aut renum, qui ruptus, pure ad uesticā trās lato, propter acredinē eiusdē, assiduā ad mingendum irritationē inducit. Porro acrimoniā esse causam iudicabis, si urinæ

Causæ.

Signa.

si urinae biliosiores sint, totusq; corporis habitus, uel etiam
 reliquæ notæ bilem, testantur, & mordacitas circa uesicā cō
 tingat. Vesicæ autem exulcerationem, perinde atq; renū &
 iecoris abscessum ex notis in superioribus commemoratis co
 gnoscet. Si itaq; ob acrimoniā urinae stillicidiū accadat, tum Curatio.
 sanè exuperantem uitiosum humorē quā celerrimè purga
 re oportet. In quē usum præter ea quæ iam sæpè dicta sunt,
 mirificè confert serum lactis cū casia fistulari, aut aliud me
 dicamentum quod bilem educit. Humore bilioso euacuato, Victus.
 cibis cōtemperantibus, & acrimoniā obtundentibus utendū:
 ut est ptisanæ cremor, malua, portulaca, uiola, cucumeris se
 mina, & eiusmodi. Ab omnibus autē acribus & falsis absti
 nendum, uino præterea, exercitijs, ira, & tarda comestione:
 hæc enim omnia bilem in corpore aceruant. Piscibus uten
 dum saxatilibus, & balneo aquæ dulcis, quod mirificè humo
 res uitiosos cōtemperare solet. In potu plurima aqua dulcis
 calida exhibenda, aut decoctum hordei, cum serapijs uiola
 ceo & rosaceo. Vinum uerò, ut dictum est, nō præbendum,
 nisi dulcius, & dilutum. Optimum est etiā ipsum lac calidum
 potatum. In summa, quod ad uictus attinet rationē utendum
 cibis humectantibus, ac aluū emollientibus iusculis. Cæterum
 æger assiduè ad mictionē cogendus. Si enim acre recrementū
 diutius in uesica moretur, partes ipsas erodit, & exulcerat.
 Quinetiā ad obtundendā humorū acrimoniā medicamentū
 quod in fine capitis præcedētis descripsimus porrigendum.
 In eundē usum præbendum decoctum glycyrrhizæ, aut pul
 uis ille qui habet: Pulvis.
 Seminum melonis excorticati, citruli, cu
 cumeris, sing. 3. seminū cucurbite, portulacæ, lactucæ, sin
 gul. 3. rosarum purpurearum 3. succi glycyrrhizæ, glan
 diū, utriusq; 3. & terātur singula, & fiat puluis tenuissimus,
 de quo detur quotidie pondus 3. & in aurora, ex sarapio
 è gly

Terebin-
thina resi-
na.

è glycyrrhiza aut zulapio uiolaceo aut rosaceo. Suprà mo-
dum etiā cōducit terebinthina resina, lota in aqua stillaticia
rosacea, aut intubi, nucis ponticæ magnitudine, aliquādo dua-
rū trium uel accepta. Hec enim, ut testatur Gal lib. 5. De tuē-
da sanitate, nō solū aluū citra noxā soluit, atq; adeo acres hu-
mores ab urinarijs meatibus auertit, uerum etiā uiscera, renes
potissimum, abstergit. Et fuerūt qui huius tantū usu sanitatē
recuperarūt. Non parum etiā profunt clysteres ex decocto
maluæ, uiolarū, alibæ, foliorū salicis, nymphæ, & alijs su-
prā cōmemoratis parari, adiectis casia fistulari, saccharo,
& oleis uiolaceo & rosaceo. Quod si uerò acrimonia adhuc
augeatur, etiā per colē lac ipsum cū amylo in uesicā inijciē-
dum. In eum etiā usum decoctum papaueris albi inijcere
oportet. Extrinsecus pubes oleis, uiolaceo, nymphæ, adiecta
caphuræ exigua quātitate, inungēda. Si uerò stillicidium uri-
næ ob uesicæ exulcerationē, aut aliā corporis partē malè affe-
ctā, & semper urinā expurgantē accidat, manifestū est illis
priorem curam deberi, sic tamen ut præsens malum haud ne-
gligatur. Curationes autem uniuscuiusq; partis ex proprijs
locis ac capitibus studiosis petenda erunt.

Clysteres.

Localia.

De difficultate urinx. Cap. XLVI.

Disuria.

Causæ.

Signa.



Υσχυρία Græcis, urinæ difficultas Latinis appella-
tur. Et est malū in quo urina egrè & difficulter ex-
cernitur. Fit ob uesicæ imbecillitatē, atq; adeo frigidam eius-
dem intemperiem, quæ actionē eius ledit. Interdum etiā pro-
pter pituitosos atque adeo crassos humores uesicæ cerui-
cem obstruentes accidit. Frigidam intemperiem, si à causa
extrinseca facta est, ex ægri sermonibus cognoscere oportet,
& urinæ tenuitate & albore. At si præter alborē, etiā crassi-
cies in urina appareat, pituitosus humor censendus est qui
uesicæ

uesfica ceruicē, ut dictū est, obstruxit. Frigida intēperies per ea quæ calefaciūt curatur. Cibis itaq; calefaciētib; utendū, Curatio frigida intēperies.
 uino quoq; calido, & condito. Medicamētis præterea urinā cientibus, ut est pastinaca probē cocta, fœniculū, apiū, asparagus, hipposelinū, & similia. Urinā etiā cōmodē cient cancri, & herinacei terreni. Carnem enim illorū exiccare oportet, & drachmæ pondus in potu accipere. Aromatū deniq; decocta in potu exhibēda, aut antidota ex ijs confectis, atq; adeo ab illis denominatis. Præter alia uerò summē cōferunt antidotus diacalaminthes, dialachæ, & diacurcumæ. Theriacæ quoq; in potu data mirificē conducit. Extrinsæcus admodum uenda.
 Extrinsecus petinē oleis calidis, rutaceo nimirū, anethino, liliaceo, scorpio num, & de castoreo fouere oportet. Admouēda etiā fōmētā, Fomenta.
 & sacculi ex chamæmelo, abrotono, betonica, artemisia, ruta, calamintha, sabina, & similibus herbis cōpositi. Aegrum etiā oportet in prædictarū herbarū decoctū desiderare, ac imū uentrē cōtegere, & calefacere. Interdum etiā proderit per sedē earundē herbarum decoctum, oleis admixtis calidis, infundere. Si uerò frigidus & pituitosus humor difficultatem Curatio pituitosi humoris obstruentis.
 urinæ fecerit, tūc oxymelite utendū erit, & decoctis hyssopi, pulegij, origani, thymi, & similiū suprà sēpē cōmemoratorum. Item usus sit quoq; fōmentorū, irrigationum, & sacculorum calidorum, de quibus paulò ante, & in præcedētibus capitibus, diximus. Præterea siue crassus humor, siue calculus, siue grumus, siue aliud eius generis obstruēs urinæ tractum impediāt, catheterem indere ex usu est, nisi particula, Cathetere quādo utā dum.
 quod suprà etiam monuimus, inflammatio impediāt.

De suppressione urinæ. Cap. XLVII.

ΙΣΧΥΡΙΑ Græcis suppressio urinæ Latinis, malum est in Ischuria.
 quo ægris in totū urina supprimitur ac cohibetur. Accidit Causæ.
 hæc

Vesicæ imbecillitas, Crassihumores aut lapis. Tumor præternaturalis. Caruncula aut callus. Grunus sanguinis. Pus. Obtus⁹ vesicæ sensus. Longa vrinæ detentio.

hæc interdum propter vesicæ imbecillitatem, ea quæ in ipsa continentur arctè cõplecti ac exprimere nequeuntis. Interdum etiã obstructo inferiori eius meatu, aut à crassis humoribus, aut lapide impacto. Nonnunquã uerò superuenire solet uel ab inflammatione, uel scirrho, uel alio quopiam tumore præternaturã, angustio rem reddente meatum, uel etiã omnino obstruente. Quandoq; etiã ob carunculam, aut callum in meatu natum. Sanguis quoq; in grumos concretus in uesica, suppressæ urinæ causa existit. Pus item per ipsam uesicam à renibus, aut iccinore, aut alia quapiã superiore parte excretum, urinæ suppressionem efficit, perinde atq; humor crassus atq; lentus. Accidit etiã interdum propter obtusum uesicæ sensum, ut non reddatur urina, citra tamẽ expultricis facultatis lesionem, ubi scilicet proprii eius nerui patiuntur. Sic Galenus cuidã, torpente ob malè affectos neruos uesicæ sensu, suppressam fuisse urinã tradit. Quẽ enim inter dormiendũ non sentiret homo uesicã impleri, ipsa extensa, nihil excernere potuit. Sic sanis etiã quibusdã accidit, aut urgẽtibus negocijs, uel in cõcionibus, uel senatu, uel foro, uel conuiuio: tum enim retenta longo tẽpore urina, extẽditur uesica, atq; urina cohibetur, cõtractrice facultate lesa, propter immoderatã tensionẽ. Imò quantò ipsius uesicæ amplitudo repleta circũtenditur, tantò angustior seipso fit meatus. Quæ omnia fusius prosequitur Galenus lib. 1. De locis malè affectis, cap. 1. & lib. 6. cap. 4. Caterũ si propter uesicæ imbecillitatem fit urinæ suppressio, ex ijs quæ frigidam eiusdẽ intemperiem notis monstrat, cognoscitur. Si à crassis humoribus ex uictus ratione quæ præcessit deprehenditur. Siquidẽ in ocio educatus multis cibis, qui crassos & lētos humores generare possunt, usus est. Si à lapide, ex notis quæ suprà in peculiari eius capite dictæ sunt, agnoscẽdum. Si ab inflammatione, aut alio tumore

tumore, dolore, febre, ac uisu dignoscitur. Vbi ob carunculā ^{Carunculæ aut calli.} aliquam, aut callum suppressio urinae orta fuerit: ex præcedentibus ulceris notis, & ex eo quod traiecto cathetere urina uacuatur, intelligi potest. Immissus etiā catheter in ea uidelicet meatus parte, ubi antea ulcus esse cōiiciebatur, dolorē mouet, fractaq; sub cathetere carne sequūtur cum urinae excretionē & cruor & carnis fragmenta. Si grumi obturatio ^{Grumorū.} nem fecerint, sanguinis præcessit excretio & effluxio. Vbi uero ^{Puris.} pus obstruxit, ex præcedentium noticia scire licebit. Nam uel uesica, uel renes antea malo aliquo laborauerūt, per quod tale tantūq; pus colligi potuerit: aut in parte aliqua renibus superiore fuit abscessus, quo erupto pus in renes, & subinde in uesicā transsumptū est. Reliquæ causæ ē sermonibus egrotantis possunt cognosci. Curandi ratio pro causarū diuersitate uariatur. Si enim propter uesicæ imbecillitatē urinae suppressio contingat, calefacientia, ut in capite præcedenti est dictum, adhibenda erunt. Omnino enim frigida intemperies, quæ actionē uesicæ deiicit, amouēda. Si autē à crassis & lentis humoribus urinae retentio oriatur, fomētis, incesionibus, ac cataplasmatibus ex herbis calidis & incidēdi facultate præditis compositis, similiq; uictus ratione curāda erit. Præterea autē quæ in capite præcedenti De urinae difficultate commemorata sunt ad mali amolitionē unicē confert hoc unguētum, quod habet: Oleorū scorpionis, nardini, liliacei, singul. ^{Vnguētū.} 33. sagapeni, bdellij, opopanacis, singul. 2. pinguedinis anseris, anatis, utriusq; 3. radices helenij 2. pulegij, calaminthæ, utriusq; 3. dissolutis gummi in uino, cum cera quod satis est fiat unguētū. Vesicæ etiā iniiciendum per siringam oleum scorpionū, aut liliacē, aut aliud quod crassos humores dissoluere ac incidere potest. Si à lapide aut grumis ^{Si à lapide aut grumis.} suppressa urina fuerit, curatio ex pprijs capitibus petēda erit.

Lapis enim q̄ meatū urinarīū obstruit, è loco mouēdus, quē admodū dictū est cap. 41. huius libri. Grumi uerò dissoluēdi, ut dictū est cap. 42. Si propter inflāmationē uel aliū tumorē præter naturā urina supprimitur, curatio itidē ex proprijs petenda capitibus erit. Quòd si ob carunculā aut callū retenta urina fuerit, balnea & alia remedia relaxātia, ac urinae fistulā dilatātia admoueantur, quorum formulæ ex capite De calculo renū petātur. Quòd si ita nō procedat, ad catheterū usum cōfugiendū perq̄; hoc ipsum instrumentū immisum urinae plectandæ. Si propter obtusum uesicæ sensum urina supprimatur, irritādo admonere ac excitare eius actionē oportet, & per iniectiones, fomenta, & alia calida medicamēta quæ torporē eius auferre possunt, succurrēdū. Vitanda tamē sunt unicē ea quæ urinā mouent, ne scilicet copia eius uesicæ distendatur, atq̄; adeò cōtractrix eius facultas ledatur. Nītro præterea, aut pediculo uiuo, aut alio quod excretoriā uesicæ facultatē irritare potest, urina prolectanda. Excretoria etiā facultate malē affecta, Galeno lib. 1. De patiē. loc. cap. 1. teste, æger sic figurandus, ut decliuus sit ceruicis uesicæ positus, ac manibus suprà pubē admotis, urina sensim, cōprimēdo tumore præter naturā, expellenda. In sanis autem, quum ob negotiorum importunitatē urina diutius retenta uesicam imbecillam ac debilem rediderit, auxiliari ipsi oportet ambabus manibus suprà pubem, ut iam comprehensum est, admotis, & urina sensim ac paulatim exprimenda.

De exulceratione pudēdi. Cap. XLVIII

Naturalium ac pudendorum ulcera citra inflāmationem oborta, medicamentis indigent quæ uehementer resiccant: cuiusmodi sunt charta combusta, anethum aridum, aloë arida, dum usū, & aloë arida in puluerē redacta, quo sanē remedio

dio uix aliud præsentius reperies. Radix etiam pistolochiæ, quam uulgus herbariorum rotundā appellat aristolochiam, præsens exulceratis pudendis remedium adfert. Porro inter composita quidē medicamenta hoc est efficacissimum, quod habet: Aloës iecinorariæ 3 2. gallæ 3 1. f. sanguinis draconis, ^{Puluis optimus,} boli armenię, pōpholygis, singul. 3 1. radicis pistolochiæ 3 f. myrrhæ 3 1. gūmi arabici uocati 3 2. aluminis usti 3 f. Cōtritīs omnibus fiat puluis subtilis, qui partibus exulceratis inspergatur. Quòd si humidiora ac sordidiora ulcera fuerint, ^{Abstergio vlcis,} primum dilutiore mulsā, mox lacte caprimo abstergantur. Quo peractō, puluere iam dicto utendum, aut lapide hēmātitē, aut thure, aut malicorio, aut lemnia terra, in puluerem redactis. Si simul inflammatio accesserit, hæc primum re- ^{Inflammationis remōtio,} mouenda erit, linteis in aqua stillaticia rosarum purpurearum, aut solani, aut aizoli, aut portulacæ, adiecto oui candido, madefactis, & loco patienti admotis. Reliqua remedia ex alijs petenda capitibus erunt.

De priapismo. Cap. XLIX.

Priapismus, autore Galeno lib. 6. De malè affectis locis, ^{Priapismus,} cap. 6. est quū genitale membrū & in longitudine, & in latitudine augetur, nullo stimulāte ad libidmē aut desiderio, aut acquisito calore. Quòd si pudendi accedat palpitatione, tūc Satyriasis dicitur. Appellationē autē hoc malū accē- ^{Satyriasis,} pit à Priapo, quē suapte natura huiusmodi pudendū habentē finxerūt & pīnixerūt homines. Fit hoc malum, ut eodē in loco testatur Galenus, uel ob arteriarū ora immodicē patētia, uel uaporosum spiritum in fistuloso neruo ortū. Cerebrius tamē ora arteriarū patētia sequitur. Quippe facilius est hæc distēdi, quā flatuosum spiritū in neruo fistuloso generari. Nā calefactis lūbis, par est ut & arteriæ calidiores reddātur, & ^{Causæ,} 2 2 magis

magis etiā pateant ipsorū ora: quamobrē non exiguum tunc spiritus essentiā in fistulosum neruū effundūt, qui paulatim impletus colem extendit, ita ut tota ipsius essentiā in fistuloso neruo consistere uideatur. Aliquando malū hoc accidit ijs qui longo tempore prater consuetudinē à concubitu abstinent: atq; hoc potissimū ijs euenit qui plurimo sanguine abundat, & nō student ut multa exercitatione sanguinis abundantia dissipetur, ut copiosius loco iam citato Galenus ostendit. Qui hoc malo laborant, perinde atque ij qui distensione neruorū correpti sunt dolent: inflatum enim & distentū pudentum conuulsionis modo afficitur. Sic conuulsi celeriter pereunt, nisi confestim eis auxiliū feratur. Quum uerō moriuntur, uentre inflantur, & frigidum exudant. Curadi ratio pro causarū diuersitate uariatur. Si enim propter patentia arteriarum ora, atq; adeò earundē caliditatē malū accidat, protinus uena secta sanguinem mittere conuenit. Quod etiam faciendū crit, ubi malū hoc comprehendit eos qui sanguine abundant, & longo tempore prater consuetudinē uenere abstinent. Secunda uerò est uena nigra, quam mediam etiam uocant. Utendum quoq; uictu tenui, & à uino abstinentū. Cibū autem exhibere frumentaceum paucū, atq; omnino nihil inflantem, & sitim indicere, potuq; aquæ uti cōuenit. Exercitium, frictioq;, spiritibus rectē discutiendis adhibentur. Vacationem etiam per uomitū moliri expedit. Aluum autem obturatam & adstrictā clysteri non admodū acri, qualis est qui ex betæ, malæ, & mercurialis decocto fit, submollire oportet. A purgantibus autem medicamentis in totum abstinendum, ne deorsum trahātur humores. Eadē de causa cauenda quoq; quæ urinæ ciendæ facultatē habent. In summa annitendum, ut ea medicamenta adhibeantur quæ redundantiam euacuare, & sursum trahere, atq; adeò à pu-

dendo

Signa.

Curatio.

Clyster.

A purgan-
tibus in
hoc malo
abstinendū.
Sūma cu-
rationis.

dendo auertere humores posunt. Quòd si diutius malū du-
 rat ac prorogatur, cucurbitulæ cum scarificatione affigendæ <sup>Si diutius
malum du-
ret</sup>
 sunt. Si uerò plenitudo adfuerit, hirudines adhibendæ. Lūbis
 uerò quæ euidenter refrigerant imponenda, ut est solanum,
 portulaca, hyoscyamus, & semperuiuum. Necessariò etiam
 pudendū, & intercapedo inter anum & pudendum ex ali-
 quo succo & liquore herbarum leniter refrigerante illimi-
 tur. Optimè autem facit in ipsis ceratū ex rosaceo optimo
 apparatus, & frigida aqua sæpè elutum, si tum pudendo,
 tum lumbis imponatur. Eius autem cerati quod liquidū uo-
 catur, cōstructionem docet Galenus libro primo De simpl.
 medicament. facult. cap. 6. Et lib. 10. Ther. Method. cap. 6.
 Ceratum hoc confert, quod habet: Cere albe decies in aqua <sup>Ceratum,
liquidum,</sup>
 frigida lotæ quar. 1. caphuræ 3 2. Commixta redigantur in
 formam cerati. Quid multa? adhibenda atque in potu etiam
 exhibenda ea medicamenta, quæ semen extinguere possunt.
 De quibus copiosè in cap. sequenti De profluio seminis di-
 cemus. Porrò supino cubitu conuiescere nociuum, at in la-
 tus decumbere ipsos ex re est. A spectaculis uerò & narra-
 tionibus, ac commemoratione eorum quæ ad uenerem ex-
 citant penitus sunt arcendi. Si malum hoc ob uaporosum
 spiritum in fistuloso neruo natum accidat, ad eiusdem disso-
 lutionem tota curatio cōuertenda erit. Quare ad caput De
 curatione inflationis uentriculi, & coli doloris flatuosi re-
 currendum: illic enim remedium copiam reperire est.

De feminis profluio. Cap. L.

Γονόρροια Græcis, seminis profluuiū Latinis dicitur. <sup>Gonor-
rhoia
Causæ.</sup>
 Est enim seminis præter uoluntatem, citraq; puden-
 di centiginè excretio. Fit propter retentricis in uasis semi-
 narijs facultatis imbecillitatem, aut ob aliud malum, quod

seminariorum uasorum partes eodem modo, quo expultrix secundū naturā facultas mouet: ueluti in comitialibus, & alijs uiolentioribus cōuulsionibus cōtingit. Oboritur autē aliquādo etiā ex seminariorum uasorum fluxione. Semē quod profuit aquosum est, tenue, citra coeundi appetentiā, & ut plurimum: quidem, citra sensum, quandoq; uerò cum uoluptate quadam promanet. Corruptitur hoc malo affectis sensim uniuersam corpus ac gracilescit, præsertim circa lumbos.

Signa. Cōsequitur & debilitas multa, nō ob seminis multitudinem, sed ob locorum principatum. Et si pudendo nō intento euenit, retentricis in seminarijs uasis imbecillitatē sequitur. Si uerò intento pudendo contigerit, conuulsioni quodammodo simile malum erit. Non uiris tantum, sed & foeminis malum hoc accidit, & in foeminis quidē agrē tollitur. Curandi ratio communis est cum ea quæ in omni fluxione adhibetur. Primum igitur in quiete, pauco cibo, atq; aque potu egros adseruare oportet. Deinde etiā lumbos & pubem tegere lanis uino et rosaceo, aut melino madesactis. Neq; uerò ineptæ sunt spongiæ posca imbutæ. Sequētib; uerò diebus cataplasmatibus, emplastris & unguentis ex palmis cotoneis, acatiæ, hypocisthidae, rhoë, & similibus, suprā sæpè cōmemoratis, utendum est. In febribus quoq; adstringētib; ex rubi, plantaginis, myrti, & id genus aliorum decoctis paratis uti oportet. Decoquēda uerò prædicta in uino austero, aut etiā aqua. Ciborū qui agrē corrumpuntur, & difficulter permutantur, & resiccādi uim habent usus sit. Dandum etiā cum cibus ac potu agni seu uiticis, & cannabis semē, præsertim tostū: rutæ item semen & folia, lactuca semē & caules, ac nymphaeæ radix. In potu uerò quotidie pro aqua communi, aqua in qua ferrum sæpè extinctū est præbeatur. In summa, acrium & crū usum & multi uini potum, & oleorum exhibitionem uitare oportet.

oportet, uictusq; ratio uniuersa rescicatoria & adstringens
constituenda est. Ea quoq; medicamenta quæ semen extin- Semen ex-
guunt propināda, ut est agni semen tostū & perfriētū. Folia tinguētia,
item eius & flores, uenerē cohibere creduntur, non comesta
tantū, sed et in potu sumpta & substrata. Portulaca comesta
& lactuca semē potatū, & nymphaeæ radix & semē in cibo
accepta, semē refrigerādo extinguit. Ruta uerò comesta ca-
lore suo semē corrūpit. Calaminthā autē assiduē edētes, gene-
randi potentiā amittunt: id quod similiter & uiole albæ se-
men facit. Cæterum aqua febrorum ferrariorum, in qua ferra-
rum sæpē extinctum est, assiduē potata, citra molestiā immi-
nuit semē. Porro ex iam cōmemoratis medicamentis simpli-
cibus uaria cōponi remedia possunt, hæc in primis tritura
quæ accipit: Specierum diacumini, diacalaminthes, utriusq; Tritura,
3 1. f. seminis agni, rutæ, utriusq; 3 1. calaminthæ 3 2. seminis
lactucæ, portulacæ, utriusq; 3 1. sacchari æquale omniū pon-
dus. Misceantur singula, & fiat tritura, de qua 3 1. aut 3 1. f.
in uino austero diluto exhibeatur. Optimum quoq; esse cen- Lamina
setur, laminā plumbeam lumbis supponere: multum enim re- plumbea
frigerare consuevit. In his uerò qui plumbi duritiē ferre non
possunt, cōsulere oportet, ut ex prædictis paulò antè herbis
quasdā arefactas sibi substernāt. Ad quē usum præter cate-
ras uiticis folia, ruta, calamintha, & rosa ipsa cōmendatur.
Prosunt enim hæc, absq; id qd' renes ledāt. Vehemētes nāq;
refrigerationes eorū quæ lumbis subdūtur, renes iniuria affi-
ciunt. Præterea stratū ipsum nō ualde molle sit. Decubitus ut
plurimū in latus fiat, euitata forma decubitus supina, ne lum-
borum arteriæ inde calefiāt. Post primā autē morbi tēpora
exercitijs ægrum cōmittere oportet, quibus totum corpus,
& præsertim partes laborantes, confirmentur. Bonum etiā Frigidæ la-
fuerit, si nihil aliud impediāt, ad frigidā lauatiōē defugere, uatio,

quod omnem morbum ex fluxione ortum abigere consuevit: atq; maximè, si medicamentaria aliqua qualitate aqua sit prædita. Conuenit item per interualla quædam ijs quæ rubefacere, eaq; quæ in profundo sunt ad superficiem transferre possunt, uti. Omnē in super de rebus uenerereis cogitationē excludere oportet.

De ijs quire uenerereas uti non possunt.

Caput LI.

Causæ.

Qui mariti existunt, et re uenerereas uti ac debitū uxoris bus exigentibus persolvere cupiunt, ignaua uerò et impotentia mēbra, propter frigidā qua laborāt intemperiem, aut aliā ob causam obtinent, ij infernas partes exercere debēt, et cibus calefaciētibus, bonumq; succum generātibus, carnibus nimirum gallinarū, caporum, perdicum, phasianorum, iuuenum columbarum, auicularum mōtanarū, passerum maximè, gallorum testiculis, et similibus uti. Educia uerò nō solum bene nutriētia, sed etiā flatuosa ipsis cōueniunt, ut est cicer, faba, bulbi, porrum, pastinacæ radix et semē, nuces pineæ, amygdalæ dulces, rapi semē, et id genus alia. Oua item perdicis ad uenerē ignauos excitant. Dormiāt in mollioribus lectis, legantq; quæ ad coitum cohortantur, aut lectionibus assideant. Naturalia continuo ex oleis, unguentis,

Vnguentū

alijsq; calefaciētibus medicamentis cōfricent. In quem usum hoc unguēto utendū, quod habet: Olei liliacei ʒ i. f. olei è castorio ʒ f. piperis, nigellæ, pyrethri, singul. ʒ i. myrrhæ ʒ f. euphorbiæ grana ʒ. ceræ quod satis est, fiat unguentum. Cæterum medicamentis etiam quæ seminis copiam efficiunt, ac calefacere possunt, utendum. Inter simplicia ijs potissimum, eruca, sinapi, nasturtium hortense, urticæ semē, ari radix, piper, satyrium, orminum, anisum, scylla, orchis: cuius quidem maior bulbus cum lacte potatus tentiginem cit, minor uerò cum

Simplicia
medicamē
ta coitum
cōcitantia.

cum aqua potatus tentiginē remittit: sceniculū, & anethum. Testes uulpis sicci triti bibiti, innocuā & minime uanā mēbri tentiginē faciunt. Partes etiā scinci renes amplectentes. ad tentiginē pudendorum excitandā bibuntur. Præterea pudendum cerui aridum urito, & de eo pondus drachmæ unius ex uino meraciore præbe. Inter cōposita hoc medicamento uti licebit, quod accipit: Antidoti dianthon, pleres archigi, Antidoti liquidum. diagalangæ, singul. 3 3. diasatyriion 3 6. nucum pinearum, amygdalarum dulcium, pistaciorum, singul. 3 2. satyrii 3 1. radicis ari 3 1. seminum erucæ, urticæ, nasturtii hortensis, singul. 3 1. scinci 3 6. nucis Indicæ 3 1. piperis longi, zingiberis, utriusq; 3 1. scobis pudendi ceruini 3 1. serapij è menta, & sacchari quantū ad excipiendum satis est, fiat antidotum liquidum de quo ante cœnā, aut ieiunis per se, uel ex uino detur pondus drachmæ unius aut duarum.

Deramice. Cap. LII.

Kήλη Græcis, ramex & hernia Latinis, ruptura barba Cele. Raris medicinae scriptoribus dicitur, uarijsq; fit modis, mex. Her-
nia. ac uarias propter adiectiones accipit appellationes. Si enim peritonæo rupto intestina in scrotum deuolūtur, γυντόροκη Græcis, ramex autē intestinorū Latinis uocatur. Quādo λήλη uerò intestina supra in inguinibus herēt βρεωνοκήλη Græcè βρεωνο- ci, ramicē autē inguinis Latini nomināt. Quod si ociosus & κήλη. aquosus aliquis humor in parte aliqua mēbranarū scrotum implicatū colligitur, ὑδροφοκήλη Græcè, ramex aquosus Latine dicitur. Quum uerò intra testīū tunicas dura increfcit λήλη caro, σαρκωκήλη Græcis, carnosus ramex Latinis nūcupatur. Quid multa? ramicis genera nomēclaturā semp à rebus λήλη. opplētibus accipiūt. Proinde si omentū in scrotū descendat, ἐπιπλοκήλη, hoc est, ramex omenti uocatur. Si intestinum κήλη.

2 5 quoq;

ἑπιπλο- quoq; delabatur, Græcè ἐπιπλοὺν τὸ ροκίλιν, id est omenti
εντεροκί- intestiniq; ramex nominatur. Ita ubi uena quæ testiculos nu-
λιν. triunt uaricum more dilatantur, & ultra modū repletae glo-
κροσκι- merantur, Græci uitiū hoc κροσκίλιν, hoc est uaricosum
λιν. ramicē appellant. Ramices intestinorum & inguinis sunt,
 Causæ ra- uel quod peritonæum plus æquo extenditur, uel quod rumpi-
 micis inte- tur. Vtrunq; uerò ex uiolēta quadam occasione precedente,
 stinorū & nempè ictu, aut saltu, aut clamore, aut immensa molis subla-
 inguinis. tione accidit. Aquosus uerò ramex quādoq; ex occultis, quā-
 Aquosus. doq; & manifesta cōtingit causa. Ex occultis quidē, quando
 adauētis uasis in scroto cōtextis, aquosus humor propulsus,
 & sanguini permixtus ad eas partes decubuerit. Ex euidenti
 autem, quum propter ictum collisis aut fractis uasis, sanguis
 subinde alimentiratione defluēs, in aquosam serosamq; sub-
 stantiū mutatur. Colligitur autē humor uel intra tunicā ery-
 throidē, uel exterius inter ipsam & tunicas adiacētes, uel in
 peculiari tunica, tanquā in quādam uesica cōprehēditur. Car-
 nosus sanè ex latente causa nascitur, testiculo fluxionem ex-
 pecto, induratoq; aut ex ictu, aut imperita post ramicis suc-
 cisionē curatione. Reliquorum ramicum causæ ex eorundem
 Reliquorū descriptionibus patēt. Notæ utriq; intestinorum nimirū &
 Signa com- inguinis ramicis, cōmunes sunt. Cōspicius enim in scroto aut
 munia ra- inguine tumor est, qui in exercitijs, itinere, spiritus retētiōe,
 micis inte- alijsq; occasionibus maior quā prius euadit, cōpressus tar-
 stinorū & inguine, alijsq; de quidē recurrit, celeriter autē rursus deuoluitur. Peculiaris
 inguinis. ramicis ad extensionem relati indicia sunt, quod non uniuersa
 Peculiaris ab exten- sione. sim, sed particulatim tēporis spacio, & ob causas quaslibet
 Ex ruptu- reat, intestino quod deuolutum est peritonæo cōstricto. Ex
 ra. ruptura facti ramicis signum est propriū, quod uniuersum
 ab initio intestinum deuoluitur, idq; ob causas uiolētas dun-
 taxat:

taxat: tumor immēſæ magnitudinis, inæqualis, & per ſumma protinus in cute emineat, quod ſcilicet inteſtina extrâ peritonæum elabantur. Aquoſi ramicis cōmunis nota eſt tu- Aquoſi.
mor dolore uacans, firmus, ac ſtabilis in ſcroto, quacūq; tan-
dem occasione nō euaneſcens, ſed in ijs qui modicum cōtimēt
humorē cedens, in illis qui copioſum habēt, non item. Ac in
quibus erythroides tunica humore diſtenta eſt, tumor rotū-
dus paululum, & oui modo lōgiuſculus apparet. His teſticu-
lus in conſpectū nō uenit, ut qui undequaq; ſit implicitus. Si
extra erythroidē membranā ſub darto habetur, per pauca
corpora ſublabitur, teſticuluſq; intrâ notas tactui occurrit.
At ſi humor ex ſuperuenienti coierit, propter cōtractionem
ex omni parte & rotunditatē, tumor alterius teſticuli ima-
ginem exhibet. Et cū aquoſus humor extiterit, tumor cō-
color pellucet: cum ſæculentus, aut ſanguineus, aut rubicū-
dus, aut liuidus apparet. Cū uerō in utraq; ſcroti parte hæ
apparuerint notæ, duplicem ibi ramicem cognosces. Carno- Carnoſi,
ſum ramicem color ubiq; ſui ſimilis cum duritia ſubſequitur.
Si autem tumor in ſcirrhū coaleſcat, nullus nec color, nec
ſenſus adeſt. Si maligni referat naturam, dolor urget puncto-
rius. Cæterū ramicem inteſtinorum & inguinum curamus Ramicis in
hunc in modum. Aegro reſupinato diductis cruribus inteſti- teſtinorum
na ſenſim reducere, atque reducta deinceps idoneis ligamen- & inguinū
tis retinere oportet. At ſi loca ſcroto aut inguini adiacentia curatio.
uehementiſſimis doloribus cum inſlāmatione affligantur, tor-
minaq; & flatus ſuperuenerint, atque adeò inteſtina redu-
ctioni minus obtemperent, emollicentia, ac inſlāmationem
doloremq; leuantia, & flatus diſſoluentia fomenta, linimen-
ta, balneaq; adhibeantur: qualia ſunt quæ ex malua cha-
mæclo, anetho, ſeminibus lini, ſcænogræci, carei, aniſi, cu-
mini & ſimilibus componuntur. Lana quoque ſuccida uino
& oleo

Et oleo madefacta, loca doloribus exagitata foueantur. Re-
 ductis intestinis, conandū ut eadem idoneis uinculis retine-
 antur, impositis primū cercatis aut emplastris cōstringen-
 tibus ac glutinantibus, quale est hoc quod habet: Picis naua-
 lis, mastiches, utriusq; 3 1. thuris 3 2. hypocisthidis, sarcocol-
 le, acatiz, sing. 3 1. f. lapidis hematitis, sanguinis draconis, alo-
 es, singu. 3 2. boli armenie, symphyti radice, gallarū, mali-
 cory, sing. 3 1. uisci quercini 3 1. f. aristolochie utriusq; 3 2.
 rhois, balaustiorū, utriusq; 3 1. sepi hircini 3 2. resine terebin-
 thine, et cere quod satis est. Gūmi prius in aceto aut uino
 dissolutis formetur ceratū, quod in pelle arctis impositū al-
 ligetur, nec ante diē septimū soluat. Interea æger in lecto
 triginta diebus maneat, et a cibis flatuosis abstineat, uinoq;
 copiosiore, motu uehemēti, cursu, saltu, clamore, et id ge-
 nus alijs. Interea autē bibat hoc decoctū, quod accipit: Sani-
 cula utriusq; solidaginis sarracenicæ, ophioglossi, pedis leo-
 nis, eupatori, numularie, singul. in 1. polygoni, clematidis
 daphnoidis, prunellæ, plantaginis maioris, singulorū in 1. ra-
 dicis symphyti maiusculi, cynoglossi officinarū, utriusq; 3 f.
 radice geranii sexti generis 3 6. seminis myrti 3 3. balaustio-
 rū 3 2. foliorū lauri 3 1. f. ebulliant in uino rubeo et aqua
 iustæ quantitatis, denec tertia pars absumpta fuerit. Dein
 colo transfundatur, et sacchari adiectione ius decocti dulce
 reddatur, purificeturq; et fiat potio suauis, de qua quoti-
 die in aurora dētur 3 4. Porro annitendū unicē ne alijs in-
 dure scat. Si enim nimio conatu stercora excernere neces-
 sum fuerit, simul etiā intestina iterū prolabantur. Utendum
 quoq; apta et conuenienti deligatura, ut antea nouimus: idq;
 tum præcipuē ubi occasio aut necessitas motum exigit. Cæ-
 terū rames aquosus p ea quæ calefaciūt et exiccāt medica-
 mētaturādus, ē quorū numero sunt farina fabacea, lauri bac-
 cæ, lini

Ramicis 2.
 quoli cura
 tuo.

ca, lini semen, dauci, althea, nigella, & id genus alia quae in capit. De ascite, & reliquis aquae inter cutem generibus, enumerauimus. Porro chirurgicam praedictorum aliorumq; omnium ramicum curandi rationem è Paulo Aegineta petent studiosi, qui eandem copiosè tradit lib. 6. cap. 62. & sequentibus. Nam eam ijs in libris tractare non est nostri instituti, quare ad uteri mala progrediemur.

De suppressis mensib. Cap. LIII.

Supprimuntur mulieribus menses uel naturaliter, uel praeter naturam. Si naturaliter, hinc deprehendimus potissimum, quòd mulier nulla inde molestia uel totius corporis, uel uteri afficiatur. Aetatis itaq; ratione plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt paucissimis ante decimum tertium, uel duodecimum, plerisq; autem post quartu-
Causae.
Quibus naturaliter menses sup-
primantur.
 cimum erumpunt, ut plurimumq; purgatio ad duos tres uel dies, pluribus ad quinque; alijs ad septem usq; perdurat. De sinunt uerò alijs anno quinquagesimo, aut quinquagesimo quinto, paucis autè ad sexagesimum usq; extenduntur. Steriles etià mulieres, in utero habentes, & saltatrices, naturaliter non purgantur. Nam quicquid in eis est excrementi, exercitationis uehementia absumitur. Et, ut summam dicam, mulieres calidioris temperaturae, ualidisq; exercitijs utentes, & agrestes, parum aut nihil purgantur. Nonnunquam uerò menses praeter naturam, ob nimiam scilicet crassiciem aut gracilitatem, supprimi solent. Pingues enim reliquis magis exangues sunt, minimasq; & angustas uenulas habent, quicq; illis inest sanguis paucissimus, ferè in pinguedinem transit. Graciliores uerò ob diuturnum aliquem morbum extenuatae, nihil prorsus superuacui sanguinis continent. Praeterea menses non profluunt, quibus sanguis uel crassus, uel lentus, uel
Quibus praeter naturam menses detinentur.
 per

per alia loca delatus ac uacuatus fuerit, uerbi gratia per nares, aut sedē. Alijs etiā, quod ē thorace sanguinē multum eiecta= uerint. Alijs, quod ē dissecta uena plurimum sanguinis pro= manauerit, mēses suppressi sunt. Sed et reliqua excretionem genera idem sēpē effecerunt, ut sudoris multitudo, assidui uo= mitus, alui profluvia, ac pustularum omne genus quæ in cu= te efflorescunt. Præter causas nunc commemoratas non rarò etiā menses detinentur propter acutos maximosq; morbos, et ob alimētorum uel paucitatem uel multitudinē. A paucis enim alimentis paululum quippiā cōfestim expirat atq; ex= halat: à copioso autē meatus obstruuntur, et menstruorum excretio intercipitur. Atq; eas ob causas maximè menses sup= primuntur toto corpore malè affecto. Detinētur autem non minus, ubi uterus ipse peculiari uitio cōflitatur: id quod ei accidit interdum propter frigidā, aut calidā eiusdem intem= periem. Nonnunquā etiā propter callum in ore uteri obor= tum, aut carnis excrescentiā, aut pinguedinis copiam purga= tio mēstrua impeditur. Quibusdā etiā statim ab initio mem= brana quādā circa uteri collum aut orificium adnascitur, quēadmodum ijs accidit quæ imperforatæ appellātur. Alijs cicatrices ulcerum, quæ in utero antecesserunt, uasorum ora à quibus sanguis in uterum ferebatur, obstruxerūt. Quibus= dam post abortum uteri ore exulcerato, ac deinceps ad cica= tricē ducto, coitio uel cōpactio superuenit, quæ præter quā quòd aliàs omnes uteri transpirationes prohibet, sanguinis etiam excretionem moratur. Curæ deniq; pertinaces, metus

Signa.

immodicus, et ingens mœror menses intercipiunt. Suppres= sos menses uniuersi corporis grauitas, nausea, fastidium, et horridi quidā discursus, quales ijs quæ conceperūt accidunt, consequuntur. Præterea dolores circa lumbos, fœmora, col= lum, sinciput, et oculorum fundamenta existunt. Item febres

continua, & urinae nigricantes, cum rubra quadam sanie, perinde ac si quis aquae in qua nuper maceratae carnes ablutae fuerunt, fuliginem miscuisset. Nonnullis etiam urina aut diffusculter redditur, aut omnino supprimitur. Causarum diuersitas partim ex habitu totius corporis, partim etiam, idque magna ex parte, de sermonibus agri cognoscitur. Frigidioris tamen temperaturae mulieres ex ijs potissimum dignoscere licebit, quod somnolentiores sint, & ad omnem motum segniores ac colore candidiores, ac ueluti plumbi coloris urina denique aquosa, & ceteris quae iam saepe supra dicta sunt. Pituittam quoque assidue excreant, interdum etiam pituitosos humores euomunt. Calidioris autem temperaturae indicia, iam comprehensis plane contraria sunt. Plenitudinis nota praeter alias, quae ex praecedentibus capitibus colligenda sunt eiusmodi potissimum esse solent, ut quae hac ipsa laborant mulieres menstruum tempore magis grauentur, doloresque uehementiores circa lumbos & pubem sentiant, uenaeque illis in tumorem insignem attollantur. Ceterum curadiratio pro causarum diuersitate uariatur. Si enim frigida uteri intemperies mensium profluuium impedit, cum contrarijs, hoc est calefacientibus tum cibis, tum medicamentis, abigenda erit. Cibos itaque calidos exhibere oportet, uinumque fuluum, odoratum, & antiquum. Exercitia quoque praescribenda, & alia quae corpus calefacere possunt adiuuenda, quorum aliqua paulo post subiungemus. Valent autem praeter alia, pulegium, thymus, calamentum, abrotonum, dictamnus, radix iridis, casia, acorus, asarum, & sauina, e quibus decocta & fomenta parari possunt. Vinum etiam merum calidum post balneum ieiunis propinandum. Sumendis autem ijs medicamentis tempora maxime idonea sunt, alterum quidem cum purgationis tempus appetit, alterum post balneum, fomentationem, aut unctionem, si protinus scilicet bibebit,

Calidioris
tēperaturæ
curatio,

rit, ut calido adhuc & soluto corpori medicamentū occur-
rens vires suas efficacius ostendat. Porro calidiores & pluri-
mum exercitatae mulieres, curatione quidē haud egerent: re-
ctius enim & cōsultius foret ad integrā sanitatē tuendā, eam
uictus rationē præscribere, à qua mulieris corpus ita defici-
catur, ut menstruæ purgationis non indigeret: sed hoc cō-
ceptioni aduersaretur: neq; enim concipiūt quæ nō purgan-
tur. Causa ergo cōceptionis, & quoniā omnes ferè mulieres
inconsultò uictitant, purgationes sunt necessariae. Quare cō-
uenit curationē quoq; subijcere, qua menses ob calidā intem-
periem intercepti euocantur. Mulieres itaq; calidiores, &
quæ plurimum exercitātur, quā maximè humectare opor-
tet uberiore humidiorēq; cibo ac potu: quales ptisanae et alia-
e sorbitiones sunt, & qui ē carnibus agni, hœdi, ac piscibus
teneras carnes habētib. auib. altilibus, lacte, oleribus, lactu-
ca, cucurbita, & ē fructibus ficubus recētibus parātur. Vino
autē utendū ijs candido, nō admodum antiquo, & diluto. Bal-
neis quoq; aquarum dulcium: & ut in pauca rem contrahā,
uictus ratione quæ hecticis adhibetur. Porro si plenitudinis
ratione, qua mulier laborat, menses detinētur, & nihil aliud
prohibeat, à sanguinis missione curandi ratio auspicetur. Se-
cunda uerò uena malleoli aut poplitis, idq; non ante statum
mensium tempus. Neq; etiā inutile erit, si cruribus cucurbi-
tule affigantur. Vacuato sanguine potiones quæ menses mo-
uere possunt, somētationes, balnea, inunctiones, & alia quæ
paulò, pōst subijciemus admouenda. Sin plenitudo nulla fue-
rit, sed qui mensium profluuiā morantur humores crassi ac
pituitosi fuerint, initio uictus ratio extenuans præscribenda,
aliaq; medicamenta quæ prædictos humores incidere, & ad
expulsionē faciliores efficere ac preparare possunt exhibē-
da, cuiusmodi est hoc decoctum, quod habet: Radicū acori,
iridis,

Plenitudi-
nis curatio.

Vitiosorū
succorū cu-
ratio,

Decoctum,

iridis, petroselini, asparagi, singulorum ꝯ 1. seminum apij fœ-
 niculi, rusci, anisi, dauci, ammi, urticæ, singulorum 3 1. cala-
 minthæ, absinthij, utriusq; m̃. f. origani, abrotoni, artemisiæ,
 pulegij, asari, singul. m̃. 1. hyssopi m̃. 1. f. cinnamomi electi 3 1.
 Decoquantur singula in aqua iustæ quantitatis donec tertia
 pars absumpta fuerit. Dein colo trās fufis, saccharo adiecto
 iuri decocti dulcedo concilietur, & albo oui purificetur, ad-
 iectis serapij de calamintha, de hyssopo, & de marrubio, sin-
 gul. ꝯ 1. f. fiatq; potio, de qua quotidie in aurora detur pon-
 dus ꝯ 4. Ea exhausta purgatorium aliquod sumatur medica-
 mentum, quale est hiera picra, diaphœnicon & indi compo-
 sitio: catapotia de agarico, è benedicta, aut ijs similia. A' pur-
 gatione mulieres sunt exercendæ, potissimum deambulatio-
 nibus, & inferiorum partium frictionibus. Præterea fomen-
 tationes & balnea ex chamæmelo, artemisiatenui folia, men-
 tastro, & alijs quæ in decocto præcedenti commemorauimus
 parata, adhibenda. Inunctio quoq; fiat hoc unguento, quod
 accipit: Oleorū liliacei, rutacei, utriusq; ꝯ 1. artemisiæ tenui-
 foliæ, pulegij, calaminthæ singul. ꝯ 1. radice iridis ꝯ 2. hys-
 sopi, origani, utriusq; ꝯ 1. Cum cera quod satis est, fiat un-
 guentum. Post hæc medicamenta quæ detentos menses euo-
 cant, protinus, propter causam suprâ dictam, exhibenda:
 qualia sunt myrrha, castoreum, bacce lauri, rubea timctorū,
 piper, saluia, ruta, sauiua, casia, & alia quæ paulò suprâ, &
 alibi à nobis comprehensa sunt. Vnicè autem hoc confert,
 quod habet: Castorei 3 1. mentastri in puluerem redacti
 3 f. uini ueteris, aut mulsæ ꝯ 4. Misceantur singula, & à bal-
 neo propinetur calidum. Benefacit etiam decoctum pulegij,
 artemisiæ, rutæ, cumini, dauci, saluiæ, anethi, ammi, fœniculi,
 inule, & similiū. Calamintha quoque in puluerem reda-
 cta pondere 3 2. aut sauiua pondere unius drachmæ in uino,

Purgatio.

Exercitia.

Fomenta-
tiones.

Vnguētū.

Menses e-
uocantia.Medicamē-
tum præ-
stans.

aut mulsa pota plurimum confert. Mirificè deniq; cōducunt
 Abſinthite paſtilli è myrrha. Abſinthite autem uinum per totius cura-
 tionis decurſum bibendum. Peſſus etiam in uterum demifſis,
 neceſſitate ita exigente, utendū, qualis eſt is qui accipit. Tri-
 phera magnæ opij expertis 3 1. farinæ erui, nigellæ, rubiæ tin-
 ctorū, artemiſiæ, pulgij, ſingul. 3 1. ſ. ſucci rutæ 3 2. commi-
 xtis omnibus ſingatur peſſus, qui cum lana uel goſipio ſub-
 datur. Et hic qui habet: Myrrhæ, bdellij, ſtyracis, ſingul. 3 1.
 calaminthæ, abrotoni, abſinthij, ſingul. 3 1. Radicum acori,
 rubiæ tinctorū, utriuſq; 3 1. ſeminiſ nigellæ, rutæ aridæ, bac-
 carum lauri, ſingul. 3 2. ſauinæ 3 1. caſtorei 3 1. redigantur
 ſingula in puluerem ſubtiliſſimum, & cum melle, aut triphæ-
 ra, aut mithridatio antidoto quod ſatis eſt excipiantur, &
 ſiant peſſi, qui mulieris pudendo inferantur. Metrenchytiſ
 quoq; utendum. In quem uſum utero inſundimus olea calida,
 Suffitus, nempe irinum, liliaceum, laurinum, & ſimilia. Suffitiſ etiam
 ex ſtyrace, galbano, thure, bdellio, radice ariſtolochiæ, arte-
 miſiæ, garyophyllis, cinnamomo, & ſimilibus paratiſ uten-
 dum. Quorum formulas in libris noſtris De med. cōp. mon-
 ſtrauimus. Euaporandus deniq; uterus odoratiſ rebus, ma-
 iorana, ſerpyllo, calamintha, chamæmelo, pulgιο, artemiſiæ,
 radice iridiſ, & ſimilibus in olla decoctiſ: quam operculo
 perforato operire oportet, arundinemq; aut alium canalem
 foramini inſertum undique circumlinere, ut deinde ſedens
 mulier excepto canali ſoueatur. Proderit etiam, ut mulier
 huic decocto uſq; ad umbilicum inſideat, & inde peſſos pau-
 lō antè memoratiſ ſibi admoueat. Pinguioreſ muliereſ ui-
 ſus ratione curabimur extenuante, exercitijs uelocibuiſ, a-
 lijsq; medicamentiſ quæ exiliuſ corpus reddere poſſunt, ut
 eſt aſſidua uentriſ deiection, unguenta euaporandi uim habē-
 tia, & ſimilia, quæ copioſe traduntur à Galeno noſtro libro

14. The. Meth. cap. 15. Et lib. 6. De tuenda sanitate. Quæcūq; ^{Extenuata} uerò propter gracilitatem non purgantur, siue id per mor- ^{tū curatio,} bum, siue alia ratione acciderit, eas primo reficere oportet, & corpori carnem per conuenientem uictus rationē, aliāq; medicamenta quæ Galenus loco iam citato recēset, restituere. Si enim carnosæ euaserint, bona spes erit menses sua sponte erupturos esse. Quòd si tamen non euenerit, tunc potionibus, fomentis, & alijs medicamentis suprā commemoratis eos euocabimus. Si uerò menses propter aliquod uteri uitium non profluxerint, principio malum quod detentorum ^{Curatio earum quæ ppter uterū} mensium causa fuerit curabimus: quo curato, deinceps ad ^{uitium nō purgantur} mensium prouocationem progrediemur. Curatio uerò uitiorum uteri è suis petenda locis erit.

De redundantibus mensibus.

Cap. LIIII.

Redundare menses in mulieribus dicimus, quando ultra ^{Menses quā} consuetum tempus purgationis magna copia effluxerint. ^{do redundant,} Tempus autem purgationis nullum statum ac ordinatum est. Multis enim ad duos tresue dies, haud paucis usq; ad quintum profluit, alijs etiā, ut dictū est, ad septimū usq; Rarissimè ad duodecimum usq; purgātur. Accidit autē ^{Causæ,} menses supra modum profluere propter aperta aut fracta uasa, uel magna uel parua. Immodicæ etiam purgationes mulieribus oboriuntur interim ob partus grādiore, quæ plerunq; etiam sponte sua cessant. Crebro autem post aborsus uehementilaborāt profluuiū, & præceps interdū periculū affert. ^{Signa,} Amplioribus uasis ruptis aut apertis, cōfertim sanguis promanat. Minoribus uerò apertis, sensim, nec magna copia profluit. Ab erosione si accidit, non solum paulatim, uerumetiā cum maximo dolore effluit. Porro quū immodicè profluxerint

- rint menses, color fædus consequitur, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur prosternitur, uitiatum ciborum tum appetitus, tum concoctio: atq; in totum omnia quæ immodicā sanguinis uacuationē siue ex hæmorrhoidē siue alio
- Curatio.** quopiā sanguinis fluore euenientē sequi cōsueuerunt. In primis igitur artus, & extrema corporis, incipiendo ab alis & inguinibus uinculis excipere oportet. Cucurbitulas etiā leues magnas subter māmillas, iuxta Hippocratis sententiā, affigere cōuenit. Cibis quoq; & potionibus austeris atq; adstringentibus utendum, ut est oriza, & similes. Asis autē potius quā elixis uescatur ægra, carnibus maximē quibus suapte natura desiccādi facultas inest, ut auium montanarū, & agrestium animalū. Motu & uino abstinendū, ac pro eo adstringente aliqua potione utendū, aut posca nō quidē frigida, sed tepida. Porro adstringētia etiā medicamenta simplicia in potu propināda, qualia hæc sunt: balaustiū, hypocisthis, acatia, corallia, lyceū, terra lenia, galla, polygonū, symphytū utrūq; hæmatites, calices glandiū, plātago, oxyacantha, & similia. Composita sunt serapia, rosaceum, myrtinū, pastilli ē succino, & terra lemnia. Mirificē autē in constringendis mēsis ualent hæc catapotia, quæ accipiunt: Terræ lemnie, boli armenie, thuris, mastiches, gallarū, singul. ÷ 2. sanguinis draconis, hæmatitis, utriusq; ÷ 1. cornu ceruini usti 3 1. hypocisthidis, acatie, coralliorum rubeorum, singul. 3 1. balaustiorum, rosarum purpurearum, utriusq; ÷ 2. succini ÷ 1. Excipiantur serapio myrtino, & formentur catapotia, de quibus pondus drachmæ unius, aut 3 1. f. propinquetur. Extrinsecus loca oleis, rosaceo, myrtino, cotoneorum, & uino austero foueantur, adhibeanturq; unguenta, emplastra, cerata, & epithemata adstringētia, qualia multa suprā in capitibus De dysenteria, diarrhœa & liēteria dicta sunt. Infeſſus etiā ex de-
- cocto

cocto paulò autè commemoratorum medicamentorum parati conueniunt. Vti etiam debemus ijs quæ per metrēchyta<sup>Metren-
chyta.</sup> utero infunduntur. In quē usum mirificè cōmendatur succus plantaginis, quo se Galenus quatuor continuis diebus delatū ab utero sanguinē, cum nullo alio præsidio sisti posset, sup-^{sup-}preßisse scribit. Quantitas autem iniicienda, ad cyathi men-^{men-}suram accedat. Idem possunt succi polygoni, aut solani, aut hypocisthidos, aut acatiae, aut similes iniecti. Pessulorū quoq;^{Pessulus.} usus non contemnendus, inter quos is potissimum laudatur, qui habet: Thuris, balaustiorum, gallarum, singul. 3 1. gummi arabici, acatiæ, succini, cornu ceruini usti, singul. 3 2. boli armeniae 3 2. Redigantur singula in tenuissimum polli-^{polli-}nem, & lana rosaceo intincta excepta, in mulieris pudendū immittantur.

De fluore muliebri Cap. LV.

VTeri fluor, qui Græcis ποῦς γυναικεία^{poüs yu-} dicitur, totius corporis expurgati diuturna est destillatio. Tā^{Tā-} vaoud^{vaoud.} lem uerò speciē id quod euacuatur repræsentat, qualē humor^{Causæ.} in corpore superans. Aliud enim rubrum, ueluti sanguinis ichor sanies ue: aliud candidum, quod pituitæ soboles est: pallidū, aliud, quod biliosum: aliud uerò aquosum, quod quidem ferosum est. Atqui si sanguis purus, sicut in uenarū dissectione efferatur, attendendū accuratè est, ne quedā in utero erosio sit excitata. His notis fluor deprehenditur, loci continuè^{Signa.} madent humoribus, colore uariantibus, laborās decolor est, cibum non sentit, eumq; fastidit, obambulādo difficulter spirat, oculos habet prætumidos, nunc cum dolore, nunc etiam citra illum, aut cū exulceratione, aut sine illa, aut inflammata ulceratione, aut sordida aut pura. Causarū uerò diuersitatē, ex colore eorum quæ promanant, ut dictū est, dignosci lice-^{bit.}

Curatio rubri
fluoris,

bit. Quòd si rubro fluore mulier uexabitur initio, ubi etiam
et alia permiserint, ad sanguinis missionē uertamur oportet.
Siquidē multa incōmoda sequerentur, si confestim sanguinis
impetum localibus remedijs reprimere conaremur, hydrops
nimirum, neruorū uitia, aut oris uentriculi, aut capitis. Ab-
lationem uerò sicut in ijs quæ sanguinē excreāt, partiri opor-
tet, ut paulatim prolixiori tēpore auersio fiat. Secunda uerò
in cubito uena erit. Post hæc summitates corporis uinculis
deliganda, et ea omnia admouenda quæ in contrarium flu-
xum auertere possunt. Quare cōueniūt remedia omnia quæ

Victus ra-
tio,

Curatio al-
bi et sanio-
si,

capite præcedēti à nobis dicta sunt. Victus ratio uniuersa sit
adstringēs, et crassitudinē inferēs. Potus sit aqua, aut in ui-
rium defectu uinū crassum et adstringēs. Ceterum fluore
albo, aut seroso infestante, initio quidē resistendum nō est, ut
aliena è corpore excernantur. Neq; etiā præter rationē erit,
quandoquidē id quod effluit à pituita ortum habeat, si medi-
camentum quod pituitam purgat adhibeatur. Terti quoque
corpori auxilia quæ exiccant, quum malum ipsum humidum
sit, admouenda. Exercitationes itaque superiorum præcipuè
partium, et frictiones conducunt. Carnes etiā quibus defica-
candi facultas inest, ut aues montanæ, et agrestia animalia,
deligenda. Initio etiā mali, ea possunt exhiberi medicamenta,
quæ crassos humores extenuant, et subinde per urinā edu-
cunt, ut sunt asarum, fœniculū, apium, et ijs similia iam sæpè
cōmemorata. Transacto principio, utero moderatè adstrin-
gentia applicanda, ut sunt rosaceum et cotoneorum oleum,
et alia præcedenti capite cōprehensa. Abstergentibus etiam
medicamentis utendum, ne scilicet ab humore effluēte ulcea-

Curatio
pallidi &
biliosi fluo-
ris

ratio fiat. Quare aqua calida ingiter serosus humor abluen-
dus. Post absterfionem sordium, oleum rosaceum, aut meli-
num, aut myrtinum illinendū. Pari ratione ubi pallido fluo-

re mu

re mulier laborauerit, initio non resistendum, sed medicamēto bilem educente corpus purgandum. Deinde reuulsioni studendum, alijsq; medicamentis adstringentibus utendum, non neglectis etiā abstergentibus quibus maximè propter effluētis humoris acrimoniam indigemus. Porro ubi fluor cessaue-rit, à ueloci deambulatione, à frictionibus abdominis & lūborum multis, ab esu acrium, à calefaciētibus, & ijs. quæ urina-
nam mouent, diu abstinere oportet.

De uteri suffocatione Cap. LVI.

Suffocatio seu strangulatus uteri nihil aliud est, nisi eiusdem ad superiora retractio. Græcis ὤσφιξις τῷ μίει dicitur. Fit, Galeno libro 6. De malè affectis locis, cap. 5. teste, ob tensionē, quæ creatur à plenitudine, quæ ad menstruum retensionē sequitur. Neq; enim ueluti animal errabūdū, aliās ad alium locum discurrit in mulieribus uterus, sed ab extensione retrahitur. Accidit etiam non rarò, eodē teste, propter cohibitū semē. Nonnunquā etiā ob refrigerationē, quæ utero, tempore quo menstrua effluxerunt purgationes, euenit. Interdum etiam ob difficilem quempia abortum, uel ubi quis sanguinis eruptionē ab utero, repente sistere properauerit. Comitatur hoc malo laborantes, cum accessio propinqua est, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, faciei pal-
lor, aspectus mœstus. Quum uerò iam instat suffocatio, incli-
natio ad somnum, desipientia, detentio instrumentorum sensus, uox obmutescit, cruraq; cōtrahūtur. Pulsus parui ac debiles fiunt, sepè etiam penitus abolentur. Nonnullis quoque spiratio quæ ab ore ac naribus prodit, manente tamen ea quæ in arterijs fit, in totū interceptur. Cum remittit malum, rubescere mala incipiūt, oculi attolli & aperiri. Humiditas etiā quedā à locis muliebribus tactu perceptibilis excurrit,

Strangula-
tus seu suf-
focatio uteri.
Causa.

Signa.

ac intestina immurmurant, ipseq; uterus paulatim laxatur, atq; sic ipsis mens, sensus, & motus redit. Ceterum malum hoc iuxta circuitus mouetur, perinde atq; epilepsia, idq; nimirum utero ut dictum est, repleto aut seminali, aut alia quæ in eo putrescit materia. Vbi autem uterus sua ipsius ratione laborauerit, pro quantitatis uel qualitatis ratione, tum mēstruorū, tum seminis, alias alie symptomatum species oriri solēt. Etenim ledēte causa uniuersum corpus refrigerare potēte, adeo uehementer infrigidatur corpus, ut & spiratio & artierum pulsus sensu deprehēdi nequeant. Quæ si uel crassa fuerit, uel acris, cōuulsiones: si uerò atræ bilis naturā habuerit, mōsticiū inducet: quæadmodū animi quoq; defectiōnes, & ad fortē extēsiōnes, & refrigerationes, & stomachi uexationem sequi cōsueuerūt. Superuenit id mali genus omni quā tēpore, sed præcipuē hyeme & autūno. Eoq; magis corripitūtur iuueniores, & ad uenerē peliues, steriles, præsertim si ui medicamentorū tales factæ fuerint. Præterea multe se ī malo hoc recolligūt, nōnullæ uerò in ipsis accessiōibus subito, aut saltem intra paucas horas pereūt: id quod accidit, ubi pulsus crebriores & inordinati fiūt, ac subinde in totū abolētur. Postremo frigidus & modicus humor superficiē irrorat. In accessiōibus igitur extrema deligare oportet, cumq; deligationibus crura tota, ac uniuersum corpus perfricare, & ueluti animo deficiētes recuperare. Aegrotā autē ceruice & scapulis accliuioribus collocare oportet, fæmoribus uerò et inguinibus decliuioribus. Naribus foetida admouētur, uerbi gratia, funiculus lucernæ nuper exinctus, plumæ, præsertim perdicū, aut lanæ laciniq; cōbustæ, soleæ calciamentorū, alliorū aut ceparū cortices, capilli, præsertim si ipsius ægrotæ fuerint, cremati, uel capræ cornu combustum, pix super carbonibus eliquata, galbanū, castorium, & alia eiusmodi. Reliquis deficiēti

Curatio.

Quæ in accessiōe facienda.

cientibus, matulā ex ueteri locio naribus adhibere licebit, aut pannos sulphuratos ueteres cōbustos. Inferius autē pudenda ex odoratis suffiantur, styrace nimirū, aloës ligno, cinnamomo, garyophyllis & similib. Cucurbitulas quoq; inguinibus & imo uentri cum multa flamma, & leues affigere conuenit. Confestim autē accedēte accessione fomenta, ac sacculi calefacti imo uentri ac pectini imponēdi, quibus uix aliud in huius mali accessione præsentiū auxiliū reperies. Parabis autē Sacculi. eosdē ex artemisia utraq; origano, betonica, chamamelo, calamintha, absinthio, pulegio, seminibus lini, & smyrnij, atq; id genus alijs. Quod si accessio prolongetur, etiā quæ flatibus educendis cōducūt, supponere oportet, quorū omnium formulæ & nomina è capitibus De uētriculi inflatione, & coli doloribus petent studiosi. In uterū quoq; tum unguenta & olea odoratissima infundere oportet: ut est amaricinum, & quod spicacum hodie appellatur, irinum, & similia. In hæc etiam obstetrix digitos intingat, atq; subinde usq; ad uteri os immittat, leniter & multū defricans, ut eo irritamento crassus humor excernatur. Præterea mulier etiam maximis uocibus excitetur, propriūq; nomē inclametur. Hoc etiā tempore ea sunt admouenda, quæ sternutationes excitant, ut est struthiū, castoriū, piper & similia. Sunt qui in seſsionibus ex decocto baccarū foliorūq; lauri, pulegij, calaminthæ, artemisiæ, marubij, ſauinæ, altheæ, chamameli, serpilli, iridis, aristolochiæ, & ſcœnogræci paratis utendum esse putēt. In seſsionū tamen tempore cerebri curā non omittemus, sed rosaceo & aceto caput irrigabimus. Ego tamen fomentis & sacculis potius quā in seſsionibus utendū esse iudico, præsertim cū ut plurimum, quāuis uelis maximè, in seſsionibus in hoc malo locus non sit. Vbi accessio quieuerit, ad uomitum cogātur. Omnes enim uomitus leuat, sed eas præsertim quæ à cibo in seſtātur. Quæ post accessione statim agenda.

In tertio die lumbis & ilijs cucurbitulæ cū scarificatione ap-
 Purgatio. plicētur. A septimo die purgatione utendū ex hiera de colo-
 cynthide, aut catapotijs de agarico: mox ad castorij potionē
 ueniendū, quod iugiter potum ab hoc malo protinus liberat.
 Dandum autē singulis diebus ad drachmæ unius pondus, in-
 terdum cum mulsæ, interdū cum artemisiz decocto, nunc cum
 uino tenui. Hoc sanē tēpore potius quā in accessione, ut di-
 ctum est, in seſſionibus & peſſis emollientibus ex adipe anse-
 rino, styrace, mastiche, ammoniaco, & similibus compositis
 uti licebit. Vterus quoq; ijs quæ calefaciēdi, statumq; educē-
 di uim obtinet, suffitus. Sit autē huius potissimum suffitus
 usus, q̄ habet: Pastillorū galliæ et aliptæ moschatæ, utriusq;
 3 i. f. styracis 3 i. garyophyllorū, maceris, utriusq; 3 i. ligni
 aloës 3 i. cinnamomi selecti, foliorū lauri, utriusq; 3 i. lada-
 ni 3 i. f. Trita in pollinem excipiātur statē, & informentur
 pastilli pro suffitu. Cibo interea & potu paucis admodū cō-
 tenta sit mulier, totaq; uictus ratio exiccatoria sit. Atq; hæc
 Vicius ra- curatio in huius mali accessione adhibēda. In totius uerò
 tio, corporis restitutione, potissimum ubi malū diuturnū fuerit,
 Totius cor- curatio in huius mali accessione adhibēda. In totius uerò
 poris cura tio, corporis restitutione, potissimum ubi malū diuturnū fuerit,
 Purgatio. struæ purgationes detineātur. Deinde ad purgationē ex hie-
 Cucurbi- ra picra transeundum. Peracta euacuatione, cucurbitulæ le-
 tuiz, ues quidē, sed cum plurima flūma affigēde, & uiolenter, de-
 trahendæ. Interdum etiā loca scarificanda, & scarificata sale
 inspergenda, deinde cōuenientibus medicamentis ad cicatri-
 cem ducēda. Nec inutiliter sinapismi, & dropaces ex euphor-
 bio, pyretro, pipere, & sinapi constructi applicantur. Non
 parum etiā recta uictus ratio opitulatur, nempe deambu-
 lationes matutinz, gestationesq; uel in curru, uel in naui, uel
 in iumēto. A gestationis motu uociferatio, et lectio clara, &
 concinna utilis est. Vnctio præterea, frictio, & ex conueniē-
 tibus

tibus intervallis repetita, eisdem conveniet. Balneum aquæ dulcis rarius, & non nisi sordium abstergendarū gratia admittendum. Balneis autem naturalibus uti optimum est, atq; adeò postremum quasi confugium. Præ cæteris autem cōveniunt quæ sunt in Badenia Marchionis.

De uteri procidentia. Cap. LVII.

Procidere uterum dicimus, quādo ita evertitur, ut exte- Prociden-
tia uteri.
rius emineat. Neq; enim uterus, ut imperiti suspiciātur, à suis solutus propagimibus totus decumbit: nam si ita pro-
cideret, restaurari haud posset. Quanquam autē uterus raro Causæ.
procidat, nihilominus tamē multæ procidendi eius causæ. Ab
alto enim delapsa mulier, si in coxas deciderit, mēbranis quæ
uterum cōtinent, ac vicinis partibus cōnectūt, ruptis, eo ma-
lo corripitur. Accidit etiā nonnunquam ut in difficili partu
procidat uterus, propter secundæ scilicet extractionē, quam
uterus qui illi adhæret sequitur. Nonnunquam propter ne-
gligentem aut imperitā fœtus, præsertim mortui, extractio-
nem. Præterea ob ictum, uel immensi ponderis elevationem,
uel animi uehementiorem perturbationē, filiorum nimirum
interitum, aut hostium accessum, uel ob periculosam nauiga-
tionem, aut eiusmodi aliquam causam, omni eo quod in toto
corpore concretum est soluto, atq; adeò utero quoq; simul
elapso. Interdum etiam hoc malū citra iam dictas causas ac-
cidit, tota corporis mole soluta propter resolutionē, aut par-
tium, membranarum scilicet & muscutorum, imbecillitatem:
id quod senescentibus maximè euenire solet. Procidit sæpè
uterus propter humoris plurimi ac tenacis defluxum, par-
tuumq; frequentia laxatis ac solutis appendicibus. Procidit
autem potissimum secundum os eius, & quod procidit ouo
struthiocameli simile est, maioris tantum & minoris ratio-
ne

Curatio.

ne differens. Notis plurimis nihil opus est, quod causarū diuersitas partim ex corporis constitutione, partim etiam de agrotantis & assidentium sermonibus cognosci queat. Quū malum adhuc recens est, studendum ut uterus inscratur, ac in suum reponatur locum. Siquidē initio repositioni prōptē parcat, & locatus perseuerat, præcipuē si ætas conuenerit. Nam in prouectioribus uterus quidem reponitur, sed rursus qualibet leui causa relabitur. Conuenit igitur, si in recto intestino feces & stercora dura fuerint, ut clysteri educātur. Similimodo si in uesica lotium collectū fuerit, per catheterē euocetur, ut undiquaq; uterus sit liber. Euenit enim aliās, ut eorum detentione uterus, qui inter utrunq; rectum in quā intestinum & uesicam medius statuitur, compressus, & intra locorum angustias coactus, in prolapsu suo impediatur, ne repelli & in proprium situm reduci queat. His autem ritē peractis, agram supinam figurare oportet, ut coxas habeat sublimiores, poplites flexos, curibus inuicem dilatatis & diuaticatis, deinde prolapsam uteri partē oleo tepido, uel butyro, uel malux, alihææ, scæno græci, seminis lini, aut similium decocto affatim fouentes, conuolutam lanam præparabimus, figura & crassitudine sinui muliebri proportionalem, tenui & puro linteo exterius circumdatam, ac deinceps in succum acatiæ, uel hypocisthidis uino dilutis mersam utero inseremus, & citra uiolentiam ac sensim totum quod procidit sursum torquebimus, quoad integer in sinu tumor excitetur, & uterus in proprium reponatur locum. Extrinsecus autem pubem spongia in posca expressa operiemus. Mulier uerō iacebit extensis adaptatisq; inuicem cruribus ut alterum alteri incumbat. Tutius tamē erit pedes simul uinciri, fasciam usq; ad genua deducendo. At si prolapsus uterus temporis diuturnitate intumuerit, plurimoq; humore infartus fuerit, ita ut

tumor

Localia.

tumor reductionem impediat, betarum decocto irrigabimus, deinde acetum circumfundemus, salemq; tenuissimum inspergemus: & ubi detumuerit, sicut dictum est, reponemus. Deinde cucurbitæ cum flāma copiosiore, umbilico & utriusque ilibus affigendæ. Naribus odorata iugiter admouenda. Tertio die lana adhuc in sinu persistente, mulier in uino nigro austero, modicè tepido, aut in decocto myrti, rubi, malicorij, & similiū insidebit. His peractis, rursus supina accliuibus coxis locabitur, sublataq; è sinu priori lana, altera in locum prioris eodem medicamento madefacta imponitur. Cataplasmata, etiā & emplastra extrinsecus imo uentri ex palmulis, malicorio, lenticula, & similibus composita imponantur. Cerata etiam ex mastiche, ligno aloës, ladano, thure, iunco odorato, acoro, nuce moschata, gummi, tragacantha, & eiusmodi medicamentis parata conueniunt. Singulis uerò tribus diebus hæc usque ad perfectam curationem permutetur. Toto etiam curationis tempore mulier motum, & ea quibus sternutatio excitatur, euitet. Ceterum uterus ab infernis, foetidis rebus suffiendus est, naribus autem odoratissima sunt adhibenda, quod is odorata sequatur, foetida contra res fugiat. Cibi etiam boni succi, & uina odorata offerenda. Vē- Vicius. ter etiam leniendus ac lubricandus, ne si cum difficultate sit egerendum, simul uterus procidat. Cauendum tamen unicè, ne uenter nimium subducatur: exoluitur enim, elaxanturq; propinquæ partes, & uteri loca procidunt. Porro si pars uteri prolapsa temporis diuturnitate propter incuriam obq; putruerit assiduam urinæ irrigationem & sordes inherentes exulcerata fuerit, amputandum, aut inurendum quod inutile fuerit, nullius metu periculi. Constat enim, Pauli etiam testimonio, totum uterum, eo quod computruerat, ablatum fuisse, ac mulierem superuixisse.

De mola. Cap. LVIII.

Mola qd. **M**ύλη hoc est molam Aëtius & Paulus uocant induratum tumorem, interim in uteri ostiolo, interim in toto ipso prominentē, ad tactum ferē lapidosum, Gal. autem lib. 14. The. me. molā definit esse carnē informē. Nomen à difficultate motus accepit, quā sanē quæ hoc malo premuntur mulieres sentiunt. Fit à seminis muliebris, & plurimi sanguinis menstrui in uteri retentione & affluxu, quem calor immodicus cogit, ac in carnis formā transmutat. Consequitur hoc malum tumor durus cum hypochondriorū contractionē, corporis gracilitate, decoloratione, appetentiæ deiectione, mensiumq; suppressione. Item in hoc malo mamillæ intumescunt, ut conceptionis quibusdam per initia suspicio suboriatur. Temporis uerò progressu discernuntur: molā enim punctionis sensum inferens dolor subsequitur, nec in ea motus ullus, sicut in cōceptione percipitur. Nonnullæ uerò præbent aquæ inter cutem suspicionē, à qua tamen malum hoc distinguitur, quod tumor durus sit, neq; sicut in hydropemauium aut digitorum impulsu cedat, aut excauatur, aut tympani modo sonum edat. Nonnunquā tamen tempore procedente iecur refrigeratur, & hydrops superuenit. Malū hoc magna ex parte insanabile est, nisi initio remedia adhibeantur. Vt cunque tamen accidat, curatio negligenda non est, sed omnia quæcunq; conuenire uidebuntur, adhibenda. Primum uerò omnium alimenta boni succi offerenda, ac uini potione utendū moderata. Mulier uehementi motu non utatur, is enim fluxionē commouet: sed gestationibus, & deambulationibus, & balneis. Pedes quoque decumbendo elatiores habeat. Interea ubi plenitudo affuerit, uena cubiti incidēda erit, ac subinde purgatione per catapotia foetida uocata utendum. Corpore uacuato cataplasmata, fomēta, infusiones, pessi, unguenta,

ta, & cerata quæ relaxandi uires habent admouenda: quæ
 lia sunt quæ ex althea, malua, chamæmelo, meliloto, fœno-
 græco, semine lini, & similibus parantur. In hunc usum non
 alienum erit unguenti dialtheæ, aut emplastri diachylôn sim-
 plicis admotio. Vel adhibeatur hoc quod accipit: Olei amyg-
 dalarum dulcium 33. olei liliacei 32. f. pinguedinis anseris
 & gallinæ, utriusq; 31. f. lenti cremoris seminis lini & fœ-
 nogræci, utriusq; 31. ammoniaci, bdellij, utriusq; 32. radices
 altheæ, seminū nigellæ & dauci, singul. 2. ceræ quod satis
 est, singatur unguentū gummi in uino prius dissolutis. Pessi
 quoq; subiiciendi ex butyro, adipe porcino, medulla ceruina,
 passulis, caricis pinguibus, seminibus lini & fœnogræci, cō-
 fecti. Posthæc quæ menses euocare, possunt propinanda me-
 dicamenta. In quem quidem usum præter ea quæ in capite de
 suppressis mensibus commemorauimus, conuenit hoc medi-
 camentum, quod habet, Specierum diacinnamomi, diagalan-
 gæ, diacumini, singul. 3 f. specierū diambar 2 f. specierū dia-
 lachæ 2 f. cinnamomi selecti, hyperici, calami odorati, asa-
 ri, radices acori, seminis anisi, singul. 2. seminis rutæ, zin-
 giberis, artemisiæ, marrubij, dictamni, saluæ, singul. 2 f. sac-
 chari dissoluti in liquoribus stillaticijs artemisiæ & hyperi-
 ci, quod satis est, singatur morsuli, de quibus quotidie pōdus
 duarum aut trium detur drachmarum. Proderit etiam hunc
 subiicere pessum, qui habet: Radicum assari, acori, rubiæ tin-
 ctorum, singul. 32. seminum rutæ nigellæ, utriusq; 3 f. maio-
 ranæ, nucis moschata, garyophyllorū, baccarum lauri, sin-
 gul. 31. fauinæ 21. castorei, euphorbij, utriusque 2 f. tufis
 & cribratis ijs quæ opus est, cum terebintina resina formen-
 tur pessi. Quid multa? utendum medicamentis relaxatibus &
 dissoluentibus sanguinem concretum, sic enim plurima san-
 guinis atrii & grumescentis excretio sequetur. Mirificè etiā
 ad

zīū.

Pessi.

Morsuli.

Pessus.

ad huius mali amolitionē, potissimum ubi diuturnum fuerit, uti confert balneis naturalibus & per se natis, quibus dissoluendi ac discutiendi facultas inest. Porro multa etiā remedia huc ex capitibus De aqua inter cutē, transferenda erunt.

De inflammatione uteri. Cap. LIX.

Causæ,

Vterus plurimis de causis inflāmatur, nempe ictu, mensium retentione, abortu, ulceratione, concubitu metas rationis excedente, sellæ nimis duræ in seſsione, lōgissima in-

Signa,

tentiſſimaq; de ambulatione, sæpè etiā trāſpiratione, propter frigus, prohibita. Comes inflammationis uteri est febris acuta dolor capitis, pubis & lumborum, & radicis oculorum, brachialis, digitorum & colli cōuulsio, & in aduersum de-
clinationis. Stomachi ex cōsortio dolor, oris uteri conniuentia. pulsus exigui, crebriq;. Si languida fuerit inflammatio, haud ualida prædicta symptomata erunt, maioriq; dolore uterus afficietur. Sin uehemens, & ipse totus pulsatilem dolorē percipit, omniaq; symptomata uehementiora erūt. Vniuerso autem utero inflammatione laborante, undiquaq; dolebit: parte uero eius aliqua inflāmatione obſeſſa, in ea dolor magis intēditur. Nam si posteriora ipsius inflāmatione corripuntur, dolor lūbos magis uexabit, durumq; stercus detinetur, quòd tum rectū intestinū, admodum cōprimatur. Si anteriora, dolor pubē occupat, & urinae stillicidiū aut difficultas, uesica preſſa, excitatur. Lateribus autē inflāmationē expertis, in-
guina tenduntur, & crura grauantur ac difficulter mouen-
tur. Quum autem os uteri inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoq; immisso os occurrit durum, iniucundum,

Curatio,

clausum & feruidum. Initio itaq; curationē aggreſſi, si neq; ætas, neq; habitus corporis, neq; anni tempus obſtiterit, neq; inflammatio post abortum, aut immēſam sanguinis euacua-
tionem

tionem superuenerit, uenam poplitis aut, malleoli secabimus, ^{Vena se-}
 idq; ex Galeni traditione, qui in libro De curadi ratione per ^{ctio.}
 sanguinis missione, uteri inflammationē à uenis in crure se=
 ctis magis quàm in cubito iuuari scribit. Aegram subinde in
 domicilio obscuro, & moderatè calido seu tepido collocabi=
 mus, quietem imperantes, ac crura eius ab omni motu prohi=
 bentes. Deinde artus & extrema perfricabimus, ut floris ad
 uterū impetū auertamus. In cibo, qui quantitate modicus sit, ^{Vitus.}
 utendum ptisanæ cremore, & ouis sorbilibus, uno tamen die
 interposito. Potu uini abstinendum, ac pro eo utendum iure
 decocti cinnamomi, aut aqua calida. Alius quoq; præcipuè
 ubi sua sponte non deiecerit, leuibus & emollientibus clyste=
 ribus eluenda, & uacuanda. Extrinsecus lana ex oxyrhodimo ^{Localia.}
 madefacta, pubi & lumbis imponenda. Palmulæ quoq; , aut
 mala cotonea, in uino decocta, & rosaceo admixta, admo=
 uenda. Cataplasmata etiā ex farina seminum lini, fœnogræci,
 meliloto, plantagine, lentibus polygono, portulaca, sedo, &
 similibus composita adhibenda : idq; potissimum, si erysi=
 pilatis naturam inflāmatio sortita sit. Lana deniq; cum ro=
 saceo, aut melino oleo, aut succo portulacæ, aut sedi madesa=
 cta in uteri sinum immittenda. At ubi inflāmatio declinare
 cœperit, ad ea ueniendum, quæ quadantenus remittendi discu=
 tiendiq; uires habeant. Aegrotā igitur in fœnogræci, altheæ,
 seminis lini, malux, interdum etiā artemisiæ, marrubij, & sal=
 uix decocto usq; ad lumbos sedere iubebimus. Pubi quoque
 & lumbis hordeaceam farinam cum fœnogræco, & semine
 lini in mulsâ elixatam, aut caricarum decoctum illinemus.
 Pesi quoq; subiiciendi ex butyro, medulla ceruina, adipe an=
 serino, gallinæ, & similibus parati. Vbi curatio processerit,
 uarius magis cibus & leuior utilis erit. Et quidem in mani=
 festa declinatione ad balneum etiā ducantur ægrotantes, ui-

numq; aquosum maximè & tenue detur.

De inflatione uteri. Cap. LX.

Causæ.

INflatur uterus ex frigore, uel humoribus in eo corruptis, uel ex abortu uel difficili partu ostiolo eius coniuente, aut grumo in ipso obstruente. Flatus uerò sæpè in cōcauo ipsius spacio colligitur, sæpè in sinu qui sensui patet, nec raro in rarioribus sensuiq; non patentibus partibus corporis ipsius uteri. Malum hoc sequitur tumor ini uētris, cum duricie &

Signa.

dolore punitionis sensum inferente, qui usq; ad septum transuersum & stomachum peruenit: ac nihilominus utrinq; in lateribus extenditur, sæpeq; alteri inguini, interdum utriq; interdum & umbilico lumbisq; ac pectini dolor communicatur, cui caput quoque assentitur. Nonnunquam flatus per muliebrem pudendum erumpit, & ab ægra percipitur. Si itaq; flatus in uteri cavitae collectus fuerit, murmura & sonitus quidā in corporis flexu audiuntur, quales intestinis accidunt, quæ torminibus uexantur, impulsuq; digitorum sonus tympani modo redditur. At ubi flatus in rarioribus uteri meatibus cōtinetur, dolores uehementiores, ac curatu difficiliore

Curatio.

infestāt. Auxiliatur huic malo primū, nisi ætas, regio & anni tempus obstiterint, sanguinis missio, inedia, & purgatio ex hiera picra Galeni. Quibus peractis, fomentis & inunctionibus ex oleo rutaceo, aut oleo in quo anethum decoctum sit utendum. Infectionibus præterea ex decocto rutæ, pulegij, calaminthæ, marrubij, artemisiæ, althææ, & similibus paratis. Cataplasmata quoq; adhibenda ex semine apij, fœniculi, cærei, cumini, smyrnij, dauci, anisi, lolij farina, & similibus. Vtero etiam infundenda quæ laxandi, flatusq; discutiendi uires habent, ut est oleum rutaceum, ammi, origani, & paulò

causa

causa includantur, post prædictorum infestationum maximè usum, obstetrix digitum prius perunctū in pudendum muliebre inserat, ac grumum sensim ac leniter dissoluat & educat, Quòd si diutius se malum prorogauerit, ad effcaciora remedia ueniendū erit. Quare utendum linimentis, emplastris & Ceratū ceratis paulò uehementioribus, quale est quod habet: Abrotoni, origani, calaminthæ, singul. 3 2. seminis agni 2. centaurij minoris 3 1. seminum carei, ammi, utriusq; 3 1. casie 2 1. bdellij, ammoniaci, utriusq; 3 1. f. oleorum rutacei & anethi ni, utriusq; 3 1. cū cera & terebinthina resina quod satis est, informetur ceratū quod utero adhibeatur. Interdū etiā usq; ad dropaces ac sinapisimos progrediendū. Cucurbitæ etiā lo- Cucurbite cis in ambitu leues, & quæ uiolenter auellātur, affigendæ. Nam hæ incantamēti cuiusdā simile, ut nūc sæpè dictum est, efficiunt. Interdum etiā scarificatio adhibenda est. Omninoq; ijs utendum quæ uim habēt ex alto in summū euocandi. Ali- Vitis menta quoq; attenuantia, & flatum discutientia exhibere oportet, nec non medicamēta quæ idem possunt, ut dianisi & diacumini, ac diacalaminthæ antidota, & alia quæ in capite De uentriculi inflatione exposita sunt.

De vteri exulceratione. Cap. LXI.

EXulceratur interdum uterus propter difficilem partū, Causæ aut foetus extractionem, aut eiusdē corruptionem, aut ex acribus medicamentis, aut fluxione, aut abscessibus disrups- ptis. Hoc malo laborātes in patiente parte dolorem puncto- rium percipiūt, atq; ex interuallis foetidi saniosiq; humores Signa ab ulcere sordido excernuntur, ceteraq; signa consequuntur malè habenti utero peculiaria, ut capitis, & præcipuè sincipitis, tenontum, radiciq; oculorum dolor, qui ad manuum etiam fundamenta, & digitos usq; protenditur, ac reliqua

que in capite De inflammatione prædiximus. Vlcus itaq; in conspectu ueniens, spicillo oriculario deprehenditur. Altum uero & reconditum, ea quæ excernuntur indicabunt. Humor enim diuersus excernitur. Inflammato quidē ulcere, paucus, cruentus, aut sæculentus, cum magno dolore. Sordido autem existente, copiosior, & sanies cum minori cruciatus. Depascente uerò, foetidus, niger, cum doloribus uehementioribus.

Curatio. Porro ubi cum inflammatione fuerit ulcus, uenæ sectione & alijs medicamentis ad illam scriptis utendū. In reliquis medicamentis purgantibus, maxime si corpus uitiosis redundet humo-

Localia. moribus, utendum. Deinde adhibenda quæ reprimunt humorum defluxum, atq; calidā intemperie corrigunt, ut est succus aut liquor stillaticius portulacæ, plantaginis, bursæ pastoris, et similes iam sæpè expositi. In sordido subinde expurgantium medicamentorum usus erit, ut est ptisanæ cremor

**Repurgantia medica-
menta.** cum melle, mulsa cum decocto radicis iridis, aristolochiæ, absinthij, aut agrimonie. Ea uerò quæ depascunt efferrantur quæ ulcera, equino uel asinino lacte recenter mulso abludenda sunt. Lacti uerò mel admiscendū, & iridis radix. Hæc quidē, si ulcera cōspicua fuerint, illinuntur: sin profunda, infunduntur

**Ad cicatricem ducen-
tia.** per metrenchytas. Vbi ulcera probè purgata fuerint, ijs quæ ad cicatricē ducunt utendum, primo quidē mitioribus, postea efficacioribus. Placet in primis ceratum Aëtij, quod habet:

Ceratum.

Ceræ albæ ꝑ 1. rosacei optimi ꝑ 3. Hæc super carbonibus liquato, & quadantenus subinde refrigerato, tum in mortariū conijcito, lacteq; muliebri, aut asinino, aut caprimo recēs multo, cum pistillo diluito, quousq; totum, albescat: deinde effuso priori lacte, nouum imposito, ac rursus subigito, postea croci circiter ꝑ 1. adijcito. Quod si maiore mitigationē quæsieris, addito rosacei olei ꝑ 2. adipis & medullæ anseris utriusq; ꝑ 1. Licebit & pro rosaceo melinū admiscere. Hoc ce-

ratum

ratur abdomini & coxis imponendum. Siquidem eius facultas per latentes meatus in uterum traducetur. Possunt etiam eius farinæ medicamenta utero iniici, ut est decoctum mali corij, rosarum, malorum cotoneorum, rubi, myrti, rhois coriarij, acatiæ, hypocisthidis ex uino adstringente. Ad hunc locum transferenda sunt medicamenta è superioribus libris, ex capitibus De ulceribus renum uesticæ, & uirgæ.

De phimosi vteri. Cap. LXII.

Φίμωσις καὶ φήμοσις, obturatio seu coarctatio est in ^{Phimosi} ore aut ceruice uteri, qua ea loca tam angusta ^{vteri} red-
duntur, ut non amplius semen admittant: uel si admiserint, nō retineant. Ob callosam enim duriciem contrahi nequeunt. Interdum tamē semen admittitur, & intra angustissimum os uteri continetur, atq; inde foetus concipitur, conceptus uerō pręgnanti moriendi occasionē affert, quum propter nimias locorū angustias efferri nō queat. Fit autē phimos in ore ute ^{Causæ.} ri, aut ex præcedenti ulceratione, aut durata illic inflamma-
tione. Signis ad mali cognitionē nihil opus est, de sermonibus ^{Signa.} enim egrotantis & tactu facilis est deprehēsiō. Curatio ipsa ^{Curatio.} fit fōmentis relaxātibus & emollientibus, itemq; cataplasma-
tis & infusionibus simili facultate præditis. Fomenta itaq; ex hydreleo & fœnogræci decocto adhibenda sunt. Pessis etiam utendum quæ relaxādo emolliūt, ut est is qui ex æsypo, nitro, & resina terebinthina cōficitur. Quid multa? ad huius mali amollitionem utendum medicamentis emollientibus, malua nimirū, althea, nigella, fœnogræco, lino, ammoniaco, bdello, resinis, adipibus, & similibus, è quibus cerata, emplastra, & omnis generis localia medicamēta componi possunt. Quòd si malū inueterauerit, suffimētis uaporibusq; aroma- <sup>Si malū in-
ueteraue-
rit,</sup> tum utendum. At ubi iam loca tactui molliora offeruntur,

tunc spongiam aridam funiculo appensam intra locorum angustias, dilatandi gratia imponemus. Quae si exciderit, aliam crassiorē immitteremus. Quare plures diuersarūq; spongiarū exarentes preparatas habere oportebit. Postea aliquod medicamentum ex alumine & elaterio, melle exceptis, paratum spongiae imponendae illinendum, ut scilicet locus apertior fiat. Quod si postea sublata spongia locus non satis apertus uidebitur, inflammatioq; propter erodentia medicamenta admotā superuenerit, infra scriptum medicamentū spongiae illinetur, quod habet: Olei irini 3 i. resinae terebinthinae 3 i. adipis anserini 3 i. radicis iridis, thuris, utriusque 3 s. cere quod satis est, fiat unguentū. Porro si inflammatio uehementis fuerit, pro irino uiolaceū aut rosaceum sumatur. Vbi inflammatio cessauerit, & locus apertus fuerit, ceratum ex oleo rosaceo & adipe anserino confectū spongiae illinemus, & in eo usq; ad cicatricē obductam persistemus, locum solidiorē paulatim reddentes. Spongia tamen usq; ad perfectam curationē nunquam non imponenda, ne os uteri rursus coalescat.

Causs.
A viro.

De sterilitate remouenda. Cap. LXIII.

Sterilitas aut uiri, aut mulieris ratione accidit: A uiro scilicet, cum semen eius uel calidum, & ueluti torrefactum, uel frigidū, tenue, aquosum, liquidum, quale decrepitorum est: uel crassius quam oportet emittitur, uel quod uiri semispadones sint, penemq; breuissimū habeāt, ut in uuluae recessum semē iaculari nequeant. Quod etiā interdū nimia obesitate cōtingit. Obesi enim tam uentricosi euadunt, ut semē ad profundiores uteri partes iaculari non possint. Mulier uero sua ipsius ratione non concipit, quod uterum habeat uel calidum & igneum, uel frigidum & humidū, uel squaleniē & aridum. Nam, ut Hippocrates ait: Quaecunque frigidos &

den

densos uteros habent, nō concipiūt: extinguuntur enim in eis „
 genitura. Et quæcunq; siccos magis & torrefactos: nam ex „
 defectu alimēti corrumpitur semē. Cæterum crassæ admodū „
 & obesæ haud cōcipiunt. Cuius rationē Hippocrates ijs uer „
 bis reddit: Quæcūq; in quies, præter naturā crassæ nō cōci- 5. Aph. 46.
 piunt utero, ijs omentum os uteri comprimit, & priusquam „
 extenuentur non concipiunt. Graciles deniq; & macilentæ „
 non concipiunt: aut si concipiunt statim abortiunt, eodem
 Hippocrate teste, qui sic scriptum reliquit: Quæcunq; præ- 5. Aph. 44
 ter naturā tenues existentes, utero gerunt, abortiunt prius „
 quam crassescāt. Quædā etiā non cōcipiunt, eo quod uterus „
 earum debilis est, uel angustus, uel brevis, aut quod uasa eius
 obstructa & clausa sint, aut cicatricis superuētū excæcata,
 aut quod uteri cervix in obliquū ducatur: aut quod os eius ni- Inuiti con-
 mis angustū, uel nimis amplū sit. Sed & inuiti cōcubitus ina- cubitus cur
 nes & steriles, magna ex parte sunt. Amor enim geniturā cō- fere steri-
 ciliat: ideoq; foeminae amantes creberrimè pariūt. Aetas etiā les,
 uel iunior, uel prouectior cōceptum impedit. Propterea nūc Aetas quæ
 primū pubescentes à uenere arcere oportet, ita ut uir tri- conceptio
 gesimum annum, mulier decimum octauum attingat. Præci- ni apta.
 puè uerò inepta mulieris forma sterilitati occasionē præstat.
 Fœcunda enim mulier habere debet proceritatem corporis Fœcundæ
 moderatam, lumborum & pectinis latitudinem, nates eminē mulieris for-
 tes, commodam alui molē, thoracem angustum, mammillas ma qualis
 amplas. Signa quibus causarum diuersitas cognoscitur, hæc esse debeat
 sunt. Calidius uiri temperamentum facile ex pilorum copia, Signa.
 nigrorum potissimum, in partibus genitalibus, & omnibus
 quæ circumstant, à supernis quidem usque ad media fœmo- Calidæ tē-
 ra deprehenditur. Petulca etiam est hæc temperatura, & perature vi-
 prona ad libidinem, statim uerò satiatur. Frigidius tempe- ri.
 ramentum monstrant partes circumposite testibus glabræ. Frigidæ

Neq; etiam hoc temperamento præditi ad libidinem proni sunt. Vteri uerò caliditas ex reliqui corporis caliditate cognoscitur, quodq; pauca mēstrua, & cum dolore deferuntur, ut genitalia interdum mulieris exulcerentur. Sed & quæ educuntur, nigriora sunt. Hanc etiam temperaturā insignis salacitas, & totius corporis siccitas sequitur. Frigidioris uteri temperaturam monstrat, mēstruorum suppressio, stupor in pube, lumbis, & cruribus obortus. Veneris etiā usum aspernatur, & os uteri contractum habet, hoc temperamento præditæ. Humiditatis uerò uitio fecunditatē frustrari indicat, si in coitu humore admodū persundantur & si ijs fuerint tenuia copiosaq; mēstrua. Siccitas cōtrarijs planè deprehenditur notis. Reliquæ causæ partim uisu, partim de sermone agra, aut aliorum cognoscuntur. Communiter quidem ambobus, uiro scilicet & mulieri, congruit uniuersum corporis conseruare probè temperatum, laboris, cibi, balnei, & reliquorum omnium mediocritate. Viri igitur, qui propter deprauatam uiuendi rationē semē corrumpūt, ad magis cōpositum salubrioremq; uictum cōuersi, geniturae fecunditatem acquirūt. Mulier autē neq; ingenti labore defatigetur, neq; prorsus ociosa sit: hoc enim superuacuis excrementis molem corporis replet, illud uero sanguinē deficcet, & purgationes absomit. Potu & cibis concoctu facilibus utatur, & quos uētriculus probe superet atq; cōficiat. Illud uerò potissimum circa rectam uiuendi rationem est obseruādum, ut nec uir, nec mulier obesi reddantur. Qui enim tales fuerint, liberis procreandis inepti sunt, eo quòd genitalibus mutuo se cōtingere non possunt, & paucum semen emittant. Porro cōuenit etiam ut ijs qui liberis procreandis operam dare cupiūt, quædam consuetæ esq; aut potu gratæ ante cibum offerantur, quæ ueneri excitandæ & semini generando aptissima sint:

sint: qualia existunt quæ calefaciunt mediocriter, Galeno lib. 5. De simpl. med. facul. cap. 20. teste, & inflant. Vinum itaq; in hunc usum, modicè sumptum, aquæ præfertur. Sine enim Cerere & Baccho, ut ille ait, friget Venus. Ex oleribus utendum eruca, orminio erysimo, & alijs quæ in cap. De ijs qui reuenera uti non possunt, commemorauimus. Ruta, calamintha & menta omnino uitanda sunt. Calamintha enim & menta, etsi plurimum semen, languidum tamè & imbecillum gignunt. Ruta uerò prorsus corrumpit. Cæterum ubi mulier uitio quodam humorum nō concipiat, eas purgante medicamento uacuare, & proba uictus ratione emendare expedit. Peculiariter uerò mulieribus cōuenit, curā eorum quæ sunt circa uterū quā fieri potest maximā habere, & ut ijs menses sine omni impedimento promanent. Quum igitur propinqua est per menses purgatio, cibi potusq; quantum fieri potest mediocritatē curæ habebunt, & quippiam ex ijs quæ menstruam purgationem irritare & stimulare possunt, assument, ut sunt olera odorata & acria, gingidium, scæniculum, apium, smyrnium, & similia quorum copiam ex capite De suppressis mensibus petes. A purgatione menstrua optimum & opportunissimum concipiendi tempus est. Quoniā, ut testatur Hippocrates noster, post menstruam purgationē iam dextra, iam uerò sinistra uteri pars aperta est. Porro uteri intemperiem frigidā per fomenta, cataplasmata, suffitus, & alia quibus calefaciendi uis inest, corrigere oportet, ut sunt quæ ex artemisia, pulegio, salvia, ruta aniso, cumino, acoro, & similibus parantur. Castorium etiam bibere proderit, & semina odorata, cuminum, anisum, iuniperi quoq; fructum, & alia quæ in capite De suppressis mensibus dicta sunt. Calidiorē uerò uteri intemperiem per ea quæ refrigerant & humectant emendabimus: cuiusmodi sunt olera quidem la-

Olera quæ uitanda.

Curatio mulieris caco-chymia laborantis.

Tempus concipiendi.
6. Epid.
par. 7.
Aph. 24.
Curatio frigida intemperiei uteri.

Curatio calidioris intemperiei.

Etuca, malua, cucurbita, portulaca, atriplex, & ijs similia.
 Vinum bibendum tenue, album & dilutum. Proderit sic la-
 borantibus somnus, & dulcium aquarum balnea. Lumbis
 etiā ac pubi refrigerātia adhibenda sunt, ut solani succus ro-
 saceo admixtus, qui etiā lana exceptus in uteri sinum utiliter
 imponetur. Quæ ob uteri humiditātē nō cōcipiūt, ijs uictus
 sicciior utilis est. Exerceri etiam eas plurimum oportet, ac in
 superioribus corporis partibus perfricari, euacuationēq; &
 auersionis gratia interdum pransas, interdum ieiunas uome-
 re, & cibi parcimonia exiccari, carnesq; ætate uigentiū ani-
 malium tostas comedere, uinumq; potens & meracius, sed
 parcius bibere. Arida præterea fomenta crebrō adhibenda.
 Profuerit & uulua adstringentia apponere, qualia sunt ro-
 sarum, foliorum rubi, gallarum, rhois obsoniorum, myrthi,
 poligoni, malicorij, & similiū decocta. Ad autē nisi totū an-
 tea corpus purgatum sit faciendum minimē erit. Sicciore ue-
 rō uterum cōtrarijs curare oportet, balneis aquarū dulciū,
 inunctione, & alimentis humectantibus, uino diluto, non ni-
 mis ueteri. Quod si à crassiorib. humoribus cōcipere mulier
 impediatur, siquidē rodentes fuerint, mulierē probē purga-
 re cōuenit hiera piera, sero lactis & uictu exquisitori, ci-
 bisq; boni succi utendum. Pituitosos uerō humores laboribus
 plurimis sudoribus, uomitu, uel per inferna purgatione ab-
 mere oportet, aliāq; omnia quæ in cap. De suppressis mēsi-
 bus cōmemorata sunt, quæ nihil attinet hic mēbratim recen-
 sere. Iam uerō flatus quoq; in utero cōcepti fecunditatē im-
 pediunt. Quibus primū parciore cibo medibimur, dein ijs
 quæ flatus discutunt medicamētis, ut est cumini, ruta, ane-
 thum, apij semen, & similia, quæ in cap. De uulua inflatio-
 ne, & alibi dicta sunt. Ea autē partim potāda, partim extrin-
 secus adhibenda sunt. Clausum ac coniuuentem uterum ape-
 riem: u

Humidioris.

Sicciioris.

Curatio hu-
morū cras-
siorum.

Curatio fla-
tum.

Clausū ut-
eri.

riemus iniectis clysteribus odoriferis, fomētisq; & inſeſſioni
 bus ex ſœnogræco, ſemine lini, malua, & id genus alijs, ſuprà
 in cap. De phimoſi uteri etiã cōmemoratis. Poſtea ad uali-
 diora progrediendum artemiſiã nimirum, calamintham, pu-
 legiũ, & maioranam. Quibus os uteri nimium hiat, ijs ui-
 ctus aridus, fomenta ſicciora, medicamenta adſtringentia,
 qualia ſunt gallarum decoctum, rubi radix, myrtus, & eiuf-
 modi in curatione humidioris intemperiei recenſita, conue-
 niunt. Poſtremum peruerſiones uteri emollientibus fomentis
 dirigemus: id enim fomenta maximè poſſunt. Sed & mollien-
 tes peſſuli utiliter ſupponētur. Præcipuè uerò pulegij & ar-
 temiſiæ decocta, & caſtorium è poſca bibitiũ utero auerſo
 conferre ſolent. Paulus tradit, tum uenerẽ à tergo exercitam
 ad cōcipiendum conducere. Nos hic generatim atq; per ca-
 pita tantum curandi rationes perſtrinximus. Particulares
 enim curationes è proprijs petendæ ſunt capitibus.

Aperti
uteri.

Peruerſio
niſa

De difficultate partus. Cap. LXIIII.

Difficilis partus aut uitio parientis, aut fœtus, aut ſecũ
 darum, aut extrinſecus aduenientium accidit. Partu-
 rientis quidem, ſi crassa obefaq; ſit, aut animo puſillo, & do-
 lorum imperita, aut uterus totus exiguus fuerit, aut inſlāma-
 tionẽ uteri, aut alterius partis habuerit, aut alio quouis mor-
 bo laborauerit, aut naturaliter imbecilla ſit, ut fœtum pro-
 pellere nequeat, aut ante tẽpus pariat. Itẽ ſi os ceruicis uteri
 fuerit obliquũ, aut eidẽ caro aliqua propter ulcus quod præ-
 ceſſit adnata ſit. At fœtus uitio, ſi uel inuſitatæ magnitudi-
 nis exiſtat, uel exiguus & modicæ grauitatis, uel magni ca-
 pitis, uel monſtroſus (uerbi gratia) biceps tripes: ue: uel mor-
 tuus, qui nihil opis parturienti præſtet, aut intumeſcat: aut
 uiuus quidem, ſed imbecillis, ut foras non poſſit progredi:
 uel

Cauſæ.
Ex partu-
riente,

Ex fœtu,

uel si gemini uel plures fuerint, & repente omnes simul collo uteri impingantur. Vel si figuram naturæ aduersam & cō-

Naturalis trariā obtineat. Naturalis siquidē figura fœtus prodeuntis
figura fœ-
tus prodeu-
tis,

est: prima quidē in caput, manibus super fœmoribus porre-
 ctis & extensis, & capite in neutram declinante, sed rectā
 ad os uteri directo. Proxima huic, ubi in pedes manibus su-
 per utroq; fœmore extēsis, rectā defertur. Aliæ omnes præ-
 ter has duas à natura abhorrent, ut si caput in dextram aut
 sinistram uteri partē inclinat, uel si altera aut utraq; manus
 exeritur cruraq; interius à se inuicem diducuntur. Aut si fœ-
 tus altero pede prodit, altero interius rentēto. Aut si dupli-

Ex secun-
dis.

catus alicui uteri parti innititur. Ob secundas partus reddi-
 tur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusquā
 opus sit propter tenuitatē abrumpatur. Tūc enim humor in
 utero collectus ante cōgruum tempus excernitur, quare pu-
 denda sine humore, siccaq; in ipso partus tēpore manēt, cum
 necessaria est humiditas, quæ exitum lubricū & facilē fœ-

Ab extrin-
secus acci-
dentibus
signa.

tui præbeat, atq; adeo præ siccitate agrē fœtus elabitur. Ab
 externis etiā causis pariendi difficultas oritur, à frigore ni-
 mirū, quod uterum densat, & meatus angustiores reddit: aut
 calore immodico, qui uires dissoluit. Cause quidē extrinæ pa-

Imbecilli-
tas parie-
tis,

rientis, & assistentiū sermonibus cognoscuntur. Imbecillitas
 uerò parietis, ueluti pinguedo, ex corporis habitu facilē de-
 prehenditur. Ex morbis etiā præcedētib; proptē in imbe-

Fœtus,

cillitatis notitiā, & nonnullorū aliorū malorū uenimus. Fœ-
 tus imbecillitas ex debili ac tarda motione cognoscitur. Qui
 si mortuus fuerit, à motu prorsus cessat, uētris frigiditas ad-
 est, atq; dolor iuxta umbilicū grauis. Spiritus exhalatur fœ-
 tidus, facieiq; color prauus. Magnitudo autē fœtus ex parē
 tum corporis cōstitutione, ac uentris parientis mole conijci-
 tur. Crassities secundæ inde colligi potest, quod prædictorū
 signo

Magnitudi-
nis fœtus.
Crassities
secundæ,

signorum nullū adfit, & parturiēs robusta, facilisq; foetus motus sit. Porro quod ad curandi rationem attinet, variatur quidē iuxta causarū diuersitatē. Obesam itaq; mulierē in le- Curatio obelæ.
tulo pronā, hoc est in caput propendentē, & uultu in ter-
ram deiecto figurare oportet, flectentē inclinantem uel ge-
nua ad fœmora, quo uterus ad abdomē tēdēs ē directo oris sit.
Digitis uerò pinguedinibus (uerbi gratia) butyro, oleo, axū
gia anatis, gallinæ, & similiū delinire os uteri oportet, & sen-
sim dilatare. Timidæ uerò addēdus animus. Inexpertā autē do- Timidæ.

lorū partus admonere, ut ualidiſsimē spiritū cōprimat ac cō-
timeat, & ad ilia ualidiore conatu protrudat. Si autē difficil- Si ex adstri-
ctione, stu-
pore, aut fœ-
tus adarctā-
tione.
lis partus ex adstrictione, stupore, aut ueluti foetus adarctā-
tione oriatur, relaxatione succurrendū erit, infundēdo largi-
ter oleū dulce & calidū. Item decoctum fœnogræci, aut mala-
uæ, aut seminis lini, aut etiā oua, quod leniendi facultate præ-
dita sint. Deim & pubē cum abdomine & lumbis prædicto,
decocto, aut alio relaxante medicamēto fouere oportet. Pro-
derit etiā in seſſionibus calidis & euaporationibus tum aëre
domus ad caliditatē uergēte, tū infusionibus et illitionibus ex
oleis tactu & uirtute calidis, cataplasmatīsq; cōuenientibus
uti. Quod si neq; febris, neq; quippiā aliud obstiterit, balnea
relaxātia adhibere oportet, mouereq; parientem gestatio-
ne in sella, in aëre mediocriter calido. Nonnulli & in ijs cor-
poris quassationibus uiolētis utuntur. Quod si aliqua debilis Si ex imbe-
cillitate &
resolutione.

fuerit, & difficilē partū ob resolutionē habeat, densantibus
& cōtrahentibus, atq; cum ijs quæ reficiūt, & robur addunt
cibis & potionibus refocillanda: quales sunt inſeſſiones, &
asperſiones ex myrto, pāpinis uitis, malis punicis, roſis, aceti
odore, et illitioe ex uino, oleo roſaceo mixto frigido. Vbi in- Si infūs præ-
magnus sit.
Si fœtus
figura præ-
fans præmagnus fuerit, ea adhibēda quæ dilatare et laxare os
uteri poſſūt. Si uerò ex præternaturali foetus figura difficilis
partus

ter naturā partus cōtingat, ad naturalē quātū possibile fuerit, ducēdus
 sit, est figurā, partim pellēdo, partim adducēdo, ptim flectēdo,

Si manus partim in rectū agendo. Et si manus pes ue prēmittitur, non
 aut pes prēmittitur, attrahere mēbro prēhensum oportet: magis enim firmatur
 ac impingitur, uel luxatur uel abrūpitur, sed digitis humero

Si cū oris vtericōm, infantis indecora fuerit figura, sursum prius ipsum ab uteri
 pressioe fœtus indecēs ore sublimē detrudere cōsiliū est, deinde prēhensum iterū ad
 figura sit. os dirigere. Si autē gemini aut terni, plures ue fuerint, ac cer-
 Si gemini uicē uteri obsederint, reliquas propellere ad fundum uteri o-
 plures ue portet, & eū q magis paratus uidebitur, prius educere. Ve-
 fuerint. rū si non procedat, quod infans mortuus sit, aut caput nimis
 Si nō pro- magnū, uel aliā ob causam, ad fœtus extractiōē seu sectiōē,
 cedat in- quā Græci ἐκβορᾶν appellant, ūcniendū est. Eam autem
 fans. copiosissimē Aëtius lib. 16. cap. 23. Et Paulus lib. 6. cap. 74.

Si secunda tradūt. Neq; enim manualē curā di rationē docere institui-
 crassior sit. mus. Porro si fœtus tunica, seu secūda crassior fuerit ac soli-
 dior quā ut rūpi possit, diffecanda erit. Quibus autem hu-

Si tunicarū mor in tunicis cōtentus, ante cōgruū tempus effluxerit, ita ut
 humor prē loca exaruerint, ouorum albuminibus cum maluz aut fœno-
 propercflu græci decocto excolato, aut ptisanæ cremore tepido perfon-
 xerit. demus. Medicamentū uerò quod in uniuersum omnes diffi-

Puluis opti culter parientes iuuat, est hoc quod habet: Cinnamomi electi
 mus ad dif- 3 2. myrrhæ, casia lignæ uocatæ utriusq; 3 1. succini candidi
 ficultatem 3 1. f. terantur singula, & fiat puluis subtilissimus, de quo in
 partus, uino odorifero detur pōdus drachmæ unius. Porro fœtu ex-
 Secūda e- cusso, frequenter accidit, ut secunda in utero firmiter adhæ-
 ductio. rescat. Quod si euenit, tum interdum os uteri apertum, inter-
 dum clausum reperitur, secundāq; ipsa nonnunquam uteri
 fundo adhuc coniuncta, nonnunquam seiuncta est.

Si

Si itaque os uteri diductum fuerit, & secunda quæ inibi relicta est alicui parti uteri orbiculatim, ac pilæ modo cōvoluta inhaferit, facile educitur. Manu siquidem sinistra calida pinguiq; illita in fundum demissa, secundam sublabentē extrahere oportet. Si autē fundo uteri sit cōnexa, demissa simili modo manu calida, & pingui iuncta apprehensam secundā trahemus: non tamen in rectum, ne uterus procidat, neq; uiolenter admodū, sed leniter ac placidē, primum in obliquū deducamus, huc atq; illuc circumagentes, deinde paulo ualidius attrahemus: hoc enim pacto obsequūtur, et à cōnexu solūntur. Quod si uulua os clausum fuerit, perfusionibus utemur, & sinistrae manus digitis leniter aperire, & paulatim dilatare conabimur. Quod si non successerit, mulieris pubi fōmenta, perfusiones, unguentaq; emolliētia & relaxātia adhibere cōuenit. Si robusta fuerit, eo tempore etiam sternutamenta ex castorio, pipere, & similibus confecta naribus admouenda sunt. Hinc est quod Hippocrates s. Aph. 49. sic scriptū reliquerit: Vt secunda procidat, sternutatorio appposito, & nares apprehendito & os. Potiones denique ex earum numero quæ menses prouocant propināda. Quæ quidem omnia primo aut altero die peragenda sunt. Præterea suffitu utendum, decoctis in olla artemisia, iride, sauina, pulegio, calamintha, dictamnino, & similibus, olla sellæ supposita, cui mulier uestimentis undiquaq; circūsepta insideat. Postea si os uteri apertum inuenerimus, manu inserta, secundā sicut prædictum est, educere enitemur. At si non obediat, dilacerāda non est, haud multis enim postea diebus putrefacta, & in saniē soluta excidet. Quia uerò odoris grauitate & caput replet, & stomachum putrefacta euertit: odoramēta iugiter suffiēda sunt, quæ huiusmodi malis aduersantur, & secundā subducunt. Ad quos usus excellunt cardamomū, bdellium cum sauina, thus, styrax,

Odoramē-
ta

styrax, ladanū, lignū aloës, et id genus alia. Lapis etiā Gages per fistulā quæ ori uteri subditur suffitus, mirabiliter prodest. Conueniunt et simpliciora ex ijs quæ menses ducunt, artemisia decoctū, et lauri bacce cum uino mulso. Pessulos item conficito ex myrrha et cyclamino cum oleo mixtis.

De ischiade. Cap. LXV.

Ischias.

Ischiadici.

Causa.

Signa.

Curatio.

Si plenitudo adit.

Iσχιας Græcis proprie dicitur dolor grauissimus qui circa iuncturā, quam Græci ἰσχίον, Latini coxā appellant, accidere solet. Malum hoc Latini ischias, et qui eo affliguntur, ischiadici nominantur. Barbari sciaticā malum, et eo laborantes sciaticos uocāt. Fit propter crassum pituitosumq; humorē, qui in coxarū articulo cōcretus insidet. Ideoq; ischiadis generationē non parum adiuuant asidue cruditates, et immodicus rei ueneris usus. Aliquādo etiā deambulationes cōcitiores, et hæmorrhoides suppressæ, et uomēdi cōsuetudo intermissa, et purgationes menstruæ, aut etiā aliæ familiares ac cōsuetæ excretiones impeditæ, exercitiorumq; neglectus. Hæc enim singula pituitosi humoris copiam conciliare possunt. Antecedit autē, et quasi auspicatur hoc uitium aliquādo quidem uicinorum musculorum dolor, et maxime lumborum. Aliquando uerò ab ipsa coxa initium fit. Iam uerò etiam contingit, ut coxæ dolore sublato, circa poplitē solum afflictio hæreat: alijs autem iuxta talum, quibusdam uerò totum crus equaliter dolore afficitur. Multis item dolor circa inguina figitur, et tum sanè uesica ipsa molestiam transsumēs, urinae difficultatem inducit: et tunc maxime totū crus à coxendicibus usq; ad calcaneum dolorem perfert. Initium autem curationis fiat ab affligentis humoris euacuatione. Et si quidem humoribus ex æquo omnibus redundarit corpus, præ alijs omnibus remedijs uena secanda in poplite, aut talo interna

interna aut etiam cubito, Gal. lib. 10. De cōp. med. secundū lo-
 cos ca. 2. teste idq; in latere affecto. Nam interdū ischias una
 die per hanc ex cruribus euacuationē curatur. Sin pituitoso ^{Si crassius}
 atq; crasso humore corpus refertum fuerit, à purgatione ^{ac pituito-}
 ius humoris auspicabimur curationem. In quē quidem usum ^{fus humor,}
 clysteres crebri exhibendi erunt, in hunc uel similem modum ^{Clyster,}
 parati, quiq; habēt: Centaurij minoris, saluie, uerbasculi odo-
 rati, rutæ, chamæpityos, singul. m̄ 1. radices acori ꝯ 1. stichadis
 ꝯ 3. seminū anisi ꝯ fœniculi, utriusq; ꝯ 2. f. agarici optimi
 ꝯ 2. radices polypodij ꝯ 5. decoquantur singula in aqua iustæ
 quantitatis ad tertias. Dein accipiatur iuris decocti ꝯ 13. hi-
 ere picræ ꝯ 5. cōpositionis indi maioris ꝯ 2. olei liliacei ꝯ 2.
 olei rutacei ꝯ 1. uitellos ouorum duos, salis ꝯ 1. f. Commixtis
 omnibus fiat enema. Auxiliantur etiam ischiadicis uomitio-
 nes, atque magis utiq; quàm euacuationes infernæ per uen-
 trem, ut quæ repente humorē deorsum repellāt. Elicedi itaq;
 sunt uomitus in principio statim ab accepto cibo. Postea
 uerò etiā uomitoria medicamenta, initio facto à mediocribus.
 In quibus autem uehemens humorū coactio densatio ue, quæ ^{Cucurbita}
 ægrè dissolui potest, à medicis intempestiuè acribus, medica-
 mentis utentibus facta est: ijs cucurbitula quàm maxima cū ^{magna.}
 scarificatione affixa auxiliatur. Cæterum medicamētis fluxū
 reprimentibus in ischiade non utemur. Quum enim in pro-
 fundo coxa sita sit, sanguis ex uicinis ꝯ ambientibus uenis
 ac musculis ad illā pellitur. Mitigatorijs igitur in principio
 medicamētis opus est in hoc dolore, quæ neq; refrigerēt mul-
 tum, neq; uehementer calefaciant. Vt enim ea quæ refrigerāt
 ad coxam impellunt: sic quæ uehementer calefaciunt, aliam
 amplius materiā ex adiacentibus partibus attrahunt. Porro
 post uenæ sectionem, aut per purgātia medicamenta uacua-
 tionem, ad acria medicamēta, non antè ueniendum est. Si enim

Vomitus,

Cucurbita
magna.Adstringē
tibus medi
camētis in
Ischiadenō
utendum,Acriorum
vſus quan-
do conue-
niens,

C quis

quis prius quàm corpus euacuet, acria medicamenta ad patientem particulam adhibeat, agrè curabile malum reddet, utpotè multitudine ibidem indissolubiliter condensata. Præter alia enim crassa & uiscosa fit, & ob acrium medicamentorum caliditatem & siccitatē non dissimile quidpiā assationi perpetitur. Male affectum itaq; locū primū ex oleo rutæ irrigare oportet. Postea uerò efficaciora admouenda medicamenta, quæ scilicet sensum calefaciant, & humores ex alto ad superficiem trahere queant: ut sunt oleum uulpinum, de piperibus, costinum, iuniperinum: unguenta aregon, martianum, & agrippe. Item saluia, ruta, folia lauri, sambuci, ebulli radix, pulegium, sauiua, opopanax, bdellium, ammoniacū, & similia. Ex quibus subinde fomenta, unguenta, emplastra, & cerata cōponi possunt. Principio itaq; spongia in decocto iuniperi, aut saluiæ, aut foliorū sambuci madefacta, loco patiēti iterum atq; iterum imposita, hoc subinde unguēto utendum erit, quod habet: Vnguenti martiani 3, oleorum irini, liliacei, utriusq; 3, succi rutæ & chamæpityos, utriusq; 3, mellis 3, saluiæ, pulegij pipcris, singulorum 3, pyrethri, staphidis agriæ, utriusque 3, ceræ quod satis est, fiat unguentum. Proderit etiam huius cerati usus, quod accipit.

Ceratum. Oleorum costini, uulpini, utriusq; 3, olei de piperibus 3, opopanax, bdellij, styracis, singulorum 3, radicis bryoniæ, nitri, foliorum sambuci, singulorū 3, pistolochiæ (rotundam hodie aristolochiam nominant) rutæ utriusq; 3, euphorbij 3, gummi in acerrimo dissoluantur aceto, ut cū resina terebinthina & cera quod satis est, fiat ceratū. Quod si malum adhuc remoretur, clysteribus denuò utendum erit, & deinceps cucurbita quàm maxima cum plurima flamma coxæ affigenda, uulnibus etiam altioribus per scarificationem impactis. Quod si uerò neq; sic malum finitur, ad purgationem

gationē, uomitum, & alia quæ supra dicta sunt, redeundum erit. Quibus peractis, ad dropaces & sinapismos, adeoq; ad adurentium medicamentorū usum ueniendum. Inter quæ nō postremum obtinet locum herbæ iberidis radix recēs, æstate effossa, & diligenter tusa, ac ueteri axungia modica excepta, articulo coxæ, ac uniuerso cruri imposita & alligata, Idem etiam folia possunt. Sic uerò admota incumbere finito, mulieribus quidē non infrā duas horas, uiris autē horis quatuor, si possibile sit id ipsum perferre. Excitat enim tumores cum ardore & rubore, ut sinapismus facere solet. Postea in balneum inducito ægotantē, in quo ubi modicē exudauerit, in solum ob feruorē mordacius desidere iubeto, idq; fortiter perferre cogito, morsum enim cum ardore initio inferre consuevit: deinde educito. Fermē enim semper, Aëtio attestante, quāuis ab alijs fuerint importati, sua sponte pedibus ingrediētes exiunt. A balneo ad oleum multum, uinum paucum admodum admisceto, & conquassata illinito: ac humore cum aspero pāno deterso, crus ipsum cū leuissimis lanis cooperto. Et sanē consuevit hoc præsidium nullo alio inde auxilio indigere. Quod si tamen aliquando uestigium mali relinquatur, uicenis diebus interpositis, rursus eodem præsidio utaris. Interiectis tamen diebus, ceratum paulō antē descriptum imponi potest. Porro inter medicamenta adurētia hoc etiam locum non postremum obtinet, quod habet: Mellis anacardi-
Cauticū.
 ni, fermenti, utriusque drach. unam, cantharidum abiectis
 alis 52. aceti quod satis est: Misceantur. Et hoc quod acci-
 pit: Euphorbij, nitri, utriusq; 2. saponis, calcis uiuæ utrius-
 que 31. mellis anacardini quod satis est ut ad mellis consi-
 stentiam omnia commixta redeant. Caterū uictus ratio
 sit eiusmodi, ut cibus mediocriter tenuis existat, & concoctus
 facilis. Exercitia sint deambulationes, continuæ flexiones,

Victus,

saltationes, & cursus. Aluum semper probè solutam habere expedit. Quòd si uerò uitium longius durauerit, nec prædictis medicamentis propulsari poterit, uisionem in tribus aut quatuor locis adhibere oportet, ad eum quidè modum què docet Paulus lib. 6. cap. 76. Et Aëtius lib. 12. cap. 3.

De podagra & arthritide. Cap. LXVI.

Podagra & arthritidis mala eiusdem speciei sunt. Differunt itaq; nō toto genere, sed locis patiensibus. In utroq; enim articulorum est imbecillitas, & humor à natura alienus ad hos ipsos confluens. Quòd si in pedibus hæc cōstituerit fluxio, podagra appellatur. Sin reliquos artus occupauerit, ἀρθρίτις Græcis, hoc est articularis morbus nominatur. Hoc malū interdum repente irruit æqualiter per omnes articulos dispersum. Vt plurimum uerò clanculum & paulatim fluxus irruere solet. Alteri enim cuiusdam magni digiti pedis articulū dolor inuadit: alijs uerò calcanei extremū. Rursusq; alijs cauiū pedis, aut ex calciamenti, aut ex cōsimilis rei affricu. Initium podagra à pedibus sumit, unde etiā nomen sortitum est, paulatim ad genua procedit, ad coxendiciū item ac fœmorum iuncturas, deinde ad manus, singulis articulis particulatim malè affectis. Qui uerò extremè ab hoc malo apprehenduntur, ijs & spinæ uertebrae & costarum iuncturae, & genæ dolent, aliquibus autē & guttur: neq; est aliqua ossium cōnexio, quæ ab hoc uitio sit immunis. Generatur autem à cruditatibus assiduis & ebrietatibus, immodico rei ueneræ usu, uehementi & concitatiorè deambulatione, statione diutius extracta, equitatu crebro, cōsuetarum excretionum suppressionibus, ac familiariū exercitiorū intermissionibus. Macrores autē, curæ, uigiliæ, & reliquæ animi perturbationes, nō hoc modo malū suscitant, sed & noxios quoq; suc cos pro

podagra.

Arthritis.

Podagra
unde ha-
beat initium.

Causæ.

procreant. Nonnunquam etiam colicus dolor perperam curatus, causa cur arthritidis sequatur esse solet. Quod palam testantur ea quæ lib. 6. Epid. par. 4. Aph. 3. scribit Hippocrates in hunc modum: Cuidam intestinum colum uocatum, si mulatq; articulari morbo detinebatur, dolore uacabat. Postquam uerò ab eo sanatus est malo, plus doluit. Cuius quidem sententiæ uberiorem explicationem in nostris commentarijs offendunt studiosi. Cæterum ut plurimum abilitas ad hoc genus mali à parëtib; in filios ac posteros propagatur. In uniuersum autè amplius omnium crudorum humorum copia mali huius causa existit. Humores tamè superantes, qui se iuncturis inserūt, uel sanguinei sunt, uel biliosi, uel pituitosi, uel melancholici. Interdū etiā ex humorum cōmīstione malū cōtrahitur. Porro causæ externæ facillè de sermonibus ægri aut a signa. dentium cognoscuntur. Humorum autè discrimina ijs notis deprehendere licebit. Sanguineus quidē humor si multus fuerit, plenitudinē efficit & tumorem ingentem, non uenarum modo, sed totius partis malè affectæ circa cutem, eumq; rubentem. Qui hoc modo affliguntur, neq; refrigerantia neq; calefactoria ualde præsidia adhiberi sustinēt, & assiduè exacerbantur, quando quidem assiduè & æqualiter sanguinis defluxus contingit. Urinæ eorum fuluæ sunt, & mediocri prædite crassitudine. Venæ etiam in his copioso suscepto sanguine replentur, & in tumorem attolluntur. Aetas uerò apta huic malo iuuentus. Edulia item boni succi, & copiosè nutritientia præceperunt, neglectusq; exercitiorū. Tempus uerò, in quo affligūtur maximè ægrotantes, est uer ipsum. Porro biliosum defluxum color cutis sufflauius ostendit. Interdū uerò rubor cum flauo permiscetur, colore, ubi uidelicet flaua bilis sanguini commixta est. Item caloris sensus, dolorisq; lancinantis modo acris. Humor quoq; in cutem subito sine

evidenti tumore crumpens. Refrigerantibus medicamentis sic afflicti gaudent & iuuantur, à calidis autem offenduntur. Febris in ipso accessionum statu accedit, ualidaq; sibi conficit. Urina eorum subsulcia, quandoque etiam acris. Cura autem ingentes, & iræ, & uigiliæ, & fatigationes, & in summa uictus ratio bilem procreans, præcedere solent. Aetas, temperamentum, & tempus, calida & sicca, ad eum defluxum apta sunt. Quod si pituitosa sit fluxio, ad digitorum impressionem cauius fit tumor, subluxus & moderatus. Color membri male affecti candidus. Aetas hoc modo magis afficitur senilis, temperamentum humidum & frigidum, in consimili aeris statu, & tempore hyberno. Urina tenuis est & aquosa, præceditq; otium, & uictus ratio quæ pituitosum humorem progignit. Si autem salsa fuerit pituita, pruritus maximus & mordacitas partes male affectas infestat. Si ex atra bile fuerit fluxus, quod rarò tamen contingit, color tumoris nigrior est. Aetas quæ magis hunc fluxum generat, est uigoris inclinatio. Temperamentum item frigidum & siccum, tempus autumnii, regio frigida & sicca, aeris consimilis status, uictusq; atram bilem gignens. Porro cum sanguinei humoris fuerit influxus, primus sanguis mitti debet, non solum semel, sed iterum atq; iterum, detractio paulatim repetita. Si enim uenæ sectione omissa, repellentibus medicamentis fueris usus, magni mali autor eris: ex ignobilibus enim partibus ad principes, et uitæ necessarias repulsus irruet. Quapropter summè necessaria est sanguinis in sanguineis influxionibus euacuatio, præsertim in his qui sanguine redundant. Secunda est autè uena in brachio infernè, è directo cruris influxione infestata. Quod si uerò manus dextra dolore afficitur, uenam in dextro crure secamus iuxta poplitem, aut talos, aut plantam pedis. Habet enim miram uim uena è directo membri male affecti,

Gale.

Gal. & Aëtio libro duodecimo, cap. 23. testibus, secta. Quod nos alibi etiam copiosè demonstraui-
 mum sanguinis missio tentanda erit, cum quempiam malum Venæ se-
 hoc primū inuadere cœpit. Qui enim sæpius huiuscemodi ctione quā
 defluxione sunt conflictati, plus noxæ quā auxiliij ex san- do potissi-
 guinis detractio-
 ne sentiunt, præsertim si corpore sint im- mū vtendū
 becillo ac frigido. Post missionem sanguinis patienti particu in hoc casu,
 le remedia adhibere oportet, quæ neq; ualde refrigerāt: hæ Localia.
 enim humores cogunt ac condensant, neque immodicè cale-
 faciunt, hæ siquidem coloris ratione ad partes patientes
 plus attrahunt. Quapropter aceto ueteri cum rosaceo lo-
 cum malè affectum rigare oportet, præsertim si in alto hæ-
 rere dolorum causa uideatur. Etenim acetum propria sua
 tenuitate usq; in altum progressum, expeditam rosaceo uiam
 exhibet, quod natura sua lenire dolores potest. Si uerò in
 superficie dolor consistat, per uini & olei usum magnopere
 iuu-
 ueris: æstate quidem tepidorum, hyeme uerò calidorum.
 Deinde cataplasmatis quoque utendum, quæ dolores lenire Cataplas-
 possunt, absque hoc ut fluxiones prouocent, ex farina fœ- mata,
 nogræci, hordeacea, fabacea, lupinorum, chamæmelo, & si-
 milibus. Oportet autem ut ea semper calida omnino sint: id
 quod commodè fieri potest, si assiduè permutentur, & lana
 forinsecus contegantur. Non parum proderit & hoc medi-
 camentum, quod habet: Lactis caprini ℥5. uitellos ouo-
 rum duos, olei rosacei 3 i. croci 3 s. medullæ panis quod
 satis est, ut recipiat cataplasmatis formam. Hæc itaque te-
 rantur donec uniantur, & unita tandem membro dolenti
 imponantur. Potest quoque ex oleo rosaceo, aceto, resina,
 cera, galbano, ammoniaco, thure, croco, & similibus com-
 poni emplastrum aut ceratum. Tale enim repulsoriam uim
 propter crocum & acetum obtinet: concoctoriam uerò, di-

Vicius.

Cur pauci
hodie a po-
dagra libe-
rantur.Biliofi flu-
xus cura-
tio.Stupefaciē-
tia.

scussoriam & moderatè siccantem, rursus propter crocum
& aliorum commixtionem. Caterùm cibos ei exhibere oportet
qui extenuant, & parum nutriunt: quales sunt olera. Car-
ne autē, nisi uolucrum montanarum, prorsus abstinereant. Pi-
scibus utantur saxatilibus. Vinum si fieri per intemperantiā
egrotantium potest, ex toto circuncidendum: nam hæc ferè
unica ratio est, qua sanitas cōsequitur. Quam cum ex milibus
uix unus sequatur, nihil mirum paucos admodum esse qui ab
hoc malo hodie liberentur. In uicem uini utendū aqua in qua
cinnamomum, anisum, aut similia decocta sint: aut certè ea
potione quæ hodiernis tēporibus ridicula atq; insulsa, uoce
Hippocras nominatur. Eius cōfectionē petent studiosi è ca-
pite De resolutione. Fructus & uentrē diligēter caueāt ego-
tantes. Alium præterea facillè solubilē, ac sua sponte deiscien-
tem habere cōfide oportet. Quod si tamen officio suo parum
rectè fungatur, simpliciori aliquo clysteri eluatur. Vbi uerò
propter bilis influxū dolores excitentur, tunc ijs communis
scopus humoris affligētis est euacuatio, quæ tū per uomitū,
tum per uentrē fieri debet. Per medicamēta itaq; bilē ducētia
cōfidenter purgādi sunt sic afflicti. Deinde usq; ad uigorem
apponēda medicamēta, quibus refrigerandi & adstringēdi
facultas inest: qualia sunt quæ ex semperuiuo, rosæ uiridi-
bus, rumice acuto, solano, plantagine, & similibus iam sæpè
cōmemoratis apparātur. In hoc influxus genere nōnūquā p-
pter doloris uehementiā, ijs quæ stuporē inducere possunt utē-
dum medicamentis. In quē quidē usum cōuenit adhibere me-
dicamentum quod paulò antè descripsimus, ex lacte caprino,
medulla panis, croco, & ouorum uitellis constans, cui semi-
nis papaueris ʒ i. aut opij ʒ f. aut plus aut minus pro ratione
doloris admixtum sit. Pro sunt etiam in eundem usum cicutæ
folia, & hyoscyami, imposita & adhibita. Sed animaduertiē-
dum

dum erit, ut cum in feruentibus doloribus ad stupefaciētium usum fuerimus coacti, postea refoueamus partes per ea quæ calefaciunt. Nisi enim id ipsum fecerimus debiles & intemperatas, atq; adeo perpetuo fluori obnoxias partes reddemus, & ut in actionibus facile offendantur efficiemus. Calorifica uero sint origanum, satureia, sinapi, piper, & id genus alia. Porro adiuuare etiā oportet sudorum exclusionem, corpus calefaciendo & fricādo: ita tamē ne locos malē affectos contingamus. Præbenda deniq; in potu ea quæ urinam cient. Nam talia bilem per urinam euacuant. Soporē quoq; inducentia, quod fluores ab ipsis resiccentur & sistantur: atq; id maximē si post corporis purgationem exhibeantur conferre solent. Cibi illis dandi refrigerantes, non tamē humectantes: humiditas enim auget fluxionē. Famem & inediā ne tollerent: nam bilem acriorem reddunt. Ex fructibus, utantur pomis adstringentibus & mespilis, alijsq; quæ refrigerant, & simul fluxus cohibent. A uino prorsus, ut priores, abstinēat. Qui ob pituitæ influxum ægrotant, horum curationē à pituitæ euacuatione auspiciari oportet. Euacuatur autē humor pituitosus per uomitus, nihilominus tamen & infernē per uentrē. Vtilior uero in hoc malo per inferna purgatio, siue iuxta manus, siue iuxta pedes hæreat morbus & multo magis, si iuxta omnes corporis articulos fluxus constiterit. Familiarior enim pituitæ uia, & minus periculosa per intestinalia existit. Si enim in superiorē uentrē uolenter attracta non uacuetur, periculum inducit. Quapropter tutius est, ut ad infernam excretionē ducatur. Antē tamen purgantia medicamenta, ea quibus incidendi & extenuādi facultas inest exhibenda, ut hac ratione ad purgationē crassi humores præparētur, & idonei reddantur. Si euacuatio per purgationes fieri haud potest, tum inedia ac fame utendum est ad plures dies.

Victus.

Pituitosus
fluxus
curatione.

Pituitosi
famem fa-
cile ferunt.

7. Aph. 60

Qui enim natura pituitosi sunt, cam facile & citra noxam tolerare possunt. Hinc rectè ab Hippocrate dictum est: Cor-

poribus carnes humidus habentibus, famē adhibere cōuenit.

“Fames enim corpora siccāt. Utendum etiam frīctionibus di-

“scussorijs, ampliusq; efficacioribus clysteribus, & medicamē-

“tis urinam cientibus. Ceterum extrinsecus medicamenta quæ

dolores leniunt, & quæ discutere ac moderatè resiccare pos-

sunt adhibenda, de quibus paulò suprà diximus. Illis uerò in

morbi principio aliqua quibus adstringendi potentia est cō-

miscenda. A principio autē solis discutientibus utendū. Man-

suetissimum uerò hoc, quod habet: altheæ folia cocta trita-

tum per se, tum cum polline, aut hordeacea farina imposita.

Radix præterea eiusdē cocta in aqua mulsā trita, & imposita

unguentū tā cōfert. Et hoc unguentum, quod accipit: Oleorum laurini,

& irini, utriusq; 3. adipis suilli ueteris, butyri, utriusq; 3.

medulle ceruinæ 3. resine terebinthinæ 5. galbani in ace-

to dissoluti 3. hyssopi, radice altheæ, seminis fœnogræci,

Vicius,

sing. 3. ceræ quod satis est, fiat unguētū. Porro quæ ratione

nutricenti præbētur edulia, natura sicciora sint, & minus nu-

triant: ut est oryze succus, auenæ, & eiusmodi. Carnes tamen

auium montanarum assæ ijs haud incommodant. Cappares

ex aceto mulso mirificè prosunt. Vinū autē præbeatur quàm

Atræ bilis
fluxionis cu
ratio,

minimum, interualli tempore, tenuē, fuluū & uetū. Qui

atræ bilis fluxionibus molestantur, ij uenæ sectione, aut pur-

gatione sunt euacuandi. Venæ quidē sectione, quando sanguis

atræ bile infectus est. Purgatione uerò, quādo ad atram uer-

gunt bilem egrotantes. Si uerò ambo hæc simul reduārint,

non unum aliquod ex prædictis adhibere sufficerit, sed prius

secta uena, deinde medicamento purgante utendum. Quod

ipsum & in alijs malis duplici euacuatione indigentibus fa-

ciendum erit, ut in lib. 2. Paradoxorum nostrorum abunde

mon

monstrauiamus. In principio autem morbi, & in ipso uacuationis tempore, reprimentibus, & simul sensum calefacientibus utendum est. Post euacuationē uerò ijs quæ leniter calefacere, attenuare, & discutere possunt de quibus suprà satis superq; dictū est. Cæterum quoniā tophi & duri tumores subinde in articulis creantur, modo propter humoris qui ad eos decubuit crassitiē, terrestremq; duritiem: modo propter immodicum discutientium & resiccantium medicamentorum usum, sine eorum quæ molliendi facultate pollent mixtura: ideo ad eos remouendos ijs quæ in cap. De lienis duritia à nobis producta sunt medicamentis utendum. In primis uerò cōfert uetustissimus acerrimusq; caseus, cū suillæ carnis præpinguis & ueteris decocto contritus & impositus. Ad hoc malum cōducunt etiā ficus triui & impositi. Item althea bis cocta, auena, urtica, bryoniæ radix, bulbi, anethi, abrotoni, buphthalmi, marrubijq; folia, cū pice & sulphure uino permixti. Admiscendi etiā adipēs, suillus, caprinus, uitulinus, & anserinus. Medullæ item omnes, & alia quæ emolliēdi ui prædita sunt. Balneum sanè, ne id quidem silentio trāseamus, post inflammationum remissionem omnibus podagricis commodissimū existit. Dum lauant, spongiæ aceto & sale permixtis madefactæ, locis patientibus circumponendæ, ut à fluxione immunes permaneant. Lauare autem eos non semel tantum, sed iterum atque iterum in aëre per omnia moderato oportet. In aqua tamen calida non diutius morandum. Consultissimum itaque, ut aqua calida perfundantur. Vtile quoque ut totum corpus linteis siccis perfricetur. Præterea curati à podagra, hac se ratione à podagra deinceps tuebūtur. Si primum bis in anno, uere nimirum & autumnno, modo nihil sit quod id ipsum prohibeat, sanguinē largè detraxerint. Deinde si ijsdem tēporibus, & crebrius etiam medicamentis purganti

Tophorū
curatio.

An balneū
conducat
podagricis

Quomodo
quis à po-
dagra se
tueatur.

gantibus usi fuerint. Porro cibis ut etiam aliquid demant, & à satietate sibi caueant, necesse erit. Utendū autem cibis concoctu facilibus, & qui prompte in partes corporis distribuuntur, excrementisq; uacent. Vino aut prorsus abstinendum, aut parè admodum utendum. Exercitiorum creber sit usus,

6. Epi. par. idq; ante cibum. Labores enim, ut Hippocrates noster præcipit, cibos præcedant. Et ut rem uniuersam in pauca contraham, qui à podagra immunes esse cupiunt, hoc ut breuissimum ita & saluberrimum Hippocratis proceptum secum reputent: ἀσκησις ὑγιῆς ἀνορεξία τρυφερία, ἀσκήσις πένου.

Quod est: Sanitatis studium est, non satiari cibis, & impigrum esse ad labores. Somnus etiam & uenerea, ut idem docet, sint mediocria. Quod ad præjidiorum partem attinet, salminum in oleo tritus, & articulis affricus, omnes qui se ab hoc malo uindicare uolunt, magnificè iuuat, nisi

præter modum sicca intemperie sint præditi: coq; illitu & mane & uesperiper totum uitæ curriculum utendum est.

LEONHARTI

FVCHSII DE MEDEN-

DIS FEBRIBVS, L^{ra}

BER QVARE

TVS.

De diaria. Caput I.



DIARIA febris Græcis ἐφύμωρα ἐφύμωρα
 dicitur, quòd scilicet eius unica sit ac
 cessio, uno plurimum die, ex ipsius sal
 tem natura circumscripta. Desistit
 enim post primam accessionē, si quis
 eam rectè tractet. Est autem Galeno
 alijsq; ueteribus duplex diaria: una,
 quæ simpliciter & citra adiectionē sic nominatur. Hæc ul-
 tra unius diei naturalis spaciū, hoc est xxiiij. horas nō ex-
 trahitur. Altera, quæ cum adiectione diaria plurium dierum
 appellatur. Alio nomine Galeno Synochus non putrida nun-
 cupatur. Hæc in tertium usq; diem extenditur. Neq; est cur
 miretur quispiam hanc febrem dici diariam, cū tamen de
 substantia eius diariæ uocabulū non sit: ad triduū enim, ut di-
 ctum est, durat. Nam cū proprio atq; adeò cōuenienti no-
 mine careat, clarioris simulq; breuiore doctrine gratia, nō
 obstante quòd nomen aduersetur, cū natura huic ea dem sit
 quæ alijs diarijs, rectissimè diaria uocatur. Siquidem præter
 tria prima febrium genera, quorum unum est in quo spiri-
 tus plus iusto incalescit: alterum in quo humor putrescit: &
 tertium, in quo corpus, & solidæ eius partes febrilem calo-
 rem

Diaria du-
plex.Simplici-
ter.Diaria plu-
riū dierum.Tria prima
genera fe-
brium.

414 DE MEDENDIS FEBRIB.

rem ut habitum susceperunt: quartū excogitare atq; statuere genus necesse esset, si nō sub diaria cōplecteretur, ut fufius lib. 9. The. Meth. cap. 1. Galenus ostēdit. Diaria febris fit, cū absq; ulla putredine spiritus præter naturam incalescit & succenditur. Id quod multis modis accidit, nempe ob cutis densitatē, uigiliā, cruditatē, tristitiā, timorē, iram, curas animi uehementes, uisionē à sole, refrigerationē, Lassitudinē famem, ebrietatem, & inguinum tumorē. Notæ uerò quibus deprehenduntur, duplices sunt. Quædam enim communes omnium diariarum, & hæ quidē numero sex sunt. Prima pulsus, oēs enim diariæ, Gal. lib. 3. de Prædictione ex pulsibus auctore, in magnitudinē, celeritatē, & ebrietatemq; pulsus quantū in ipsis est, mutant. Exquisite autē seruant eam quæ secundū naturam est æqualitatem, molliciem, & ordinem. Altera, urina: prima namq; statim die ea concocta apparet, & bene colorata. Tertia, caloris qualitas: quæ in omnibus suaui & mitis existit. Quarta, declinatio: quæ in singulis cū sudore, rore, aut omnino cum aliquo optimo uapore accidit. Quinta, defectus malignorū symptomatum. Sexta, quod omnes à causa extrinseca, quam nostri primitiuam nominant, oriuntur. Quas singulas notas copiosius explicat lib. 1. ad Glauconem cap. 1. Et lib. 1. De diff. feb. cap. 7. Necnon lib. 2. De crisi bus cap. 13. Gale. Quædam etiam sunt notæ quibus particularia signa. Vigiliarū. quæuis diaria dignoscitur. qui enim ob uigiliās febricitat, hos color uitiosus, facies subtumida, oculorum motus manifestus (uix enim palpebras attollūt) humiditas palpebrarum, pulsusq; paruitas ostendit. Tristitiæ autē & curæ signa sunt, tenuitas corporis, oculorū cavitās & ariditas, insolitūq; decoloratio. At qui ob iram febricitant, neq; oculorum cavitatē, neq; uitiosum colorē, sed amplam caliditatē, tanquā ex profundo eleuatam, maioresq; pulsus habent. Qui ob solis uisionem

nem æstumq; febricitant, ijs cutis sicca est & calida, pulsus febrilis, caputq; deuri uidetur, oculi rubicundiores, uenæq; ijs in oculis, temporibus, fronte & tota facie interdum extenduntur. Ex frigore, quod fumosa excrementa intra cutē detinent, febricitantes grauedinibus & destillationibus corripiuntur, cutis eorum minus calida, corpus totum maiorem præ se fert humorem, nullusq; in facie squalor. Qui ex lassitudine laborant, ijs cutis sicciore est quam in alijs diarijs, pulsus paruus ijs qui supra modum defatigati sunt: alijs, qui non ita se defatigarunt, magnus. Qui ex inguinum tumore febricitant, pulsus maxime ueloces habent atq; frequentes, calor remq; plurimum, & post statum confestim ex profundo humiditas quædam calida quidem sed suauis attollitur. Et rubida facies magna ex parte ipsis inest, & maior tumor, & urine subalbæ. De quibus Galenus in locis antea citatis, & lib. 1. De diff. feb. cap. 11. copiosius scribit. Curandi ratio primū per uictus rationē perficitur, cuius quidē in omnibus diarijs simpliciter appellatis cōmunis scopus est, ut cibi boni succi, & cōcoctu faciles, ac distributioni idonei præbeantur. Vitis quidē à sole & iratis, qui refrigerent & humectent. Refrigeratis, qui minus nutriunt, & moderatē calefaciunt. Vigilijs aut tristitia, aut nimia cura confectis, qui humectant pariter ac somnum cōciliant. Defatigatis, qui maxime reficiunt. Cæterum in quibus corporis intēperies calidior & sicciore est, hos in primo statim accessionis insultu cibare oportet. Nisi enim quis hanc naturam statim cibet, ocysime in ea diaria febris in acutam mutabitur, ut copiosè Galenus lib. 10. Ther. Meth. cap. 5. ostendit. Vinum omnibus diarijs propriè & simpliciter nominatis aquosum, album, & tenuè conuenit. Nam præter id quod concoctionem iuuat, urinas etiam & sudores prouocat. Sed uigilijs, aut curis, aut tristitia maceratis, ube

Frigoris.

Lassitudinis.

Tumoris inguinum.

Victus.

Vinum omnibus diarijs conuenit.

uberius concedendum. Defatigatis, quantum conficere possunt. Iratis tamen, nisi omnino à perturbatione quieverint, uinū tutò nō datur. A uino etiā arcendi sunt, donec inflāmatiō fuerit soluta, qui ex inguine febricitant, ut copiosius Gal.

Curatio.

Ob lassitudinem & inguinum inflammationem.

lib. 1. ad Glauco. cap. 3. monstrauit. Curare autē oportet omnes diarias simpliciter dictas balneis, sic tamen ut eos qui ob lassitudinem, aut inguinum inflammationem febricitant, prius dulci tepidoq; ac multo oleo suauiter perfricatos, ad dulcium aquarum balneum ducas. Si uerò eos qui ex inguinum tumore febricitant, in aëre balnei immorari iusseris, haud quaquā nocebis. Reliquos omnes, quā citissimē oportet ab aere se-

Ob uigilias, curas tristitiā, & iram.

mouere. Qui ob uigilias, curas, tristitiā, atq; iram febricitant, eos quidem lauare subinde non oportet: uerū oleo copiosiore tepido, cui nihil adstrictionis insit, tum paululum fricare, tum ex consuetudine lauare conuenit. A solis uisione

Ob solis zelum.

febricitantes, protinus ab initio refrigeratione, & crebrioribus balneis aquæ dulcis, soliq; exigui olei perfusione citra frictionem curare oportet. Sint autem quæ refrigerant admota capiti, rosaceum & omphacinum, quod salis expers sit, & alia quæ suprà lib. 1. cap. 3. dicta sunt. Hæc uerò frigefacta deinceps lana excipienda sunt, ac suspensa in sublime manu expressa sincipiti instillanda; idq; assidue, donec febris incli-

Ob refrigerationem.

nauerit. Postea in balneum æger ducendus. Si quis ex frigore febricit, is quoq; ad balneum in febris declinatione ducendus est, caputq; ante & post lotionem irino oleo, aut nardino, aut simili fouendum. Qui ob famē febricitant, declinante statim

Ob famē.

accessione ad balneū ducēdi sunt, plurimoq; oleo dulci ac tepido perfunsi, molliter perfricandi, diutiusq; in solij calidi aqua continendi. Vbi egressi fuerint uires reficiendæ, deinde rursus ad balneum ducendi. Vbi denuò exierint, sedata balnei perturbatione, aqua calida propinanda, mox ptisanæ cre-

mor

mor exhibendus, & interdum lactuca assumenda, & pisces
 saxatiles molliq; carne præditi ex albo iure. Quod quale sit, <sup>Ius album,
Ob crudi-
tatem,</sup> docet Galenus lib. 4. De tuenda sanitate, & lib. 3. De alimēt.
 facul. cap. De piscibus molli carne præditi. Si propter crudi-
 tatem febris diaria accidit, considerandum erit num alius lu-
 brica sit, an adstricta. Si lubrica erit, & ea tantum quæ cor-
 rupta fuerunt euacuata esse uidebuntur: tum lauandum, tum
 nutriendum in remissione febris, sed non, nisi prius ijs quæ
 sunt circa uentriculum prospexerimus. Sin ita multa inanitio
 aut prius facta sit, aut nūc etiam duret, ut uirtus egrotantis
 defessa sit, satius est omissa lauatione cibare, sed prospicien-
 tes prius ijs quæ circa uentrem sunt. Prospicietur autē labo-
 rantibus, modo uacuatio amplius non duret, irrigatione uen-
 triculi ex oleo & absinthio, & alijs quæ supra lib. 3. cap. De
 uentriculi imbecillitate dicta sunt. Ea autem quæ uentriculo <sup>Tepida vē
triculo ro-
bur dissol-
uunt,</sup> imponuntur, abunde calentia sunt: quippe quod ea quæ te-
 pida sunt, omnia uentriculi firmitudinem dissoluant. Si uerò
 omnino uenter adstringitur, contrectatis hypochondrijs,
 mox toto uentre, considerandum num cibus in gracile inte-
 stinum, aut colum descenderit. Quod si alimenta adhuc in
 uētriculo persistāt, conetur æger plurima tepida aqua epota,
 immisso digito aut pēna, totū quod infestat ac grauat euome-
 re. Deinde fouere oportet hypochondria, & quiescere. At
 ubi iam ad intestina alimentum descenderit, iubendum ut de-
 cliui facie ac uentriculo recumbāt, uenterq; fouendus, ac so-
 mnus conciliandus: is enim mirificè cruditatem concoquit.
 Post somnum ad educenda excrementa glans supponēda, aut
 leui chysteri alius mouenda. Qui ex inguinum tumore febrē <sup>Ob ingui-
num tumo-
rem,</sup> conceperunt, ne medicum quidem, sicut etiam ceteri ferē o-
 mnes qui diaria laborant, interrogant quid sit faciendum: sed
 tumori aut ulceri tantum, quod in inguinibus excitatum est,

D prospi

prospicientes, ij tamen declinante accessione laudandi sunt. Te-
nui præterea victu nutriendi, & arcendi à uino, ut comme-
moratum paulò supra est. Hæc quidē ad curādi rationem fe-
brium diariarum simpliciter dictarum sufficiunt.

De diaria plurium dierum.

Caput. II.

Diaria plu-
riū dierū.

Synochus
citra putre-
dinem.
Causa.

Signa.

Curatio.

Febbris quedam diaria est plurium dierum, ut capite præ-
cedenti diximus: sic dicta, quod in tertium usque diem exten-
datur. Diaria autē uocata est, quod eiusdem naturæ sit cū dia-
rijs simpliciter dictis: desistit enim post primā accessionē, si
quis eam probè tractet. Quare meritò inter diarias cōsume-
ratur. Nec obstat quod eius accessio ultra unum protēdatur
diem, ut capite præcedenti fusius dictū est. Vocatur alio no-
mine synochus citra putredinē. Oritur ex densatione meatuum
cutis. Densatio autē ipsa uel obstructis exilibus meatibus uel
cōiuentibus uel etiā corpore ipso immoderatus densato, id
quod à frigore, aut qualitate uel balnei, uel medicamēti acer-
ba & adstringēte, sole feruente, & alijs quæ cutim siccare
ualēt euenit. Quia uerò propter stipationē intra corpus su-
midā fuliginosāq; excrementa detinentur plurima, foras uerò
quod de ijs effluit exiguum est, fit ut febris accēdatur. Depre-
1 henditur primum tactu, neq; enim densitas tactum exercita-
2 tū latere potest. Dein caloris motu, qui primo quidē insultu
mitis apparet, postea tamen ubi perdurauerit acrior euadit.
3 Tertio ex urina, quæ neq; crassitudine, neq; colore à naturali
4 multum est aliena. Quarto ex tumore corporis, qui manet,
nec collabitur. Oculi quoq; non sunt concaui, sed prominē-
5 tiores ac humidiores quā secundum naturā. Quinto ex pul-
su, qui æqualis, maximus, celer, frequens, & uehēmēs existit.
Qui ita laborant, si rectē curabuntur, ijs sanguinis missio est
adhi

adhibenda, tantumq; sanguinis est detrahendū, quantū uires tolerant. Pro certo quoq; habendum, nisi ijs qui hoc per naturā sunt habitu ut corpus inhabile ad trāspirationē habeāt, id adhibeatur praesidium, fore ut uel suffocentur, uel certē syncope omnino periclitentur. Corpore uacuato, nō multo post cibos & medicamenta ex ijs quæ detergunt, exhibebis. Quæ autē hoc præstant alimenta, sunt ptisana & mulsa. Medicamēta uerò, oxymeli, & quæcunq; incoquere in mulsa licet, ceu calamintha, hyssopum, origanum, serpillum, iris, & apiū. Verū hæc omnia calidiora sunt, ideoq; febres accendūt, ita utiq; ut uinū. Oxymeli autē solum nec febres accendit, & strenue deterget, sic ut ea quæ glutinosa crassaq; sunt dissoluat, & meatus obstructos liberet. Tercio die mane si uideris minimū esse quod de febre relinquitur, ac neq; putredinis humorū in pulsu nota subsit, neq; cruditatis in urina: suspecta uerò hora, qua primo die febris occupauit, extra meridiē sit ac præterierit, audacter hominē quān ocysimē lauabis, longe antē sextam horā. Abundē tamē fit, si intra horā tertiam lauationē cōpleueris. Ad eundē modū, si decimā horā suspectam habueris usq; ad septimā laues licet, quū tres æquinoctiales horas, quatuor uel inter balneū accessionisq; tēpus interponi abundē satis sit. Vbi in balneo corpus incaluerit, oleo prius dulci tepido unctū, ac moderatissime frictum, mox detergeri extrinsecus abluīq; debet. Moderatissime uerò detergent erui farina, tum hordeacea, tum fabacea. Post balneū præter aquā quæ parū apij incoctū in se habet, nihil est offerendum: licet quod inter balneū & suspectas horas spaciū erit, triū serē horarū cōijciamus. Si uerò circa uesperā aut duabus horis citius accessio inuadet, tum lauīse mane licebit, tum cibasse, sed tantum ptisanæ cremore. Deinde si suspectæ horæ nihil afferant, & lauare rursus si uelit licet, ac cibare. Sin ali-

Detergentia citra calefactionē,

Moderatē detergentia,

quid eueniat, & conferendum, id est, cum accessione quæ primo die inciderat, & tum urinæ considerandæ sunt, tum etiam pulsus. Quæ omnia profectò mediocria apparebunt, ubi exigua relinquitur obstructio. Quare ipsum & lauabis quarto die, & cibabis, ad iam dictas cōsiderationes spectans, sperabisq; nihil quinto die superuenturum. At si magna obstructio facta sit, ea febris ex diariarum genere non erit.

De synocho cum putredine. Cap. III.

Synochos. **Σύνοχος** Græcis medicis est, in qua una accessio ab initio ad finem perpetuò manēs, in multos dies porrigitur. Vel est, quæ omni mutatione magna usq; ad iudicium caret. Latinis rectè continens dicitur. Etsi uerò una est idea cuiusmodi febrium, à qua synochos eas nominant, natura tamē earundem minimè simplex unaq; est. Quædam nanq; earum nullam habent prorsus putredinis notam, quas ex diariarum febrium genere esse capite præcedente diximus, nominariq; synochos non putidas. De ijs hoc in loco nobis sermo non est. Quædam uerò manifestam habent putredinis notam, & ob id Synochi putridæ uocantur. Et de ijs hoc capite agitur. Barbari has Synochos, illas uerò synochas nominant. Galenus autem & Græci alij, ut commemoratum est, utraq; sub Synochi uoce cōplexi sunt. Febrium autem quæ synochi uoce complexi sunt. Febrium autem quæ synochi seu continentes dicuntur, tres sunt differentiæ. Nam quædam illarum à principio ad finem æquali magnitudine ac uehementia perdurāt: has Græci **ὁμοτόνους καὶ ἀκυστικούς**, hoc est in eodē uigore permanentes uocant. Quædam uerò semper augentur, & exiguum aliquid alijciunt: eas Græci **ἀναβατικούς καὶ ἐπικύματους**, id est incrementum suscipientes aut inualescentes nominant. Aliæ paulatim diminuuntur & decrescunt: has

rare aliquando egrotum cogaris, cui non solum antea secunda uene remedium prætermisum est, sed nunc quoq; uel per medicorum ignorantiam, uel ipsius laborantis propinquo- rumq; eius timiditatem, procedente tempore mittere sanguinem prohiberis, ad frigidam exhibendam accedes: sed diligenter ante discernens, quantum ex ea nocumentum cõtingere possit. Nam si id aut exiguum erit, aut nullum, offerenda potui est quæ prorsus sit gelida, quantum bibere egro libet. Quinimò magis id audebis, si frigida potioni insueuerit. Sin magnum timetur incommodum, ab hac quidem abstinendum, atque alijs auxilijs quibus obstructio eximatur, & abundantia uacuetur, & feruor febris deferbeat, utendum.

Frigida in
commoda.

Quæ singula è suis tibi petenda locis erunt: neque enim necesse est illa quouis in loco repetere. Porro incommoda quæ frigidam potionem intempestiuè immodiceq; exhibitam sequuntur hæc sunt. Primum, lentos crassosq; humores, siue obstructiones siue putredinem, siue phlegmonem, siue crystallos, siue scyrrhum, siue œdema creauerint, attenuari digeriq; prohibet. Quoties igitur ex ijs febris accenditur, ad eorum uacuationem frigida non conducit, ad præsens tamen nõ parum adfert leuamen, propterea quòd iam accensam febrem extinguit: uerùm quum causa eius adhuc permaneant, aliam denuo accendi febrem necesse est, atque ea quæ præcessit nõ nunquam difficiliorem, propterea quòd densatum ex frigida corpus est. Alterum incommodum est, quòd multas laborantis imbecillas particulas, siue ita se ex naturali intemperie habeant, siue ex uitio adscititio, ledit. Sic compertum est alijs gulam adeò uehementer esse lesam, ut uix deglutirent. Alijs uentriculum, ut uix concoquerent. Alijs ipsum uentriculi os, aut iecur, aut cõlum, aut pulmo, aut septum transversum, aut renes, aut uesica, aut tale quippiam aliud à frigidando

do percussum, ad propriam actionem infirmum est redditum. Nonnulli autem ex intempestiua immodicaq; eius positione, non multo interposito tempore, nec postmodum, sed ilico difficultate spirandi, & conuulsione, & tremore correpti sunt, ac toto, ut semel dicam, nervoso genere læsi. Vt Quibus frigida nō dāda, igitur in pauca rem contrahamus, quibuscunq; in principe particula tumor aliquis phlegmatodes, aut œdematodes, aut scyrrhi naturam obtinens constitit, ijs frigidam, offerre non oportet: sed nec ijs quibus obstructio putridusue humor non concoctus incommodat. Quod si uerò evidentes Quibus frigida dāda, percipis absq; iam dictis tumoribus concoctionis notas, neq; pars aliqua temperamento adeò frigido fuerit prædita, ut in hanc noxa procumbat, audacter frigidam dabis. Quippe solidarum animalis partiū natura roborata, prætenuatis iam humoribus opponitur: ita ut qui utiles sint, atque ad nutriendum habiles, hos quidem ad se trahat, inutiles uel peruentrem, uel per cutim eijciat. Quod si etiam frigida assuetus æger fuerit, maiori cum fiducia frigidam exhibebis, ipsa scilicet experientia iam edoctus, omnia uiscera eius occursum familiariter tolerare. Omnino nanque si quod frigidum adeò esset, ut ab hac offenderetur, per sanitatis id tempus euidenter offensam suam ostendisset. Ex ijs itaque Continentium febrium duo maxima remedia, per spicuum fit, continentium febrium maxima remedia esse hæc duo, sanguinis detractionem, & aquam frigidam. Verum illa nullo non tempore, modo uires sustineant: hæc quū & in pulsu, & urinis coctionis evidentes cernuntur notæ, febris autem est maxima. Viæ uerò ratio in ijs febribus Viæ ratio, hæc potissimum sit. His quibus secta est uena, post duas à sectione horas ptisanæ cremorem exhibebis, quietemq; imperabis. Vbi à somno excitati fuerint, rursus ptisanæ cremor præbendus. In hac viæ ratione usq; ad tertium diem

persistendū. Animaduertendū autē in synochis febribus tum alendos esse egros, quo tempore sani consueverant, & ubi maius leuamen sentiunt: ita enim alimentum facilius ferent. Quod si vires robustæ fuerint, & vigor morbi statim expectetur, tenuissimo uictu, & eo qui iam dictus est utēdum erit. Sin contrā vires imbecillæ fuerint, haud sine ingenti dispendio uictus tenuis exhibetur. Ergo in cibis offerendis uirium robur diligenter perpendendum. Hæc de curatione febris cōtinentis putridæ dixisse in præsentia satis sit. Qui plura desiderat, is Galenum lib. 9. The. Meth. ubi hanc ex professo & copiosissimè tradit, legat.

De continuis febribus. Cap. IIII.

συνεχὺς **πύρετος.** **F**ebbris quæ Græcis **συνεχὺς** Latinis uerò cōtinua nominatur, est, quæ non ante quā ex toto fuerit soluta desinit ad infabricationē, remissionem tamen aliquam sensilem in singulis accessionibus obtinet. Hinc perspicuū fit **συνόχου** **συνόχου** **καὶ** **συνεχὺς** hoc est, continētē, & continuā febres inter **καὶ** **συνε** se differre. Siquidē in synocha continentē ue nulla fit feruor **χὺς** diffēris remissio. Synechys autē seu cōtinua in singulis accessionibus remissionem sensilem obtinet. Item synochus unicam duntaxat accessionē habet, synechys uero plures. Conueniunt autem in eo, quod neutra earum ad infabricationē peruenit. Porro Græci medici, ut hanc quā diximus, statuerent differētiam, solæcisimum committere potius uoluerunt, quā formam ipsarum febrium sine nomine relinquere, ut alibi copiosius explicauimus. Continua febris fit, ubi unus duntaxat humor intra uasa putrescit. Cuius quidem tres sunt differentie, quæ iuxta humoris in uenis putrescentis diuersitatē procreantur. Si enim flaua bilis intra uasa putrescat, tertianam continuam, quæ alio nomine Græcis **καὶ** **πύρετος**, Latinis autē ardens appe-

Causa.

Differen-
tiæ febrium
cōtinuarū
tres.**καὶ** **πύρετος.**Ardens fe-
bris,

appe

appellatur, efficere solet. Si pituita putrescit in uenis, quotidiana cōtinua generatur. Si atra bilis, quartana cōtinua nascitur. Quare eiusdē generis sunt cū intermittētibus: cū tertiana quidem exquisita intermittente, tertiana cōtinua: quod scilicet perinde atq; illa tertio quoq; die accessionē habeat. Quotidiana continua cum quotidiana intermittente, quod scilicet singulis diebus accessionem obtineat. Quartana continua cū intermittente quartana, quia quouis quarto die inuadit: differunt tamen etiam ab inuicem, non obstante quòd eo qui utraq; facit humore communicent, duplici ratione. Vna quòd in continuis humor putrefactus intra uenas, ut dictum est, contineatur: in intermittētibus autē, per singulas corporis partes dispergatur. Altera, quod intermittentes ad infestationem desinant: impetu enim delationis ipsæ per se ipsas expurgantur: continuæ uerò ad infestationem non perueniunt, nisi ex toto fuerint solutæ. Nullum itaq; certius indicium febrium continuarum est, quàm quod nulla earum ad infestationē perueniat, donec ex integro desierit. Aliæ sunt illis cum intermittētibus communia. Exquisita enim febris ardens omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruat: hoc solo tamen discrimine uariat, quòd neq; cum rigore inuadit, neq; in quietem desinit. Simili modo quæ singulis diebus accessionem habet, exacerbatur uel, omnes exquisitæ quotidianæ notas præ se fert, sed quòd nō intermittit, hac re à quotidiana eiusdem generis differt. Pari ratione et ea quæ quarto quoq; die accessionem habet, quartanæ exquisitæ notas retinet, sed ad infestationem non cessat. Porrò quum continuas febres ex putridarum genere ex ijs quæ diximus nasci constet, necesse erit ut qui illas commodè curare uolet, putredinem inhibeat. Ita duæ statim se indicationes exhibent, quarum altera à febre, altera uerò à putredine sumitur. Atq;

Continuæ
eiusdē ge-
neris cum
intermittē-
tibus.

Continua-
rum & in-
intermittē-
tium diffe-
tia.

Signa.

Curatio.

416 DE MEDENDIS FEBRIB.

à febre rursus dua, scilicet ut portio febris, quæ iâ accēsa est percuretur: quæ uerò in generatione est, inhibeatur. Aliæq; dua à putredine, ut & quod putredinis iâ factū est sanemus: & quod in generatione adhuc est, sistamus. Quod in generatione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac quoque dua aliæ indicationes nascuntur, tum ut quod retentum est uacuetur, tum quod retinendum est prohibeatur. Sanè prohibebitur ijs præsijs, quæ obstructioni medētur. Huius rursus obstructionis quod iam occupauit, sanandum est: quod futurum, est propulsandum. At curabitur quidē obstructio nis quod iam factū est, per ea quæ obstructa liberant. Propulsabitur quod futurum est, si effluxum obstructiūm suorum cōpescamus. Vnde satis liquet, quod ultimum in ipsa resolutiua methodo est inuentum, id primum omnium in curatione esse peragendum. Quum itaq; particulatim rem expendentibus quinq; sint in febribus continuis à quibus indicationes colliguntur, febris nimirum, putredo, perspiratio impedita, obstructio, humorum destruentium copia, à postremo curandi ratio ausspicanda erit. Copia igitur humorū requirente euacuationem, principio si ualida fuerit uirtus, tempus & ætas, atq; alia consentiant, sanguinē mittere oportet. Vacuata multitudo ad alterius, puta obstructionis, curationem accedendum, medicamentisq; ijs quæ obstructiones tollere possunt, utendum. Verūm quoniam horum pleraque calida sunt, metuumdum ne tum putredine, tum febre augeāt. Itaq; ijs quæ citra calorem liberare ab obstructione ualent, utendum. Qualia uerò hæc sint, diximus suprâ capite nimirum huius libri secundo. Vbi autem quæ obstruunt, deterfa & dissecta sunt, per aluiū, urinas, ac sudores ea uacuare tenendum. Quum uerò materiæ quæ hæc efficiunt calidæ sint, necesse est tum putredinē, tum febrem augeri. Quare quoad
licet

Quinq; in
 dicationes
 curandarum
 feb. cōtin.

Copia hu-
 morum cu-
 ratio.

Obstru-
 ctionis &
 impeditæ
 perspira-
 tionis.

licet id agendum, ut quæ minus calefaciat materia deligatur: aut si qua inueniri potest quæ nõ calefaciat, quæadmodum in hoc casu balneum, utiq; ea petenda est. Balneũ uerò idipsum posse Galenus lib. 1. De tuend. sanitate ijs uerbis disertè docet. Dulcium calefactarum aquarum, si tepidiores sint, uis,, humida & frigida est. Et paulò pòst: Balneum si probè adhi-,, beas, duras tensasq; partes emollit, excrementum, liquamen-,, tumq; si quod intus ad cutem hæret, euocat. His itaq; pera-,, ctis, & deterfis ijs quæ cuti impacta fuerunt, atq; adeò oba- Putredinis structione ac impedita per spiratione amota, ad putredinis curationẽ ueniendum est. Proinde hoc tempore imprimis ui res roborare, quo & putredinẽ superent, & succos conco-,, quant, studebimus. Putredinem etiam sanabimus, si id quod corruptum est, omni ratione uacuabimus: quod reliquũ est, moderatis motibus, & refrigerante per spiratu, ad exactam mediocritatem reducemus, ac uacuationẽ eorum per urinã, deiectiones alui, uomitum, ac sudores moliemur. Vltimo ad Febri- febris curationem progrediendum, quæ quidem per refrige-,, rantia fieri solet. Omnis enim febris, quæ febris est, humecta tio refrigeratioq; remedia sunt. Quemadmodum autem ho- rum quodq; rectò fieri debeat, partim antea dictum est, par- tim etiam in sequentibus commemorabitur.

De ardente febre. Cap. V.

Ardēs febris, quæ Græcis, ut suprà ostensum est, καὶϋ= Causa. αος dicitur, è continuarũ est genere. Fit, cū flaua bi- Quo cõue niat febris lis in uenis putrescit. Eiusdem itaq; generis est cum tertiana ardēs cum exquisita intermittẽte, eo quod ab eodem quo ipsa humore exquisita tertiana in procreetur. Differt tamen etiam ab ea, quòd in hac flaua bi- intermittẽte, & quo ab ca differat, lis per totũ corpus feratur: in ardente autẽ febre is ipse hu- mor in uasis unã cum sanguine continetur. Hinc est quod in arden

418 DE MEDENDIS FEBRIB.

ardente febre singula acceſſiones ad inſebrecitationē nō perueniant. Quādo uerō in ijs bilis etiam uehementius agitatur, & à natura inualeſcente compellitur, tūc rigor ſuperuenit,

4. Aph. 58. & febris ipſa ſoluitur. Quod Hipocrates in Aphoriſmīs ijs
» teſtatur uerbis. A febre ardente habito, rigore ſuperueniente,

Signa. fit ſolutio. Dignoſcitur ijs notis. Lingua eorum qui hac febre laborāt, arida fit, craſſa, aſpera & nigra, uētriculi eroſio, ſitis intolerabilis, uigiliæ, nonnunquā etiā delirium. Alui deiectiones liquide & pallide. Quas ſingulas notas Hippocrates etiā

Ratio videtur & curatio. lib. 4. miſt. aph. 4. complexus eſt. Quod ad curandi rationem attinet, hac febre laborantium prima remedia ſunt, ut decū-

bat in loco frigido ad ſua uē aurā expoſito, à qua purius diſſicitur aēr. culcitra etiam molli, quæ frequenter ſternenda eſt. Stragula tenuiſſima ſint, & minimē ſordida, quæ aſidue mutantur, habeatq; lectus inſignem latitudinem, ut ad diuerſas ſubinde partes membra calefacta transferri cōmodē queāt. Tum aēr ignauior ſtabello excitetur. Cibi offerendi ſunt, quibus refrigerandi & humectandi uis ineſt: ut eſt lactuca, cucurbita, cremor ptiſanæ, oxalis, & eiufmodi. Potus ſit cinnamomi decocti aqua, aut omphaciū. Si æger aſſueuerit, poſt cibum frigidam deglutiendā dato, quātum eſt cochleare unū aut duo. Vel cum decocto hordei miſceantur Zulapium uio-laceum, roſaceum, & ijs ſimilia. Succo præterea ſolarū roſarum ſtomachum recreabis, atque alias refrigerationes machinaberis. uirentibus uitis, roſarum, nymphææ, uiolarū folijs & floribus ſolum ſternēdo, & aquam frigidā ſepius irrigando, riuulos aquarum moliendo, quæ ex propinquo ſua uiter inſtreant, ut ſuprà ſæpe à nobis expoſitum eſt. Initio etiā ſtatim uenā incidere oportet, modo ætas, tēpus, uirtus, & alia permiferint. De quibus copioſe Gal. lib. 1. ad Glau. cap. 13. diſſerit. Et ut idem lib. 1. Aph. com. 23. ait: in ardētis ſimis

Vena ſe-
tio.

simis febribus si usq; ad animi defectionem sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur, & febris extinguitur, & plurimis etiā alius citatur, & sudores emanant.

Thorax subinde ac stomachus palmulis cū rosaceo, aut oleo cotoneorum, aut nymphae tritis fouendus. Conueniunt & alia medicamenta refrigerantia, ut sunt palmites, intubum, polygonum, lactuca, oxalis, folia uitis, & similia. Sudariolū quoq; tenue complicatum, oleoq; & aqua calentibus madefactum, stomacho & thoraci applicetur: id enim febriū ardorem mirum in modum sedat. Lana quoque quantum manu capitur, aqua & oleo rosaceo calefactis imbibita, è sublimi in thoracē expressa, feruoris uehemētia facile obtundit. Hæc autē calida esse oportet, nam tepida mēbrorum uigore exoluant. Nec temerē etiam in febribus ardentissimis acetum admiscebis.

Medicamēta refrigerantia,

Tepida mēbrorū uigore exoluant.

Epithemata uerò & reliqua refrigerantia medicamenta, in principijs & incrementis accessionum nō sunt ad mouenda: hoc enim tempore corporis affectus adhuc ambient, & calor uiscera obsidet: quapropter adhibita calorem in profundū repellendo, maioris nocumēti occasione præstāt: igneus enim calor intus repressus, uehemētiori rursus ardore excitatur: sed in uigore exacerbationū calore iam per uersum corpus explicato, tū enim residuū caloris præternaturā circa uiscera derelictū promptè extinguetur. Hinc agri melius spirare incipiunt, & leuiori siti instantur: quidā etiā rorido efflante uapore deliniti, somnum capeſſunt. Epithemata autem, quibus in ijs febribus utendum est, sint eiusmodi, quæ habent: Liquorum stillaticiorum rosarum, lactucæ, utrorūq; ʒ 3. f. liquoris stillaticij, intubi satiui, utriusq; ʒ 1. f. aceti optimi ʒ 1. santalorum omnium, singulorū ʒ 1. caphuræ grana 4. commixtis omnibus fiat epithema. Porro instante uigore, & nullo eorū quæ dicta sunt supra ca. 3. prohibente,

Refrigerantia medicamenta quādo admodum uenda,

Epithema

syncera

Frigida
quomodo
refrangat.
In ardenti
bus febribus
biliosi hu-
mores aut
excernen-
di, aut ex-
tinguendi.

Balneum.

Si modera-
tior sit fe-
bris.

*syncera frigida iam tuto exhibenda est. Quòd si timor, quã-
uis minimus, obstiterit, primam potionẽ refractam propina-
bimus. Refrangitur autẽ in hunc modum. Sumito temperate
aquæ cyathum unum, cui quinque; syncera frigida admisceto,
et sic suspectis corporibus præbeto. Quid multa? in cura-
tione febrium ardētium horum alterum fieri necessariũ est,
si perfectè morbus solui debet: aut biliosos humores excerni,
aut eosdẽ extinguere. Excernuntur itaque per sudores, uomiti-
ones, et aluum. Extinguuntur autem frigide potu, quo sepi-
simè ardentissima febres ex toto curantur. Caterum balneum
ijs solum usui est, qui citra tumore ad inflammationis
aut erysipelatis naturam tendentem ardenti febre laborant.
Quòd si uerò cõcoctionis notæ in urinis apparuerint, mul-
tò magis conducet. Aeger qui quidẽ in ardentissima febre frigi-
do uri uult solio, sit iuuenis, moderato corporis habitu præ-
ditus, idque faciat æstatis tempore, ac anni constitutione calida
et sicca, inque febris uigore, sit quoque frigide lotioni assue-
tus. Moderatiori uerò existente febre, robustaque uirtute, si-
mul cum coctionis notis, solium aquæ dulcis et temperate
confert. Ex unctionibus etiã oleum chamæmelinum, præsertim
si continens aer frigidus sit. Materie copiam, ex qua remedia
ardentibus febribus competentia componuntur, sequentia capitula
abundè suppeditabunt.*

De exquisita tertiana intermittente.

Caput VI.

Causa.

Tertiana
exquisita
cur dicta.
Signa.

Tertiana febris intermittens exquisita ex flaua bile per-
sensiles corporis partes delata, et suis ipsius naturam
puram synceramque seruante, oritur. Quare cum ex bile syn-
cera, nullique alteri humori permixta procreetur, exquisita
medicis dicta est. In biliosioribus natura corporibus consistit,
et uigens

et uigenti etate, tempore æstiuo, calidis et siccis regionibus,
 similiq; aëris constitutione, uita etiam laboribus uigilijs, cu-
 ris, intensis cogitationibus ac solis feruoribus dedita et ex-
 posita. Ad hæc in eo quoq; facillè tertiana accenditur, qui ci-
 bis et potionibus calidis et siccis antea usus est. Hæc etiam
 statim ab initio inq; singulis accessionibus rigorem uehemen-
 tem affert: qua una quidè ratione ab ardente febre, ut supra est
 ostensum, differt. A quartana uerò rigore in hoc distat, quod Tertianæ ri-
gor quo di-
stet à rigo-
re quartanae
 corpus pungere, ac ueluti ulcerare uideatur: cum quartana
 refrigerationē habeat similimā ei quæ hyberno tempore sen-
 titur. Tertianā itaq; febrem nō cōtingit fieri sine rigore ue-
 hementi, pungente ac uulnerante carnē. Quartana uerò neq;
 primo statim die cum rigore inuadit uehementi. Nam pro-
 grediente ipsa atq; aucta, una quoq; rigor augetur, sensusq;
 ægotantium non est quasi eorum, qui punguntur, sed potius
 qui refrigerantur, et ueluti ad ossa usq; molestantur. Est et Tertianæ
pulsus,
 in tertiana pulsuum exactus ordo et æqualitas, qui tamen ad
 uehementiam ac magnitudinem atq; frequentiam in accessio-
 num incremento excitantur. Præterea in uigore etiam sitim In uigore
quæ cōtin-
gant,
 inuehit, ac hominem exurit, ut abiectis uestibus ager denu-
 detur, ampleq; et frequenter spiret, exuffletq; ueluti flam-
 mam, frigidamq; potandā flagitet. Calor æqualiter subinde
 per totum corpus diffunditur, nihiloq; magis thorax quàm
 extrema calent. Et si manum inieceris, primo quidè contactu
 calor plurimus ac mordax occurrit, ueluti cum uapore quo-
 dam erumpens: non multo tamen postea, à manu remanente
 uincitur. Ac tum potus ægotanti exhibendus est. Qui Potus quā
do exhibē-
dus, quidq;
eū sequat.
 ubi biberit, statim copia uaporis per cutem emergit, sudo-
 ris nuncia. Bilis denique uomitio superuenit, aluiusq; solui-
 tur, et biliosum mingunt, subruffum, subflauumq;, et mo-
 deratè crassum. Urina quoque statim nubeculam albam, aut
 subla

Quibus di-
gnoscitur
hæc febr. ad
7. circuitus
duratura.
Accessio-
nis longitu-
do.

sublationem laudabilem habet. Ruffioribus autem existentia-
bus urinis, neq; suspensione, neq; nubecula in primo circuitu
apparentibus, febris ad septem circuitus extēdetur. Præter-
ea ad infabricitationem desinit, ubi acceſſionis ſpaciū ho-
rarum æquinoctialium ad ſummum duodecim expedierit. Nā
hoc tempus longiſſimum eſt in ueris tertianis. Breuior uerò
aliquando prædicto ſpacio temporis acceſſio, in eo quòd ma-
gis ac minus plurimam habens differentiam, ob quantitatem
uidelicet aut qualitatem ipſius bilis, aut propter laborantis
uires, aut propter præſentē eo tempore corporis patientis
affectum. Febrē igitur quæ intra duodecim horas termina-
tur, exactam tertianam nominamus: quæ uerò diuturniorem
acceſſionem habuerit, ea non tertiana exquisita, ſed extenſa
uocatur. Quòd ſi quotidie febris cum uehementi rigore inua-
dit, & cum alijs tum urinarum, tum pulſuum, tum cætero-
rum notis, quas diximus, duplex tertiana nuncupatur. Quæ
ſingula copioſius proſequitur Galenus lib. 1. ad Glauco. cap.
5. Et lib. 2. De diff. feb. cap. 3. & lib. 2. De criſib. ca. 3. Tertia-
nam uerò exquisitam, ut quæ ex flaua bile commota inuale-
ſcat, quàm maxime fieri poteſt, refrigerare & humectare
oportet, is enim humor inter omnes qui in corpore ſunt, ca-
lidior ſicciorq; exiſtit. Aeger itaq; decumbat in loco frigido
ad aurā ſuauem, ut ca. 5. etiam diximus, expoſito. Solum ſpar-
gatur frequenter aqua frigida, liquoribus ſtillaticijs roſarū,
uiolarum, & ſimilium. Humi ſternantur folia ſalicum, uitis,
flores roſarum, uiolarum, nymphææ, & id genus aliorum.

Vidus.

Cibis utantur ægri quibus humectandi & refrigerandi ſa-
cultas ineſt. Ex oleribus quidem, atriplice, blito, malua, lactu-
ca, cucurbita, lapathio, intubis, & cuiusmodi. Ex alijs autē illis
conueniunt piſanæ ſuccus, & ex alica ſorbtiones, & ex pi-
ſcibus ſaxatiles. Ex uolatilibus, quæ mollibus conſtant carni-
bus

bus. Quæ uerò talia non sunt, eorū alæ, testiculi quoq; gallo-
 rum, & suum pedes & cerebra. Porcellorum etiā si dederis
 carnē liquefactam, nihil nocebit. Sed & oua ad sorbendum
 sunt offerenda, præsertim uitelli eorum: nam ij facilius quàm
 pars alba cōcoquuntur. Ex fructibus permittēdū ut illos degu-
 stent, qui nō omnino ad cōcoquendū difficiles sunt. Abstine-
 dum autem à melle, sinapi, salitis, omnibusq; acribus. A uino Potus,
 autē, antequā morbus cōcoquatur, omnino arcendus æger. In-
 terim bibat aquam decocti cinnamomi, aut hordei. Vel hoc
 planē utatur potu, qui habet: Zulapij uiolacei ꝯ 4. aquæ in
 qua parum cinnamomi decoctū sit lib. i. misce. Ceterum ubi
 cōcoqui cœperit morbus, dādum erit initio uinum tenue, æ-
 quosum, & paucū. Vbi uerò iam propē est ut soluatur mor-
 bus, amplius est offerendum. Hæc quidē sit uictus ratio in plu-
 ribus ueluti ad coniecturā exposita. Quod ad somni rationē In accessio-
nibus non
dormiendū,
 attinet, in accessione nō est dormiendum, sed uigilandum po-
 tius, ut sanguinis & spiritus, atq; adeo caloris naturalis ad
 interiora motio impediatur, inq; contrariū, & ad exteriora
 trahatur: aliàs enim febres uix dissoluuntur, & ad consistendū
 tēpus tardissimē perueniūt, fluxionesq; multiplicātur. Finita
 accessione somnus nō improbatur. Exercitia & omnes uehe-
 mentes motus cauēdi, ne cum Herodico, cuius Hippocrates in
 Epid. lib. 6. meminit, ægrotantes interficiamus. Animi per-
 turbationes, ira potissimum, timor, mœstitia, & similes, su-
 giendæ. Porro nō solum iam dicta uictus ratione, sed & me-
 dicamētis quæ refrigerare & humectare possūt, uti cōuenit.
 Quare ad bilis feruorē calorēq; mitigandum, ac restinguē-
 dum hoc decocto utendum quod accipit: Florum uiolarum, Par. 3.
Aph. 24.
 buglosi, rosarū purpurearum, singul. m. i. florum nymphae-
 m. f. intubi satiui utriusque, lactucæ, singul. m. i. f. passularū
 purgatarum ꝯ 1. prunorum damascenorum numero 11. semi-
Medicamē-
ta.
Decoctū
alterans,

- num intuborum satiuorū, lactuce, portulacæ, cucurbitæ, singulorum 3 1. radice cichorii 3 6. decoquantur singula in duabus libris aque fontanæ, donec tertia pars absumpta fuerit. Dein colo transfusis sacchari adiectione ius decocti dulce reddatur, albisq; oui purificetur, additis serapij de intubo satiuo latifolio, & zulapij uiolacei, utriusq; 3 1. f. commixtisq; omnibus fiat potio, de qua singulis diebus in aurora detur pondus 4. f. Quod si æger a potione abhorreat, detur pro ea hoc medicamentū, quod habet: Sacchari uiolacei, buglofi, rosacei, nymphæ, cichorii, singulorum 3 5. compositionis è prunis damascenis citra diacrydion 3 7. diarrhodon abbatis 3 1. specierū diatrionsantaloni 3 2. zulapij uiolacei quod satis est ad excipiendū, fiat mixtura. Nonnegligēda præterea erit biliosi humoris, si res ipsa exigat, uacuatio. Quare cum qui ad stomachum confluit, per uomitū educere oportet: qui quæ ratione ciendus sit, in superioribus libris est expositū. Eum autē qui ad inferiora repit, per inferiorē excretionē elicere oportet: quod quidē etiam sponte interdū in tertiana exquisita fieri solet. Quapropter aluius emollientibus clysteribus exmanicēda est, qualis est qui accipit: Maluæ, foliorum uiole herbe, mercurialis, intubi satini utriusq; singul. m. 1. seminis portulacæ, melonū, utriusq; 3 2. f. decoquantur in aqua iustæ quantitatis, quoad tertia pars absumpta fuerit. Colo diffundantur, & iuri decocti ipsius adijciantur casie fistularis reaces extractæ medulle 3 1. olei uiolacei 3 1. salis uulgaris 3 1. f. Misceatur singula, & fiat clyster. Per urinam quoq; & sudores diuertere oportet. Urina igitur potionibus, in quibus apium aut anethum maduerunt, prouocanda. Et si cōcoctio nis notæ apparebunt, iam tuto absinthium poteris exhibere, quod alioqui summum est uentriculi remediū, ubi hunc bilis infestauerit, si præsertim ex ipsius coma, quantum sufficiat, acci-

accipiēs, in melicrato maceraueris. Sudorem uerò hoc uel si ^{Sudorē eliciens,}
 mili medicamento euocabis, quod habet: Radicum apij, aspa-
 ragi, cichorij, singul. 3. 1. seminū petroselini, fœniculi, rusci,
 smyrnij, singul. 3. 2. cicerum nigrorum 3. 3. anethi m̄ 1. deco-
 quantur singula in aqua fontana iustæ quātītatis ad tertias,
 dein colo transfundantur, & sacchari adiectione ius decocti
 dulce reddatur, additis oxymelitis cōpositi 3. 2. fiatq; potio.
 Aut singula iam dicta redacta in pulucrē exhibeantur, qua- ^{Puluis.}
 libet uice 3. 1. aut 3. 1. 1. cum 3. 3. oxymelitis simplicis. Hæc autē
 medicamenta in declinatione accessionis, aut die qua æger à
 febre liber est exhibeantur. In hunc etiā usum proderit mun-
 ctio ex oleo chamemelino, anethino, & similibus. Balnea ^{Balneum}
 quoq; calida ex aqua potabili prosunt, tum quia aliquid bilis
 educunt, tum etiam quia sua qualitate plurimū iuuant. Nam
 huiuscemodi balnea humectant, & potentia refrigerant. Ma-
 rinæ uerò aquæ, & salsæ nitrosæ, atque sulphuræ, plus quidē
 bilis educunt, sed multò minus quàm potabiles prosunt. Præ-
 stat autem neq; ipsas utiles dicere, quādoquidē plus qualitate
 nocēt, quàm euacuationibus iuuent. Semper autem oportet
 contrarias qualitates, illis quæ præternaturam inualuerunt
 opponere: quàm hoc multò plus iuuat, quàm quomodolibet
 euacuare. Hæc igitur in balneis intētio sit, ut corpus madeat ^{Quæ in bal-}
 & humectetur: atque idcirco neque nitrum, neque salem, ne- ^{neis intētio}
 que sinapi inspergere oportet: at plurimum oleo calido per- ^{esse debeat}
 fusos ægros ad aquam perducere, ac madefacere. Et si in ea
 natæ uoluerint, quandiu potuerint, permittendum. Et qui
 balneis admodum delectantur, si etiam bis in die lauari per-
 miseris, non aberrabis, ut Galenus perspicuè libro primo ad
 Glauc. cap. 9. docet. Verum illud semper in memoria habeto,
 ut id in tempore fiat. Si uerò iam signa concoctionis osten-
 dantur, tunc etiam si sæpius laueris, nihil offendes.

Detertiana notha. Cap. VII.

Causa.

Signa.

Vicius.

Curatio.

Tertiana notha seu spuria fit quando bilis maxima ex parte pituita miscetur. Hinc est quod non singulas notas, ut in exquisita, purae ac syncerioris bilis naturam praeseferat. In ea etiam accessiois tempus duodecim horas excedit: neque etiam ut exquisita, septenis circuitibus iudicatur. Tardius denique in hac ipsa spuria tertiana coctionis notae apparent, neque tantus etiam in uigore calor. His accedit, quod non finitur, ut exquisita, sudoris copia. Quare uictus ratio in hac febre non sit in uniuersum quae refrigeret et humectet, sed aliquid quoque assumat quod calefaciat et incidat: praetacet enim crassior, neque adeo calida bilis. Plurimum igitur ea laborantes iuuat ptisanæ cremor, adiecto piperis modico, uel hyssopi, uel origani. Sorbitiones etiam concoctu faciles dandæ sunt. Porro cum accessiois tempus longius sit, atque adeo integrum diem duret, non sanè quotidie, sed alternis tantum diebus cibum exhibere oportet: hac enim ratione cauebimus ne morbus augeatur. Prouidendum uero summo studio ne morbus augeatur, ne uel egrotantis uires, quae longiori tempore laborare debent, prosternantur. Difficile uero est seruare utrumque, quoniam inedia quantum prosunt ad morbi concoctionem, tantum uel amplius officiunt uiribus. Cibi uero, quantum egroti robur adaugent, tantum concoctiones impediunt. Quare inedia quidem utendum, ubi ualentiores fuerint uires, et morbus concoctu difficilis. Largiori autem cibo, ubi uires sint imbecilliores, neque morbus concoctu contumax. Potus sit aqua, in qua parum cinnamomi decoctum sit, aut hordei: et tum quidem aliquid etiam hyssopi aut origani adiciatur. Quies conducit, exercitia uero nocent. Quod ad curandi rationem attinet, si sanguinem mittere oporteat, neque hoc quoque omittendum, sed ab initio statim, adhibita etatis, tempo

temporis, regionis, habitus corporis, & similium distinctione, tantumq; sanguinis detrahendum, quantum præsens exigat status. Clysteres quoq; non admodum molles iuuant, quæ Clysteres, lis est qui habet: Maluæ, mercurialis, foliorum uiolæ nigræ, origani, hyssopi, singul. m. 1. seminis cartami 3. coquantur singula in aqua iustæ quantitatis. Colato iuri adijciantur benedictæ laxatiuæ uocatæ, hieræ picræ, utriusq; 3. mellis rosacei 5 6. olei uiolacei, chamæmelini, utriusq; 3 1. f. salis uulgaris 3 2. fiat clyster. Cæterum exhibenda etiam decocta, quibus ea insunt quæ citra plurimam calefactionem & exiccationem incidere & urinâ ciere possunt. Cuiusmodi est quod Decoctū, accipit: Radicum apij, fœniculi, cichorij, singul. 3. 1. intubi satiui utriusq; origani, hyssopi, singul. m. 1. lactuæ m. 1. f. seminum quatuor frigidorum cōmunium, singul. 3 1. seminis fœniculi & apij, utriusq; 3 1. f. decoquantur in aquæ lib. duabus donec tertia pars absumatur. Ius colo transfusum sacchari adiectione dulce reddatur, ouiq; albuminibus purificatur. Deinde addantur serapij acidi simplicis, mellis rosacei colati, oxymelitis simplicis, singul. 3 1. f. & fiat potio, de qua quotidie in aurora detur pondus 3 4. posthæc ea quæ uentrē placidē subducūt sunt exhibēda, ut dilutum rhabarbari scenitici, cōpositio de psyllio, indi maior, diaphœnicon, & alia eiusmodi quæ per se aut alijs admixta bilem unā cum pituita educere possunt, qualia multa in superioribus libris, & lib. 2. De compositione medic. annotauimus. Post septimum diem iugiter decoctum comæ absinthij dandum est. Multos quos Vomitus, que iuuat oxymeli per se potum. Vomitus autem à cibo adeo ijs quibus hæc febris perdurauerit utilis est, ut multi, Galeano lib. 1. ad Glauc. teste, hoc uno præsidio curati sint. Hypochondria quoque calidis fouenda sunt medicamentis, ut scia picet flatus, qui ea distendunt, per illa discutiantur. Inter cæ-

tera uerò hoc potissimum conuenit, quòd habet: Florũ chamaemeli, meliloti, anethi, singul. m̃. i. absinthij m̃. f. rosarum purpurearũ m̃. i. seminum lini, scenogræci utriusq; 3 3. ebulliant singula in aqua sufficiēti ad tertias. Dein spōgia in hac irrigata hypochondria foueantur. Licebit & uentriculũ hoc Vnguentũ, aut simili unguēto inungere, quod accipit: Oleorũ mastichiani, rosacei, chamæmelini, singul. 3. 3. garyophylorum 3. 1. f. Balneum, ceræ quod satis sit, fiat unguentum. Ceterũ in tertianis nõ exquisitis, neq; statim circa initia balneare expedit: sed quum primũ notæ coctiones apparuerint.

De quartana. Cap. VIII.

Causa,

Signa,

Alterum genus febrium intermittentium est exquisita quartana, quæ ex solo atræ bilis humore putrescente generatur. Hæc quidẽ non statim primo die cum rigore inuadit uehementi: sed talis est, qualis ijs qui uehemēti gelu frigesunt. Progreſſiente autẽ ipsa atq; aucta, unã etiã rigor augetur, inualeſcitq; quotidie usq; ad totius morbi incrementũ, sensusq; eius non pungentis stimulantis'ue cutẽ, sicut in tertiana exquisita, sed uehementem algorẽ inducentis, & tanquam ossa frangentis existit. Pulsus in ea satis tardi sunt ac rari in principio accessionum. Quum uerò consiſit, atq; febris etiã augetur, necesse quidẽ est, ut ueloces fiãt & frequentes. Seruatur tamẽ et tũc propria ipsius tarditas & raritas, si accedentẽ uelocitatẽ atq; frequentia in accessionibus ratione perpendas. Verũ caloris motus, incrementum & uigor tertianis febribus contraria sunt. In ea enim paulatim humor ueluti lapis aliquis, aut testa, aut os, aut tale aliquod huiusce modi corpus frigidum & siccum succenditur. Vbi uerò aliqua ex eo flamma fuerit accensa, nihil humidum, aut à se incombustum in accessione relinquit. Atq; idcirco in hoc hu-

more

more longiores sunt cessationes, quàm in pituita, atq; inter-
missio exquisitè, pura uidetur: queniã hic quicquid atræ bilis
fuerit accensum, exhauritur atq; dispergitur. Bilis præterea
flauæ uomitus quartanam non comitatur. Urinæ tanquã per
crassiorem materiam excolatæ, sunt tenues, albæ & aquosæ.
Adhæc in autumnno potissimum incipit, erraticis superueniẽs
febris. Ceterum incipienda & laborantis natura seu tem-
peramentum, uictus ratio quæ antecessit, regio, ætas, & alia
eiusmodi: si enim frigida & sicca fuerit, tunc certius quar-
tanam futurã sperabimus, potissimum ubi eo tempore quar-
tanæ febres populariter uagabuntur. Quod ad curationem Curatio,
ipsam attinet, quartana laborãtes, initio moderatè & leni-
ter tractandi sunt, neq; ullo forti, uehementi uel medicamẽto,
aut euacuatione irritandi: nisi forte sanguis uehementè exupe-
rare uideatur, tum enim sanguis auferendus. Et simulatq; uena Venæ se-
ctio.
incisa, effluẽs sanguis niger ac crassior fuerit, audacius mitten-
dus est: quod si uerò flauus aut tenuis apparuerit, statim sup-
primendus. Venam uerò incidere oportet lienarem uocatam,
aut quæ est in sinistro cubito, mediam. Victum instituere cõ- Victus ra-
tio.
uenit optimũ, cum nimirũ qui minimè flatuosus sit. A' suil-
lis itaq; carnibus arcendi sunt ægri, atq; ab omnibus edulij
quæ uiscida ac tenacia sunt, & tardum habent exitum, atque
ab omnibus quæ refrigerant & exiccant corpus. Utendum
uerò est uolatilibus montanis, quæ boni succi sunt, & non in
paludibus degunt. Piscibus etiam qui molli carne, tenacita-
te carente, præditi sunt. Salsa etiam, & sinapi in cibo, ut in-
cidantur & extenuentur humores, adhibenda sunt. Vino
utendum est albo ac tenui, & mediocriter calido. A' frictio-
nibus autem & deambulationibus, & alijs hominum cõsue-
tis studijs, non sunt penitus prohibendi. A' balneis tamen, si
possunt, omnino abstineant, frictionibus duntaxat adhibi-

tis. Et si brevis, nec admodum uiolenta quartana accessio fue-
 rit, nihil nocebit si diebus inter accessione medijs ad consueta
 Clysteres, exercitia se transferat. Ceterum clysteribus quoq; utendum,
 à principio quidē mollibus, postmodū uerò acrioribus. Mola-
 les ex præcedente capite petes. Paulò uerò acrior hic est, qui
 habet: Maluæ, chamæmeli, mercurialis, foliorū uiolæ nigræ,
 singul. m̃. i. folliculorum senæ, radice polypodij, utriusq; 3
 5. hemionitidis m̃. i. f. decoquantur omnia in aqua sufficienti
 ad tertias. Iuri per colum transfuso admisceatur medullæ ca-
 siæ fistularis 3 i. compositionis diasenæ solutiue 3 f. olei uul-
 garis 3 3. mellis rosacei, salis fossilis 3 i. et fiat clyster. Certis
 etiam diebus dandum medicamentum quod diatrionpipericon
 uocatur. Imò rectè fecerint ægotates, si quotidie piper cum
 aqua biberint, Gale. lib. i. ad Glauconem autore. Hæc quidem
 in principio et augmento potissimum sunt facienda. Si uerò
 in uigore morbi ægotus esse uideatur, tunc tenuiorem ui-
 ctus rationem adhibere cōuenit quàm antea uel postea. Sta-
 tim uerò præcipiendum, ut in longum tempus quiescat, ac
 uisceribus prouidendum unguendo, illmendoq; his quæ mola-
 lire ac laxare possunt: qualia sunt quæ ex farina hordeacea,
 semine apij, iride, cumino, ruta, et ijs similibus componun-
 tur. Inter cætera uerò hypochondrium sinistrum hoc unguē-
 to erit inungendum, quod habet: Olei de caparibus 3 3. oleo-
 rum irini, amygdalarum dulcium, utriusq; 3 2. seminis apij,
 cumini, radice iridis, singulorum 3 i. ceræ quod satis, fina-
 gatur unguentum. Posthæc utendū medicamentis quæ ciendi
 urinam uim obtinent. In quem sanè usum malsa propman-
 da, in qua anethum, aut ruta, aut apium decoctū sit. Mox si
 cōcoctionis notæ apparuerint, purgandū medicamētis, quæ
 atrā bilē euacuant: idq; non semel tantum, sed sæpius, si fue-
 rit necessarium. Qualibus autem medicamentis purgantibus

ut n

utendum sit, libro primo: in capite De melancholia à nobis
 expositum est. Præter cætera tamē Aëtius laudat uinū dulce
 infusum in colocynthidis cavitatem: sic tamen ut illi admisce-
 atur quidpiam apij, aut dauci, iucunditatis gratia. Utendum
 quoq; uomitu à cibo. Et si nihil prohibuerit, elleborus albus Vomitus.
 est exhibendus, primū quidem permixtus raphanis, ut in su-
 perioribus est ostensum. Quod si nihil fecerit, elleborus ipse
 dandus. Quod si quispiam ab elleboro abhorruerit, hoc aut
 simili uti poterit, qd' accipit: Succu raphani, aut eius liquoris
 stillaticij ꝯ 4. oximelitis simplicis ꝯ 2. Misce, ac tepidū bibe-
 dum exhibe. Qui uerò nequeūt euomere, hi p inferiora pur-
 gandi. A purgatione dandū medicamentū è uiperis, quod the-
 riaca uocāt, aut quod illi facultate simile sit. Quicunq; inter
 initia morbi, aut omnino ante uigorem, aliquod ex ijs medi-
 camentis exhibēt, quartanā quæ simplex erat, sæpius duplicē
 faciunt, aut omnino maiore difficiliorēq;: ex duplici autem
 triplicem: uel prorsus ambas maiores difficilioresq; reddunt.

De quotidiana. Cap. IX.

Q Votidiana febris intermittens ex pituitæ putredine, p ^{Causa.}
 sentiētes corporis partes à natura detrusa, ortum ha-
 bet. Dicitur ἀμφιμικτή Græcis, quod scilicet Amphimic-
 singulis diebus accessiones facit. Quod si uerò priuatim ui- ^{rina,}
 trea pituita, quæ aliarum omniū frigidissima est, ex dimidio
 putrescat, hoc est, si non tota ipsius substantia æqualiter, sed
 aliquæ ipsius partes putruerint, aliquæ uerò non putruerint,
 Epialon febrem appellatā excitat: in qua ægri simul febrici- ^{Epialon fe-}
 tant & rigent, atq; in eodem tempore in omnibus corporis ^{bris,}
 partibus utrunq; calorē nimirum & frigus immodicū sen-
 tiunt. Siquidem partes humoris putredinē nondum expertæ,
 per omnes uenas, aut etiā reliquum corpus, sparsæ, rigorem

E s

creant:

creant: putrefactæ uerò, febrem accendūt. Quotidiana haud
 quaquā cum rigore primo statim die inuadit, sed progressū
 Signa temporis refrigeratio potius quā rigor occupat. Pulsus cū
 primū accessio fit, inordinatus est & inæqualis, tardus, par-
 uus ac debilis. Neq; etiam in augmēto uelocitas motus, ma-
 gnitudo, atque uehementia quotidianæ adsunt. Calor illi non
 tam acris ac uehemens, ut in tertiana: neq; enim adurit, neque
 denudari corpora & uestitum iactari cogit, neq; multū &
 crebrò spirare cōpellit, ac ueluti flammam ex ore efflare, uel
 frigidam expetere: sed humidus ac fumosus, cum multo uapo-
 re commixtus. Aegrè quoq; accenditur, ac longum consumit
 tempus, dum inualecendo peruenit ad summum. Minimè de-
 niq; qui sic febricitant, sitiunt: quod nō duntaxat lingua, imò
 totum corpus in hac febre humidissimū sit. Urinæ in quoti-
 dianis uel albæ, tenues, & aquosæ: uel crassæ, aut turbulentiæ.

Nullus omnino sudor in primis diebus erumpit, neq; unquā
 Accessio - exacta feбриendi quies attingitur. Occupant ferè decem &
 nis longitu- octo horarum spaciū. Vomitus etiam pituitosi ijs accidūt,
 do, & quæ per aluum excernuntur frigidiora & humidiora,
 crudiora, aquosiora, & pituitosiora sunt. Vniuersum quoq;
 corpus in hisce febribus plenum crudis humoribus inueni-
 tur. Ceterū quotidiana febris humidas pituitosas uel natu-
 ras maximè infestat. Hyemis quoq; tempore, humida & fri-
 gida cōstitutione, senili ætate & puerili, his deniq; qui ocio
 plurimo dediti sunt, crapulis, ebrietatibus, balneisq; assiduīs,
 post cibum præsertim, utuntur, quotidiana febris facillè acci-
 dit. Quas singulas notas fusius lib. 1. ad Glau. cap. 7. Et lib. 2.
 De diff. feb. cap. 4. Et lib. 2. de Crisibus cap. 5. Galenus pro-

Victus.

sequitur. Victus ratio in hac febre in uniuersum sit incisoria
 & extenuās: ideoq; ad ea capita recurrendum, erit, in quibus
 qualis sit hæc uictus species, à nobis est monstratum. Primis
 qui

quidem diebus aluus clysteribus mollientibus est eluenda. Deim oxymelite utendum, & alijs quæ urinam elicere possunt. Conuenient igitur decocta ex radice apij, petroselini, iridis, fœniculi, & similibus antea sæpius comemoratis, cum serapijs acido cõposito, melle rosaceo, è duabus radicibus, & alijs quibus incidendi & extenuandi facultas inest. Circa statum uerò de uentriculo est habenda sollicitudo, præsertim de eius ore. Quare ante cibum hoc unguento utendum, quod accipit: Oleorum mastichini, absinthitis, nardini, singul. 3 2. Vnguenti. f. mastiches, garyophyllorum, ligni, aloës, singul. 3. f. cinnamomi 3. i. cum cera quod satis est fiat unguentum, quo uentriculi regio inungatur. Deinceps iubendum est, ut ægri à raphano & cibus assumptis uomant. His etiam utendum medicamentis, quæ pituita subducunt: qualia multa in præcedentibus libris à nobis dicta sunt. Hæc pro curatione febris quotidianæ, quæ raro admodum accidit, dixisse satis sit.

De hectica febre. Cap. X.

HECTICA febris appellatur, quando calor præternaturalis non solum in spiritibus & humoribus, sed iam in partibus etiã solidis cõsistit. Hectica uerò dicitur, uel quod firma ac fixa sit, ac difficulter soluatur, quæadmodum habitus: uel quoniã habitum corporis cõprehendat. Sic enim uocare cõsueuerunt, solidas partes humidis distinguẽtes. Hæc dolorẽ nescit, & qui ea detinentur, nequaquam febricitare se existimant: neque enim calorem percipiunt, cum uniuersæ ipsis particule æqualiter sint excalsactæ. Hecticæ autem febres duplici modo generantur. Primum quidem magna ex parte ex ardentibus febribus, quæ adeò protrahuntur, ut longitudo tempore humorem in corpore cordis contentum absumant, uel etiam si copiosus adhuc subsistat, illæ uerò non

Hectica qd.

Hectica vn
de dicta.

Causa

tan=

444 DE MEDENDIS FEBRIB.

tantum hectica sunt, sed etiam $\mu\alpha\rho\alpha\sigma\mu\acute{o}\delta' \eta\varsigma$, hoc est tabida. Quæ autē manente adhuc humiditate generantur, ubi corpus cordis occupauerint, hinc maxime accenduntur, haud secus quàm lucernæ flamma ex ellychnio. Atq; hæc una quidē febrium hecticarum generatio. Reliqua est, quum statim inuasert, similem primum sui ortum diarijs facientes, aut ex mærore, aut ira, aut lassitudine nimia, unâ cum solis feruore nata. Hæc igitur febres non est admodum difficile curare.

$\mu\alpha\rho\alpha\sigma\mu\acute{o}\delta' \eta\varsigma$ - Atq; ex ipsis in tabe marcorem uel, qui Græcis $\mu\alpha\rho\alpha\sigma\mu\acute{o}\delta' \eta\varsigma$ dicitur, ex inscitia medicorum perueniunt, ubi iam exquisitè cōsistunt, & non adhuc incipiunt, has non modo curare difficile, imò etiâ impossibile. Earum enim natura calida & sicca est, ut tale aliquid patiatur cor, quale lucernæ funiculus, quum plurimū perustus fuerit. Nam qui ita torrefactus est, frangitur & dissoluitur, atq; ex ariditate continuitatē, amittit, adeò ut etiam si copiosum oleum superinfundas, flamma abundantior non possit accendi. Semper enim parua & imbecilla in ipsa palpitat, ac continuè fit minor, donec ex toto extinguitur. Talis quidem est febris quæ omnino $\mu\alpha\rho\alpha\sigma\mu\acute{o}\delta' \eta\varsigma$, hoc est tabida existit. Hectica uerò, quæ in marasmū incidit, cognitu promptissima atque facillima existit. Nam priusquam pulsum atque calorem tactu perpendas, uidebis oculos immodicè cōcauos, ueluti quibusdam quasi scrobibus reconditos, exhausta iam uniuersa in ipsis humida substantia, ita ut osium quibus palpebræ coherent eminentiæ conspiciantur. Sordes quidem in ipsis aridæ apparent, & quidam squalidus affectus, qualis maxime inest his qui toto die sub solis ardore iter longum per puluerem fecerunt. Flos etiam ille uitalis perijt, cutisq; in fronte arida distensaq; est. Palpebræ frequenter ueluti somnolentæ conuiuent. Verum passio eorum somnus non est, sed potius uigilandi impotentia.

Conta

Contabuere quoque carnes quæ in temporibus sunt, ut col-
lapsa uideantur, & concava loca. Quid enim aliud præter
ossa & cutē solā habēt? nam si denudatū uentrē inspexeris,
neq; intestinum, neque uiscus ullum superesse tibi uidebitur.
Hypochondria sursum ad thoracem conuellantur. Quòd si
eos tangere libeat, cutis quidem apprime arida est: quam si
digitis apprehendens extenderis, instar corij cuiusdam consi-
stit. Pulsus tenuis, durus, debilis, & frequens. Caliditas quum
primū manus admouetur debilis est, paulò post acris & ro-
dens erumpit, & magis cum amplius tangendo immorabe-
ris. Maxima quoq; erit hæc & minimè anceps nota: adhibi-
to cibo calor incenditur, pulsusq; magnitudine & uelocitate
intenditur. Tandiu autē hectica febris dicetur, quādiu nati-
ua humiditas reseruatur. Vbi uerò ambigitur, ne nihil am-
plius humoris supersit, absoluta iam tabes est, quæ Græcis
μαρμας uocatur. Hæcticas uerò febres priusquā ad tabē μαρμας
deueniant, omni conatu refrigeremus. Summa itaq; curatio-
nis in refrigerādo ac humectādo collocatur, tam ijs quæ ex-
tra admouentur, quā ijs quæ intra sumūtur. Aër igitur in-
spiratus frigidus sit & humidus. Et si natura talis nō sit, ar-
te paretur, ut dictū est suprā cap. 6. De curatione tertianæ. Febris he-
ctica quan-
diu dicatur.

Cibis utendū ijsdē uiribus præditis: ptisanæ nimirum cremo-
re, pane modico in aqua frigida macerato. Carnibus hædi,
phasianorū, uolucriū montanarū, testiculis gallorum, carni-
bus caporū, ouis sorbilibus, caseo recenti salis experte. Piscia
scibus saxatilibus, lactuca, intubis, cucurbita, spanachia, mala-
ua, & similibus. Cerasis, prunis, malis punicis, melonibus, fi-
cubus, & eiusmodi. Lac etiā mirificè ijs prodest, modò alia fe-
bris ab humorum putredine orta non cōplicitur. Quæ uerò
ad huius exquisitā exhibitionē sunt necessaria, ut alia multa
huic instituto cōueniētia tradit Gal. lib. 7. The. meth. copio-
sissi

Curatio.
Vicius.

sissimè. Potus sit aqua frigida moderatè sumpta, aut aqua in
 qua parum sit decoctū cinnamomi, aut uinum aquosum, te-
 nueq;. Cōuenit deniq; hefticis sæpius die cibum accipere, ut
 nimirum hac ratione caueant, ne una uice magnam ciborum
 copiam ingerant. Motum immodicum, & quicquid uires re-
 soluere potest, deuitent. Caterum medicamēta purgantia illis
 Clysteres, qui heftica febre laborant, non sunt propinanda. Sed si aluus
 plus æquo adstricta fuerit, leuibus & alterantibus clysteria-
 bus, adiecta medulla casie fistularis, hanc eluere oportet. In-
 tra corpus exhibenda medicamenta refrigerantia ac hume-
 ctantia: qualia inter composita hodie usitata sunt, serapia
 uiolaceum, de nymphaea, de intubo satiui, acidus, & similia.
 Item antidota diarrhodon abbatis, diatragacanthæ, diapapa-
 ueris, & id genus alia. Ex simplicibus succi & liquores stil-
 laticij lactucæ, portulacæ, intubi satiui, & papaueris. Interea
 uerò quæ extrinsecus admouētur, balnea huic morbo obno-
 xia quouis tempore idonea sunt. Balnea quidē aquarum dul-
 cium, ad quæ sanè ægrotus in lectulo, aut syndone deporte-
 tur, quatuorq; sint in singulis angulis qui syndonem ferant.
 Aquā uerò temperatissimam esse oportet, in ea etiam mode-
 ratè commorandum, ne scilicet quippiā è propria humiditate
 hauriatur, tantū abest ut in ea sudare debeat. Sunt qui in aqua
 decoquēdas herbas aliquot esse putēt: nempe uiolas, maluas,
 lactucas, flores nymphaeæ, & ijs similes. Nonnulli pedes uitu-
 linos, & capita agnina, quoad ossa carnibus separantur, in
 aqua decoquunt. Cauendum etiam ne perfundatur caput. Vbi
 itaque satis in balneo fuerit commoratus, & mox hinc edu-
 ctus in frigidam semel totus tingatur, ne uel breuissimo qui-
 dem spacio illic moratus. Heftica siquidem febricitantes, qui
 ad balneum accedunt, Galeno libro decimo The. meth. teste,
 nisi in frigidam sint immisi, nihil iuuantur. Protinus autem
 ubi

Solij frigi-
 di vfus,

ubi extractus fuerit, alter paratam habens syndonē ipsi ini-
 ciat, ac deinde aliam, tum in lectulo collocatus primum spon-
 gijis detergeatur, deinde mollibus linteis. Nec committent
 qui eum detergebunt, ut uiolentius eum cōtrecent, sed quo-
 ad fieri potest blandissimē. Quid multa? eam sanē curam, si
 fieri potest, omnino in balnei usu adhibeāt, quā Galloco iam
 citato requirit. Posthac quidē oleis frigidis, & alijs hume-
 ctandi facultate præditis inungendus erit. Inter cetera uerò *Linimētū.*
 hoc conuenit, quod accipit: Oleorū uiolacei ℥ ʒ. de cucurbita
 33. butyri recentis salis experti, pinguedinis porcine 3 1. ʒ.
 misce, & fac linimētum, quo totum inungatur corpus. Vel
 adiiciantur lenti cremoris tragacanthæ 32. medullæ cruris
 uitulini 33. ceræ quod satis est, fiatq; unguentum. Valet etiā
 oleum nymphæ, de papauere, & rosaceū, quod Galeno lib.
 3. De simplici. medic. facul. cap. 16. arentia corpora mirificē
 humectare potest. Vbi unctus fuerit, tum uestibus amictus
 rursus super lectulo, aut syndone in locum ubi cibatur redu-
 cendus & nutriendus. Proderit etiam cor atq; iecur epithe-
 matis refrigerare & humectare, qualia sunt quæ habet: Stila-
 ticiij humoris uiolarum, nymphæ, & lactucæ, singulorum *Epithema,*
 ℥ 3. aceti optimi ℥ ʒ. rosarum purpurearum, santalorum o-
 mnium, singul. 3 1. specierū diamargariton 3 ʒ. caphuræ gra-
 na 3. croci ʒ ʒ. misce, fiat epithema, quod cordis regioni ad-
 hibeatur frigidū. Aliud quod accipit liquoris stillaticij intu- *Aliud,*
 bi satiui, rosarum, utriusq; ℥ 4. liquoris stillaticij lactucæ ℥ 2.
 aceti 3 1. specierū diarrhodō abbatīs 3 1. ʒ. rasuræ eboris 3 ʒ.
 caphuræ ʒ ʒ. misce, fiat epithema, quod iecori admoueat.
 Conferūt hecicis etiā medicamenta quæ odore suo refrige-
 rant & humectant, ut sunt flores nymphæ, caphura, uiolæ,
 rosæ, & eiusmodi. Plura etiā ad institutū ac propositū faciē-
 tia reperiet studiosus in capite De phthisi seu tabe. Et certē
 in be

in heſtices curatione unicè ſtudentum, ut corpus non ſolum per ea quæ intra corpus ſumuntur refrigeremus & humectemus: uerum etiã per ea quæ extrinſecus admoventur, olei potiſſimum inunctionem. Quantum enim hoc ipſum foris adhibutum ad corporis ac uirium conſervationẽ ac reparationẽ conducat, celebri Pollionis Romuli exemplo docemur. Hunc enim centeſimum iam annum excedentem, ut autor eſt Plinius lib. 22. cap. 24. quum diuus Auguſtus hoſpes interrogaret, quã nam ratione maximè uigorem illum animi corporisq; cuſtodiret, reſpondit: Intus mulſo, foris oleo. Hæc quidem ad rectè curandas febres ſufficiunt.

Pollio Ro-
mulus,

De hemitritæo. Cap. XI.

Quamquã uaria ſint genera compositarum febrium, ut liquet ex lib. 2. Galeni de differẽ. febrium, cap. 7. & lib. 2. de criſib. cap. 9. & 10. & nos etiã ſummatim cap. 25. noſtri Compendij medicinæ indicauimus, de ea tamẽ hoc in loco duntaxat agemus, quæ ex tertiana intermittente, & quotidiana cõtina cõponitur, & Græcis ἡμιτρίτης dicitur, qd' ſcilicet tota eius natura dimidia parte, alterutrã prædictarum febriũ habeat. Vt nimirũ ſit hoc genus febris exemplum, inſtar cuius aliæ omnes febres compositæ curari queãt. Fit, ubi putreſcens pituita putreſactæ bili admiscetur. Terciana cum rigore inuadit, quotidiana cum extremitatũ refrigeratione. Quare quæ ambarum mixtura conſtat, horrorem inducit, qui rigore quidẽ minor eſt, maior autem ac uehementior refrigeratione, atq; adeò ijs ſimul confuſis neutrum uerè eminet. Generatur autẽ duplici modo: uel enim duæ acceſſiones ſtatim ab initio inuicem iunguntur, ſimulq; congregiuntur: uel ſeorſim ſingule accedunt. Vbi igitur tertiana præpollet, magis horrida febris efficitur, & rigoris etiam

Hemitri-
tæus quid.

Cauſa.

Signa.

Hemitritæi
generatio
duplex.

etiam nonnihil in progressu acceſſionis assumit, adestq; omni
 no calor maior & ardētior, & bilis uel uomitu, uel deiectione
 pellitur, aut humidus uapor exhalat. Quando altera pi-
 tuitosa superat, perfrictiones quidem summa exercent, pauci
 uerò horrores: neq; tamē sitis, neq; ardor in his affligit. Quā
 pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quotidiana
 continua, insultus quidē acceſſionis cum horrore accidit.
 At quum ex pituita proueniens febris præcelluerit, submis-
 siones pulsuum fiūt, & horrores. Si uerò calidior præualeat,
 subito incalescūt. Talis sanē est exactus hemitritæus ex equi-
 ualente duarum febrium, puta tertianæ intermittentis, &
 quotidianæ continuæ temperatura proficiscens. Non exquisitus
 uerò uel ob bilem largiorem, uel pituitam causatur, ut
 copiosius tradit Galenus lib. secūdo De diff. feb. capite octa-
 uo. Ex ijs quiuis intelligere potest, quæ in hac febre sit curā-
 diratio. Nam quum hemitritæus exquisitus ex æquiu-
 comixtione duarum febrium, tertianæ scilicet & quotidiana
 næ constet, curatio quoque adhibenda est tum tertianæ tum
 quotidianæ, ex æquo conueniens. In non exquisito uerò, quū
 uel bilem largiorem uel pituitam habeat, pro humoris exces-
 su uariatur etiā curatio ipsa. Si enim flaua bilis sit superior,
 præsidij maxime utemur quæ in tertiana exposuimus. Sin
 pituita, ijs quæ in quotidiana comprehensa sunt. In summa, ei
 quod urget incumbendū maxime est, sed ita, ne alterum pror-
 sus negligamus. Quare nihil attinet hic nominatim percen-
 sere, quibus hæc febris demolitur, remedia, quum quiuis ea
 pro humorum diuersitate & natura promptius ex capitibus
 De tertianæ & quotidianæ curatione colliget. Nam si quis
 primū simplicium febrium curationes exactē teneat, nullo
 labore compositas curabit. Proinde non est cur de compo-
 sitarum febrium curationibus plura scribamus.

De Pestilentia. Cap. XII.

QUUM multa passim extent recentiorum De pestilentia scripta, non est cur nos prolixè admodum de ea nunc descriamus, sed satis sit, si breuiter, ut in alijs fecimus, causas, indicia, & cur ad rationem indicauerimus. Quod igitur ad causas ipsas attinet, quæ sanè multæ sunt, nos eas tantum quæ medico sunt considerandæ, recensebimus. Fit itaque omnis pestilentia, Ga. lib. 1. De diff. feb. ca. 5 teste, à putredine aeris. In pestilenti igitur aeris constitutione inspiratio potissimum est causa, cur animantia, homines præsertim pestilentia corripiantur. Fit etiã aliquando ob humores, qui sunt in corpore, ad putrescendum paratos, quum leuem aliquam occasione ad febris originem ab aere ambiente acceperit animal. Magna uerò ex parte ab inspiratione incipit aeris circumstantis, à putrescibili euaporatione uitiati. Putredinis autem principium uel cadauerum multitudo non humatorum, ut in prælijs accidit: uel ex aliquibus lacubus & paludibus æstatis tempore uaporatio existit. Cõtingit autem quãdoq; præcedere ambientis aeris immensam caliditatem. Ita etiã non raro prauitas uictus humores, qui sunt in corpore putredini obnoxios reddit, atq; adeò causa est, cur eiusmodi corpora pestilentia corripiantur. Hinc accidit ut interdum, raro tamen, unus aliquis, aere nondum infecto, pestilentia laboret. Quid multa? cum aeris temperatura à naturali habitu ad immodicam caliditatem atq; humiditatem conuersa fuerit, pestilentia oriri necesse est. Hinc est quod Gale. lib. 1. De tempe. cap. 4. omnium aeris temperamentorum pessimum id esse, quod humidum & calidum est, scribat. Et sanè tunc ij potissimum laborant pestilentia, qui praua uictus ratione utuntur, atq; adeò omni genere superfluitatum pleni sunt. Quicumq; uerò probè uiscitant, & redundantibus uacant, ij quidem nequaquam, aut minimè mali sentiunt, ac facile ad

Causa.

Putris aer.

Humores
putredini
apti.Putredinis
principiũ.Tempera-
mentum ac-
ris calidum
& humidum
pessimum est.

cile ad naturalem reuertitur habitū. Ex ijs quæ diximus abū- Tempora
 dē etiam constat, tempora quibus pestilentia maximē gras- quibus po-
 satur, esse finem æstatis & autumnii initium: tum enim aer tissimū pe-
 atq; hominum corpora ad putrefactionem multis de causis stilentia gras-
 sunt magis abilia. Caterum indicia futuræ pestilentie nulla fatur
 sunt certiora, quàm quæ calidam & humidam anni constitua- Signa
 tionem portendunt: quæ quum ab alijs copiose sint exposita,
 non est cur hoc loco cōmemoremus. Notæ autē quæ hominē
 iam pestilentia correptum demonstrant, plurimæ etiam esse
 solent. inter eas autē certissima est, si post aures, aut sub alis,
 aut circa inguina potissimum bubones sine manifesta aliqua
 causa, aut in alijs etiam partibus carbunculi subito oriantur.
 Verum quum exoriuntur, naturæ robur præ se ferūt, ut quæ Bubones
 adeo sit potens, ut uenenum è corpore pellere conetur. Si exorti qd
 gnificat etiam partes corporis, à quibus maximē protruditur portēdant,
 uenenum. Si enim in collo apparuerint, cerebrū potissimum
 malè affici ostendunt. Si sub alis, cor: si uerò in inguinibus,
 iecur. Quod Hippocrates etiam libro 6. Epide. par. secundo Hippocra-
 Aph. 4. ijs uerbis significauit: Abscessus, ueluti bubones, si- tes,
 gna sunt earū partium unde exturberant. Verum quum non ,,
 semper appareant bubones: quod tamen si contingit, perni- ,,
 ciosissimum est, quod scilicet natura tum imbecilla existens,
 uenenum nō possit expellere: ad alias etiam notas respiciendū
 erit, quæ sunt eiusmodi. Aeger crebras sentit in corpore pun- Signa alia
 ctiones, exteriora frigent, interiora ardent, capitis adest gra- præter bus-
 uitas, oris siccitas, uehemens sitis, propensio magna ex parte bones, "
 ad somnum, interdum uerò uigiliæ & deliria, difficultas
 spiritus, uomitus creber, urina foetida, oculorumq; aspe-
 ctus toruus ac uariis. Si itaq; iam comprehensa indicia ap- Curatio
 paruerint, si nihil obstiterit, confestim uena incidenda est
 in eo latere in quo bubo existit. Si igitur post aures, aut Venæ sec-
tio,

circa mentum, aut alijs faciei aut colli partibus bubo emer-
 serit, ex humerali uena, quam hodie cephalicā nomināt, eius-
 dem lateris, sanguis mittēdus est. Si sub alis, interior uena, quā
 iecorariā & basilicam alio nomine uocant, in eodē latere in-
 cidenda erit. Aut ubi illa nō apparuerit, media. Si in inguine
 oriatur bubo, ex malleolo eiusdem lateris sanguis educendus.
 Quod si uerō nullus appareat bubo, ex eo latere detrahēdus
 sanguis, ubi maior dolor & grauitas. Quæ autem uena sit
 incidenda, partium malè affectarum dolor aut grauitas mon-
 strabit. Superioribus enim partibus malè habentibus, hume-
 ralis: ijs quæ infra collum sunt, interior aut media: inferiori-

Cucurbite bus uerō, poplitis aut malleoli uena incidenda. Porro si pro-
 pter etatē aut alijs de causis uenæ sectione uti nō licebit, cu-
 curbitule affigendæ erunt dorso, aut humeris, aut cruribus.

Medicamē- Corpore euacuato, mox medicamentū aliquod alexiterium,
 ta alexite- & quod uenenis aduersatur exhibendū, ut nimirum uenenū
 ria, attrahant, atq; à corde reuocent. hæc enim, Galeno lib. 5. De
 simpl. med. facul. ca. 17. autore, eorundē est actio. Inter cōplu-

Electuariū de ouo, ra uerō alia laudatur unicē, id quod hodie Electuariū de ouo
 dicitur, quo olim Maximilianus Imperator optimus & pru-
 dentissimus usus est. Hoc cur omnibus ferē alijs præferā, facit
 mirabilis eius affectus, quē sepē in multis egrotantibus osten-
 dit. Datur autem ijs qui prouectioris sunt etatis, pondere
 drachmæ unius. Iunioribus interdum scrupuli duo sufficiūt.

Potio, Diluitur autē in stillaticio liquore rosarum, aut intubi, aut
 scabiosæ. Eius etiā usus est in præseruando, si quotidie ex eo
 sumatur pondus grani unius aut duorū hordeaceorum, aut
 pisi magnitudine. Cōfert etiā multum hæc potio, quæ habet:
 Theriaces Andromachi ʒ. 1. antidoti Mitridatij ʒ. 1. boli
 armenie præparate ʒ. ʒ. 1. liquorum stillaticiorum rosarum,
 scabiosæ, buglosi, singul. ʒ. 1. Quanta enim sit boli armenie
 in pe

in peste abigenda uis, Galenus abundè docet lib. 9. De simp. med. facul. qui in magna peste quæ Romæ grassabatur, quotquot hoc medicamen biberunt, celeriter sanatos esse scribit. Quare hoc medicamētum, etsi uidetur uulgare & facile parabile, tamen ob id non est cōtemnendū. Habent enim eiusmodi medicamēta, magna ex parte, plus efficaciae, quàm ea quæ à longinquis petūtur terris. Et hic puluis, qui accipit, folio ^{Puluis optimus,} rū dictamni, radicis heptaphylli (tormētillā uocant) radicis pimpinellæ. Zedoariæ, gētianæ, radicis betonicæ altilis (tunc hodie corrupta uoce appellāt) sing. ʒ ʒ. boli armeniae præparatæ ʒ 1. terræ lēniæ ʒ 3. aloës iecorariæ, myrrhæ, utriusq; ʒ ʒ. croci ʒ 1. mastiches ʒ 2. terantur omnia subtilissimè, & fiat puluis. De quo ægrotanti detur pondus drachmæ unius in stillaticio liquore rosarū aut oxalidis. Plura alia infra, ubi De præseruatione agemus, remedia commemorabimus, & sunt certè ijs omnes recetiorum libri De pestilentia editi, reaferti. Sumpto igitur aliquo prædictorum medicamentorum, æger in lectum calidum stragulis probè munitum, ut ibi quatuor aut quinque aut pluribus horis, pro uirium ratione, sudet, reclinetur. Quod si uerò ægrè admodum sudet, pedibus eius lateres calidi, quo illorum calore sudorem elicias, subijciendi. Toto uerò hoc tempore quo ægro sudandum erit, unicè cauebimus ne dormiat, edat, aut bibat. A' sudore linteis purissimis sudor abstergendus. Dein è lecto, si lubet, aut potest, æger surgat, aëremq; extraneum uitet. Aër autē cubiculi in quo æger decumbit, cum rebus odoriferis, & suffimentis fragrantibus quotidie quater aut quinquies emēdetur, ac purificetur. Quæ qualia esse debeant, paulò post dicemus. A' sudore duabus aut tribus elapsis horis, pro uirtutis ratione, insculum gallinaceum edat æger: idq; fiat sæpius, nam confert quidem sæpè comedere, at parum admodum: & qui hac ra-

tione cibantur, ceteris citius conualescunt. Carnibus etiam subinde pullorum gallinaceorum cum oxalide, aut limonum succo, aut omphacio coctis uti licebit. Aeger quoq; omnino primo die à somno arcendus erit. In uehementiori siti utatur hac potione, quæ accipit, Zulapij uiolacei ℥ 3. serapij ex acido citrij succo ℥ 1. f. serapij de intubo satiui ℥ 2. decocti oxalidis, scabiosæ, et florum buglosi ℥ 10. uel tantundē liquoris stillaticij eorundem. Misce, et fiat potio. Poteris etiā aquæ, in qua hordei parum decoctum sit, succum rosarum, aut oxalidis, aut limonum, uel omphacium admiscere, atq; pro potu uti. Exhibenda quoq; medicamenta, potissimum ubi uires inualide fuerint, quæ cor aliasq; partes in corpore principatū habētes roborāt et cōfortant, quale est quod habet: Sacchari uiolacei, rosacei, buglossacci, sing. ℥ 1. f. boli armænie præparatæ 3 1. coralliorum rubeorum 3 1. corticum mali citrij 3 1. f. caphuræ 3 f. cum serapio de acido citrij succo quod satis est, fiat antidotus liquida. Cordis etiam regioni, maximè ubi circa thoracem adhuc subesse æstum senserit aeger, epithema hoc imponendum, quod habet: Liquoris stillaticij rosarum, buglosi, oxalidis, singul. ℥ 4. specierum antidoti è gemmis 3 1. ligni aloës, santalorum purpureorum, corticum mali citrij in puluerem redactorum, ossis cordis ceruini, sing. 3 f. croci gr. 6. cōmixtis omnibus fiat epithema. Ceterum unice quoq; studendū, ut humores ueneni ad locum ubi bubones emerferunt, trahantur appositis cucurbitulis magnis, aut medicamentis alijs trahendi uim obtinentibus, quale est quod habet: Ficuum pinguium numero 6. passularum ℥ 5. salis fossilis 3 2. mellis 3 1. cum oleo chamæmelino ad emplastri formam reducantur, quod calefactum buboni imponatur. Aut eiusmodi, quod ita conficitur. Accipe è cepis quæ maxima est, ac capite eius amputato, perforato

Potus.

Medicamentum cōfortans.
Epithema.

Localia.

ferato totam, & theriaca, Andromachi imple, additis succis
 ruta uel saluæ. Quo peracto, foramē quod in capite est cepæ
 luto obturetur, & cepa igni admota torreatur. Vbi satis to-
 sta uidebitur, cortices eius auferantur, & subinde in mortario
 contundatur, donec emplastri consistentiā habere uideatur,
 & buboni imponatur. Nec est quod te Gentilis, Valeſci, & ^{Error re-}
 nonnullorum aliorum moueat autoritas, cur minus theriacā ^{centiorū,}
 bubonibus imponas: neq; enim ut illi, toto cœlo errantes, pu-
 tarunt, propellendo à se agit theriaca, aut aliud huic simile
 medicamentum alexiterium: sed potius ad se trahendo, ut li-
 bro 1. capite De conuulsione, satis ex Galeni monumentis
 monstrauimus. Valet etiam hoc quod accipit: Farinæ scæno- ^{Aliud,}
 græci, seminis lini, florum chamæmeli, singulorum ꝯ 1. r. a-
 dicis althææ, liliorum alborum, utriusq; ꝯ 5. ficus nume. 6. fo-
 liorum distamni ꝯ 3. radices phu ꝯ 2. seminis sinapi ꝯ 1. f. fi-
 mi columbini ꝯ 1. oleorum liliacei & chamæmelini, singul. ꝯ
 1. f. reducātur ad emplastri aut pultis cōsistentiā. Hoc ipsum
 etiam ad suppurationē cōducit. Laudatur & hoc, quod ha- ^{Aliud,}
 bet: Emplastri diachylon simplicis ꝯ 2. ammoniaci, galbani,
 singulorum ꝯ 1. contusis omnibus, ad emplastri consistentiam
 reducantur. Porro si bubo sua sponte nō rumpatur, imponē-
 dus subinde finus anserinus, dissolutus in oleo uulgari, aut
 chamæmelino. Hæc de curatione eorum qui pestilentia cor-
 repta sunt, dixisse satis sit. Nunc quo pacto aliquis à pestilen-
 tia, quæ locum aliquem infestat, præseruari possit, breuiter
 exponemus. Quum ex superioribus satis constet, pestilentia
 fieri ex inspiratione aeris pestilentis ac putridi, nullum cer-
 tē præsentius remedium fuga ipsa excogitari potest. Neque <sup>Præserua-
tio à pesti-
lencia,
Aer.</sup>
 enim ulla alia aeris pestilentis euitandi ratio est, & inuitis <sup>Fuga opti-
mū reme-
dium,</sup>
 etiam nobis hauriendus erit, nisi in locum cōcesserimus ubi
 minimè uitiosus sit, sed planè optimus. Quod eo magis, ac-
 citius,

citius etiam faciendum erit, quod malum ipsum contagioni obnoxium sit, quemadmodum experientia ipsa docet. Quare quibus commodè per officia licet, y nulla ratione se induci patiantur, ut in aëre pestilente moriantur. Quod nisi fecerint, se presenti mortis periculo exponēt. Si uerò certas ac iustas ob causas ut fugias minimè licuerit, tum prima cura sit ut domus in qua tibi commorandum erit, ab omni fœtore pura atq; aliena sit. Fensetræ eiusdem clausæ sint, ne aër pestilens ingrediatur. Rarò & non nisi cælo sereno in publicum prodeundum, neq; id etiā nisi prius sumpto medicamento, quod à cōtagione conseruare queat. In ædibus etiā quotidie succendendus ignis è lignis quercinis aut iuniperinis, quo aer illarum purgetur. Vel carbonibus uiuis puluis inspergatur, qui habet: Rosmarini m. s. saluie, betonicæ, absinthij, maioranæ, origani, singu. m. i. terantur omnia subtilissimè, & fiat puluis. Aut ille qui accipit: Granorum iuniperi 3. myrrhæ 3. thuris, mastiches, utriusq; 3. 3. radicis gariophyllatæ 3. 3. rute 3. f. corticū cupressi 3. 3. tritis omnibus fiat puluis. Pauperes ligna iuniperina fissa, aut grana ipsa carbonibus imponent: ditiores ligno aloës, aut puluere galliæ maschatæ, garyophyllorū, & similitū utantur. Plura suffimentorū genera inuenient studiosi in libris superioribus, & lib. 1. De comp. med. cap. 18. Aestatis tempore aer frigidis rebus depuretur, floribus rosarum, uioletarū, nymphææ, pampinis, folijs salicis. Pauimentum etiā stillaticio liquore rosarū, oxalidis, & similibus irroretur, aut aqua frigida & aceto. lnuat etiā odorare rosas, acetum, caphurā, santalā, & ijs similia. Ceterum cum Galenus lib. 1. De diff. feb. cap. 4. unā & primā esse curā eorum debere tradat qui à pestilentia tuti esse cupiunt, ut corpus quàm maximè superfluitatibus uacet, & optimè spiret, nihil æquè fugiendum erit ac nimia cibi & potus impletio.

Cibis

Cibis quoque utendum facilis cōcoctionis, & putrefactioni ^{Cibus &} minimè obnoxijis. Semper etiam ijs aliquid aceti admiscendū, ^{Potus.} aut acidus alius quispiam succus, omphacium nimirum, aut citrij mali, aut limonū succus. Aestatis tēpore oleribus utendum, buglossō, intubis, lactuca, & oxalide. Hyeme salvia, petroselinū, oreoselinū, maiorana, & hyssopo. Fructibus omnibus abstinendum, nisi acidi fuerint: ut sunt mala punica, citria, limones, & ijs similia. Potus sit uinum tenue & aquosum. Caueat quisq; sibi à meratoris potu, & musto. Quid multa? tota uictus ratio sit refrigerans & desiccans, neq; enim opus est, ut hoc loco singulatim omnium alimentorum facultates enarremus, cū id ipsum à Galeno potius sit requirendum, qui hoc in tribus libris abundè præstitit. Exercitio utendum ^{Exercitiū.} non nisi mediocri, & in loco temperato, atq; aëre prius per medicamenta ac suffitus purificato, & emendato. Cauendæ igitur choreæ, item cursus, saltationes, & quicquid est eius generis quod crebras inspirationes requirit. Quare pestilenti tempore choreas magistratus publico edicto proposito uetare deberet: præsertim cū etiam experientia ipsa doceat multos hac ratione infectos periisse. Somnus & uigilia, ^{Somnus & uigilia.} ut omnia alia, sint moderata Dormiendū autē in cubiculo bene obturato & clauso, cuius etiam aër suffitu aliquo sit purificatus. Linteis utendum mundis, & aliquādiu cum rebus odoriferis repositis. A somno ubi experrectus fueris prima cura ^{Excretio.} sit ut corpus à superuacuis exoneres. Vnicè autem cauebis, ne aluus adstricta sit. Quare si sua sponte quotidie non deiecerit, catapotijs Ruffi uocatis, aut clysteri molli, aut glāribus hanc irritabis. Corpore à redundantijis purgato, medicamentum aliquod sumendum, quod à pestilentie contagione munire potest, qualia multa paulò post cōmemorabimus. Et si in publicum prodicundum erit, zedoariam, aut angeli-

Venus. *cam, aut pimpinellam commanducabis, aut rutam odorabis:*
Balnea. *mirificè enim huius odor pestilenti auræ refragatur. Coitus immoderatus præsertim unicè fugiendus. Balnea, publica potissimum, in uniuersum detestanda, quòd tum apertis corporis meatibus facile aër pestilens ingrediatur. Porro pestilente tempore iuuenes, & qui sanguine abundant, uenæ sectione utantur. Neque semel tantum, modò nihil aliud impediatur, sed iterum atq; iterum sanguinem educere interdum maximum ad tuendam sanitatem momentum affert. Purgandum etiam corpus medicamentis purgatorijs, idq; maximè uere & autumno. Qualia autem esse debeant, è superioribus libris quibus scire poterit. Nos enim hic capita tantum rerum attingimus. Quod ad animi perturbationes attinet, fugienda tristitia, ira, timor, & id genus alia pathemata animi. Gaudio uerò utendum modiocri. Nunc reliquum est ut ad præseruantia medicamenta progrediamur, inter quæ primum locum apud omnes obtinent catapotia Rusi nominata, quæ habent: Aloës iecorariæ partes duas, croci orientalis, myrrhæ, utriusq; partem unam. Cum uino albo fingantur catapotia, aut cum stillaticio liquore scabiosæ. De ijs quotidie sumi potest 3. i. plus aut minus pro ætatis ratione. Verùm alia est hæc compositio ab ea quam Rufus tradit. Ea enim crocum non habet, sed pro eo potius guttam ammoniacam recipit. Præterea compositio Rusi potio est, ut satis liquet ex lib. 2. cap. 35. Pauli Aeginetæ. Constat autem catapotia ipsa, propter aloën & myrrham, miram habere efficaciam aduersus pestiferæ luis contagia. Potest etiam usus esse harum pilularum, quæ habent: Aloës iecorariæ 3. i. myrrhæ 3. i. f. agarici præparati 3. i. croci orientalis 3. f. boli armenie præparatæ 3. i. seminis mali citrij scr. 2. mastiches scr. f. radidis pimpinellæ 3. f. cum stillaticio rosarum liquore fiant ex 3. i. pilule 13. De qui*

Animi per-
turbatio-
nes.
Præseruan-
tia medica-
menta.
Catapotia
Rusi voca-
ta.

Cōpositio
Rusi.

Pilulæ.

quibus unam uel duas sumere licebit. Potest etiam usus esse illius medicamēti, quod Electuarium de nucibus appellatur, ^{Electuariū de nucib⁹.} quod accipit: Iuglandium numero 20. ficuum pinguium numero 15. rutæ m. 2. absinthij, parthenij, scabiosæ, singul. m. 1. radicis aristolochiæ lōgæ ꝓ f. radicis pistolochiæ ꝓ 1. f. radicis tormentillæ, petasites, pimpinellæ, singul. ꝓ 2. f. foliorū dictamni m. 1. baccarū lauri ꝓ 3. cornu cerui usti ꝓ 2. f. macearis, myrrhæ, boli armenię, terræ lemnïæ, singul. ꝓ 3. salis marini ꝓ 1. f. nucis uomicæ ꝓ 2. florum buglosi m. 1. contusis ac tritis omnibus excipiantur ꝓ 2. mellis despumati, & fiat medicamentum liquidum in modum ecligmatis. Valet plurimū & is puluis, qui habet: Foliorū dictamni ꝓ f. radicū zedoarīæ, betonicæ altilis, pimpinellæ tormentillæ, singul. ꝓ f. corticum citrij mali ꝓ 3. terræ lemnïæ ꝓ 6. boli armenię ꝓ 1. myrrhæ selectæ, aloës iecorariæ, utriusq; ꝓ f. croci ꝓ f. mastiches ꝓ 1. f. radicis glycyrrhizæ ꝓ 1. scabiosæ, oxalidis, utriusq; ꝓ 3. santalorum purpureorum ꝓ 1. ramentorum eboris, antheræ, utriusq; ꝓ f. ossis cordis ceruini, coralliorū rubeorum, utriusq; ꝓ 2. caphuræ grana 5. Terantur omnia, & fiat puluis. Si lubet, ex ijs conficies orbiculos aut morsulos cum saccharo, & liquoribus stillaticijs rosarum & scabiosæ, & de ijs quotidie drachmæ unius pondus exhibebis, aut plus. Commendatur unicè quoq; bolus armenia cū aceto sumpta, ut supra dictum est. Item theriaca, mithridatum, & id genus alia, quæ passim ab omnibus sunt copiosè annotata. Quare hic finem facimus.

LEONHARTI

FVCHSII DE MEDEN^aDIS TVMORIBVS PRAE^aTER NATVRAM LI^aBER QVIN^a

TVS.

De inflammatione. Cap. I.

Inflamma-
tio.φλεγμα-
νι bifariā
sumitur.
Genera-
tum.

Proprie.

Causa.

Signa.

VAM Latini inflammationem vo-
cant, hæc Græcis φλεγμανι dicitur.
Vox autem φλεγμανι, illis bifariā
sumitur. Generatim pro omni calido
& dolorifico cum seruire tumore, ut
planè tum idem quod φλόγωσις si-
gnificet. Sic sanè herpes, erysipe-
la & carbunculi phlegmones dicuntur. Quæ in significatio-
ne ab Hippocrate & alijs ueteribus uox est usurpata. Pro-
priè autè phlegmone est, tumor supra seruire effruescen-
tiam ue rubens, dolens, durus, & tactu renitens. Quod copio-
sius tradit Galenus lib. 13. The. Meth. ab initio statim. Nos
hoc loco de phlegmone quæ propriè sic appellatur, & in
externis partibus oboritur (nam de internarū inflāmationi-
bus superioribus libris actum est) differemus. Fit hæc ipsa à
sanguine bono, & crassitie mediocri, qui in particulā aliquā
uniuersim influit, atq; propter copiam impactus inhaeret: id
quod propter uulnera, fracturas, cōtusiones, luxationes, ul-
cera, & id genus alia quæ fluxionē concitare possunt, euenit.
Inflammatione in particula aliqua orta, uehemens dolor ur-
get, nisi eiusmodi sit quæ sensum omnino difficilè habuerit:
pulsus

pulsus in profundo molestus accidit, tendiq; prorsus ac frangi particula apparet, & uehemētē calorē persentit, ut quasi comburi uideatur, unde & refrigerari desiderat. Talisq; rubor per summa uiget, qualis ex balneis aduenit, aut ex igne, aut quouis alio modo calefactis. Quæ singula fusiꝯ loco iam citato, & lib. 2. ad Glauc. cap. 1. Galenus prosequitur. Quum Curatio, itaq; inflammatiō particulā quampiā, sine manifesta potissimum causa præcedente, obsederit, totum corpus euacuare oportet, præsertim ubi hoc sanguine plenum fuerit, & ualida uis laborantis, tempusq; anni, regio, ætas, & id genus alia nō impederint. Quòd si itaq; in inferiore, aliqua parte, uerbi gratia genu, inflammatio cōstiterit, tum sanguinis euacuatio ex superioribus partibus facienda. Incidere itaq; oportet in Venæ sectio, cubito uenam aut interiorē, aut mediam. Si uerò aliqua pars superior patitur inflammationem, per inferiora sanguis est educēdus. Semper enim fluxionis motum ad contrarium trahere expedit. Debet tamē reuulsio fieri in latere quod in reatum est, Galeno in libro De curandiratione per sanguinis missionem teste. Post uenæ sectionē partē inflammatione laborantē perfundere ac illinere oportet medicamētis, quæ id quod influit repellere sint idonea, & quod iam in malē affectam partē se recepit euacuare queant, quæq; robur ijs quæ iam patiuntur partibus addant. Qualia uerò sint medicamēta quæ id ipsum præsent, in superioribus libris sæpè à nobis Localia, expositum est. Galenus quidē mirificè commendat cataplasma, Cataplasma, ex semperuiuo & mali punici cortice in uino decoctis, & rhu & polenta compositum, si non uehemens urgeat dolor. Repellit enim id quod influit, atq; id quod cōtimetur exiccat, & partes adiacentes corroborat. Si uehemens dolor fuerit, Si uehemens dolor fuerit, cataplasmata ex plantagine, lente, solano, pane, & oleo rosaceo imponenda. Paulò uerò antè, suprà particulā malē affectam,

Suppuran-
tia,

Etiam, spongiam uino austero, aut aqua frigida madefactam apponere oportet. Melius uerò fuerit, si aliquid aceti admisceatur. Quòd si pus se in particula ostenderit, cataplasmata imponenda erūt, quæ suppurationē iuuant: ut sunt farina triticea, seminis lini, & fœnogræci, butyrū, pinguedo porcina, radix altheæ, & similia in superioribus libris sæpè admodum cōmemorata. Suppuratione facta, quod ex doloris, febris, & caloris remissione cōiectamus, secare atq; pus euacuare conuenit. Eo uacuato uulnus ablueri & abstergere oportet melicrato uel oxycrato, uel uino & mulso. Imponendū uerò, si adhuc inflammatio aliqua affuerit, cataplasma ex lente, aut oleū rosaceum cum luteis ouorū, aut aliud quod inflāmationem arcere potest. Si uerò sine inflammatione fuerit, aliquod ex ijs medicamētis quæ emplastica uocātur, et glutinātia, imponendū, ut est amyli, cerussa, pōpholyx, malicoriū, æs ustū, & eiusmodi. De quib. copiose differit Gale. lib. 3. The. meth.

Sectio.
Abstergio.

De herpete. Cap. II.

Herpes.

Exedens
herpes.Miliaris
herpes.Causa.
Signa.Curatio.
Victus ra-
tio.

Quum flaua bilis sola, & nullo infecta humore excreta in aliquam particulā decumbit, malū herpes uocatur. Quæ si substantia crassior acriorq; fuerit, totā cutē ad subiectā usq; carnē exulcerat, appellaturq; herpes exedens. Si uerò tenuis et minus acris calidaq; fuerit, exiguas pustulas milio similes p summā cutē excitat, ob eamq; similitudinem miliaris herpes nūcupatur. Fit herpes, ut dictum est, ex flaua bile. Miliarē tamen, Gale. lib. 14. The. meth. ex bili quæ pituitæ aliquid admixtum habet, procreari tradit. Signa ex paulò antè dictis patent. Quod ad curandi rationē attinet, initio utendū uictus ratione frigida & humida, perinde atq; in febre tertiana. Vino in totum abstineat, & pro eo bibat aquā, in qua cinnamomum decoctum est. Corpus etiā medi-

cament

camento aliquo quod bilē ducit euacuandum, de quibus sepē in præcedentibus libris est dictum. In miliari autem utendum medicamēto, Galeno loco iam citato teste, quod mixta est facultatis: quod scilicet bilē simul & pituitam educat. Corpore itaq; prius purgato, mox ea quæ influentē humorem reprimunt, repelluntq; medicamēta particule malē affectæ imponenda. Sed hic diligenter cōsiderandum erit, quod nō omnino Localia, similis cura particule patienti adhibeatur. Nam qui exedentes sunt herpes, refrigerari quidē desiderant similiter alijs herpetibus, non tamē ea ferunt medicamenta, quæ præter id quod refrigerant, etiā humectant: sed sola admittunt refrigerantia, quæ etiā maximē exiccāt. Non igitur uel lactucā, uel polygonum, neq; ex stagnis lentem, uel psyllium, uel portulacam, uel scriin, uel semperuiuum, uel tale aliquid quod refrigerare possit atq; humectare, apponere oportet. Neq; unquam etiā fidas spongiæ frigida aqua persusa, neq; solano: quamuis refrigerandi atq; unā exiccādi uim habet, sed mediocre: illi uerō maiore quā solano adsit expetūt siccitatē. Igitur ini- Cataplas-
mata
tio cataplasmata ex capreolis uitis, folijs rubi, plantaginisq; applicanda erunt. Postea uerō lens his miscetur, interim & mel & polenta. Plurimum quoq; commendatur liquor qui ē uitis caudice sua sponte, aut ignis ui expressus exudat. Ipsas autē partes exulceratas, hoc uel simili medicamento illinere cōuenit, quod habet: Citinorum, gallæ, utriusq; 3 3. myrrhæ, Pastillus, thuris, aloës, sing. 3 2. & aluminis fissi 3 2. radice pistolochiæ 3 2. & calaminthæ 3 1. f. Trita uino subaustero excipiātur, & fingantur pastilli, qui dissoluti cum aqua mellis illinantur. Valet etiā medicamentum, quod ex bolo armenia & terra le- Medicamē-
tum aliud,
mnia stillatio rosarum liquore & aceto exceptis cōponitur. Mirificē uerō cōfert hoc quod fit ex lana ueteri succida Aliud,
& illota, in olla cōbusta donec nigrescat & ardeat, quæ sub-
inde

464 DE MEDENDIS TUMOR.

inde in puluerē redacta, cum stillatio rosarū liquore dissoluitur, ut quasi atramēti scriptorij formā habeat, & pluma illimitur bis in die. Herpetas uerò qui exedētes nō sunt, ij expurgato prius corpore, medicamētis quæ reprimunt, ut cōprehensum est, curantur. Vberiorē curandi rationem tradit Galenus lib. 14. The. meth. & libro. 2. ad Glauconem.

De erysipelate. Cap. III.

Erysipelas quid.

Erysipelas, Galeno lib. 2. ad Glau. teste, est tumor ex feruente tenuiq; sanguine cōflatus. Vel est ex sanguine & flaua bile calidioribus quā oporteat, mixta fluxio. Latinis

Ignis sacer. Causæ.

ignis sacer nominatur. Causæ ex ijs quæ diximus abundē patent. Erysipelas inflāmatione calidius, magisq; colorē flauum pallidum uē refert. Et si tetigeris, facillē sanguis subterfugit, rursumq; illabitur exquisitē tenuis & aspectu rubidus, nō tamen dolet ueluti inflammatio: neq; ut aliqua inflammationis species pulsus, aut cōpressiō, aut tensiō simile inuehit. Sed accidit ut interdum ualde parum infestet, ac tum præsertim, quando per solam cutē diffusum fuerit, nihil inferiorem

Exquisitū erysipelas.

carnē molestans. Et hoc quidē sepius euenit, atq; hoc est exquisitum erysipelas. Proinde quod attingit subiectam carnē, neq; ex uerē tenui bile cōsistit, neq; tantum est erysipelas, uerū iam affectus permixtus ex erysipelate atq; inflammatione. Exuperant autē in ipso quādoq; propria erysipelatis

Erysipelas inflammatum.

Inflāmatio erysipelacea.

symptomata, atq; hoc malum à iunioribus medicis Erysipelas inflammatum nominatur. Nonnunquā uerò inflāmatio

Curatio. Victus ratio.

nis, & tunc ipsum nominant inflāmationē erysipelaceam. Quod si neutrius symptomata manifestē exuperauerint, sed æqualia apparuerint, tunc erysipelas & inflāmatio mixta esse dicuntur. Curatio partim uictus ratione, partim medicamentis perficitur. Victus ratio sit talis, qualē in febribus &

simi

& similibus calidis suprâ descripsimus. Inter initia uerò si ^{Vena se-}
 uehemens feruor affuerit, uena secanda erit. Si in facie fuerit ^{ctio.}
 erysipelas, uena in cubito, humeraria dicta incidenda. Si autē
 inferiores collo partes erysipelas patiuntur, interior, quam
 iecorariā uocāt, uena secāda: aut media, si neutra harū appa
 ruerit. Si in cruribus fuerit malum, itidē in cubito uena inte
 rior, sed eiusdē lateris incidēda. At si quid sanguinis missionē ^{Purgatio.}
 impediāt, purgatione utendum ex medicamēto quod bili du
 cende idoneum est. Plurimū etiam profunt clysteres in hunc ^{Clysteres.}
 uel similit̃ modum parati, qui accipiūt: Maluæ, foliorum uiol
 e nigræ, lactuæ, intubi utriusq; sing. m̃. i. & mercurialis m̃. i.
 seminum cucurbitæ, melonum, portulacæ, singul. 3 2. florum
 nymphææ m̃. i. hordei 3 1. coquātur oīa in aqua sufficienti ad
 tertias, iuris colati lib. x. uni admisce medullæ casie fistula
 ris 3 1. hieræ picræ 3 1. olei uiolacei 3 2. olei nymphææ 3 1. salis
 uulgaris 3 1. & fiat clyster. Post totius corporis uacuationē ^{Reprimē}
 reprimētibus auxilijs utendum. Refrigerabimus itaq; parti ^{tia.}
 culā afflicta, liquoribus stillaticijs, solani, semperuiui, portu
 lacæ, psyllij, hyoscyami, lactuæ, & intuborum, aut succis eo
 rundē. Valet etiā lenticula palustris, & ceratum liquidum ex
 aqua frigida, cuius confectiōnem tradit Gale. lib. 1. De simpl.
 med. fac. cap. 6. Et copiosius lib. 10. The. meth. cap. 9. Item po
 lenta cū aliqua predictarum herbarū parti afflicte imposi
 ta cōfert. Quæ autē illimuntur medicamēta refrigerātia, fre
 quenter admodum immutanda sunt, ut quousq; refrigerandū
 sit cognoscere liceat. Refrigerationis enim terminus, Gal. lib. ^{Refrigera}
 14. The. Meth. teste, ipsa coloris mutatio est. Etenim quod ^{tionis ter}
 exquisitum & purū erysipelas est, statim cum hoc quiescit. ^{minus.}
 Quod enim non purum est, sed iam quodammodo phlegmo
 nodes, si plusculum, refrigeres, liuidam cutem præfert. Sin ne
 sic quidem quis desistat, nigricat, potissimum in senili corpo
 re, sic

466 DE MEDENDIS TUMOR.

re, sic ut quædam ita refrigerantium, ne discutientibus quidē medicamentis ad perfectionē sanentur, sed scirrhosus quidam tumor in particula relinquitur. Ergo satius est, ubi laborantis particule alteratum colorē uideris, à refrigerantibus ad contrariā trāsire, priusquā uel liuida, uel nigra prorsus fiat. Vbi itaq; feruor ægrotantis particule iam desijt, refrigerantibus admiscēda sunt discutientia medicamenta, idq; priusquā lineat. Quare tum cōfert stillatitius liquor solani, cōmixtus stillatitio liquori chamæmeli. Imponendū etiā cataplasma ex farina hordei & sænogræci, & id genus alia. Quod si iam liuor occupauerit, incisa cute cataplasma superponendū est, persundendusq; locus plurimū quidē ex aqua calida, sed & marina aqua & muria interim conducet. Quinetiā ipsi cataplasmati eiusmodi aqua, uel acetum, uel oxalme misceatur. Erysipelati autē inflāmato, & inflammationi erysipelati, mixta quantum fieri potest curatio adhibenda, semperq; illi quod exuperat, magis resistēdum, nō tamē prætermisā ea quæ à mixto præstatur indicatione. Sicuti autē subinde erysipelati admiscetur phlegmone, ita etiam aliquando œdema, ac uocatur quod ex ambobus tum est conflatum, erysipelas œdematosum, nō secus quā ubi ex refrigerando durū ægreq; resolubile redditur, uocabitur erysipelas scirrhosum. In quibus curatio ipsa, ueluti in omnibus compositis, mixta administratur.

De carbunculo. Cap. IIII.

Carbunculus, qui Græcis *αῖθρα* dicitur, fit cum sanabilis crassus & feruescens in aliquā particulā decumbens, cutim exusserit. Errāt itaq; recētiores, qui anthracē & carbūculum diuersa esse mala putant, ut copiose lib. 2. Paradox. cap. 18. demonstrauimus. Arabum placita sectantes, prunam & ignē persicū nominant hoc uitium. Incipit hoc plerumq; à pustula, aliquando uerò & sine hac. Cæterum inter initia

Discutientia mixta refrigerantibus.

Erysipelas œdematosum.
Erysipelas scirrhosum.

Carbunculus.
Anthrax.

Causa.

Signa.

initia quibus hoc instat malum, scabunt particulam omnino.
 Mox oritur pustula quædã, qua rupta ulcus cum crusta gi-
 gnitur. Sæpè uerò nō una oritur scabētibus pustula, sed mul-
 tæ exiles ueluti milij semina, crebræ in particula residentes
 Quibus perruptis similiter crustosum ulcus prouenit, quale
 ferramenta candētia excitant. Crusta uerò ipsa modo cineris
 colorē præfert modo nigriorē. Omnibus præterea his circū
 posita caro in summā peruenit inflammationē, non tamē co-
 lore afficitur erysipelatis, imò qui adhuc phlegmones colo-
 re sit nigrior, ueluti si plusculo rubro minus misceas nigri.
 Quòd autē necessario febricitent, qui ita sunt affecti, idq; nō
 minus, imò magis quàm illi qbus erysipelatoza est phlegmo-
 ne, id utiq; latēre neminē potest. Curatio incipienda ab incisa Curatio.
 uena, & adhibēda sanguinis uacuatio, si nihil obstet, usq; ad Venæ sec-
 animi defectum. Inciditur autē uena partē afflētā ē directo tio.
 respiciēs, atq; pro eius situ nunc humeraria, nūc interior, in-
 terim etiam media, & ea que in malleolis est secatur. Quin- Scarifica-
 etiam scarificare eiusmodi tumores post sanguinis missione tio.
 alienum non sit. Sunt autem incisiones mediocribus altiores,
 propter instantis humoris crassitudinem. Imponi uerò sibi Localia.
 laborās particula, quod ad inflāmationē feruorē ue spectat,
 refrigerantia desiderat. Cæterum propter humoris crassitu-
 dinem atque malitiam, nec fluxionem auertere poteris: & si
 quando id feceris, aliud quippiam quod in alto sit corpore,
 offēdes. Atqui nec affluere is permittendus est, quin potius
 inquirenda remedia sunt, quæ cū modicè reprimēdo etiā discu-
 tere possint. Tale profectò est cataplasma quod ex planta- Cataplas-
 gine conficitur, tum quod ex discocta lente, scilicet miscen- ma,
 tibus his nobis micam panis qui clibano sit coctus. Esto au-
 tem panis nec omnino à fursure purus, nec nimium eius ha-
 bens. Si quidem qui omnino purus est, eius substantia in cutis

468 DE MEDENDIS TVMOR.

meatibus herere est apta. Furfuraceus autē crassiorū est partium. Super ipsum uerò ulcus, ualēs aliquod medicamentum, cuiusmodi est pastillus Andronis, uel Polyidæ, q̄ describitur à Gale. lib. 5. De cōp. med. κ̄ετ̄ε γ̄ενν. Vel is pastillus quē supra in capite de herpete produximus, adiecto chalcāthi 3. 1. Liquari autē debēt cū uino aliquo dulci, ad sordiu strigmē-
 ticiā ue crassitudinē. Itē radix dracūculi, uel aristolochiæ, uel
 pus mouē filphij liquor, singula ex aceto illimenda. Quæ autē reliquis
 tia nō adhi- adhiberi ulceribus solent, nempē quæ cōcoquāt & pus mo-
 benda, ueant, ea nūc adhibenda nō sunt, quādo ita particulæ putre-
 Adiacētes dinē foueris. Porro partes adiacentes quæ cōsortij lege affi-
 partes mu- ciuntur, succidis lanis ex liquore stillaticio rosarū, aceto, &
 niētia me- dico dicamēta, bolo armenia irrigādæ. At ut radicitus carbunculos euellas,
 dirimasq; ab adiacētium commercio, malum punicum acidū
 minutatim concisum in aceto coques: ubi intabuerit, in leuo-
 rem deteres, linteoq; illitum impones. Cum uerò siccescit,
 aceto humectabis. Cessante uerò iam inflammatione, ulcus
 ad cicatricem similiter reliquis ulceribus perduces. Id quod
 fiet, si primū adhibitis ijs quæ expurgāt medicamētis glu-
 tinantia imposueris, quale est hoc unguentum, quod habet:
 Vnguentū Olei rosacei 3. 2. cerussæ, plumbi usti, lithargyri, singul. 3. 1.
 glutinans. rosarum purpurearum 3. 2. radice symphyti maioris, balau-
 stiorum, boli armenia, singul. 3. 1. caphuræ grana 2. ceræ can-
 didæ quod satis est, fiat unguentum.

De impetigine. Cap. V.

Impetigo λειχήν. I mpetigo, Græcis λειχήν dicitur, uitii cutis est quod cele-
 Causa. riter in scabiē & lepram, quā Græci sic nominant, trāsīt.
 Signa. Sunt qui cutis asperitatē interpretātur. Fit ex tenui acriq; sa-
 nie, crassioribus alijs cōmixta. Malū est insuauissimū, & pru-
 ritum inferens, & circumtensionē, & periculum non minus.
 Proserpit enim aliquādo per totam faciem, & oculos ipsos
 contin

contingit. In curadi ratione, diligēter ea quæ mitior est à fera impetigine, quæ mētagra etiā dicitur, & recēs ab ea quæ longiore tēpore durauit, discernēda. Siquidē quæ recēs ac mitis est, curatu facilior est, quā ea quæ diuturna & fera existit. Curatio.
Mentagra

Principio autē curationis, si plenitudine laboret corpus, sanguinis missio adhibenda. Sin minus purgatio quæ tenues & crassas sanies expurget, exhibēda. Supra modum uerò cōfert hæc potio, quæ habet: Florū uiolarū buglosi, melissophylli, sing. m̄. 1. glycyrrhizæ rasæ ꝯ 1. prunorū damascenorū nume. Purgatio.

12. oxyphœnicōn ꝯ 1. seminū melonū, cucurbitæ, cucumeris, citruli decorticatorū, sing. 3 2. fumariz m̄. 1. & radices poly- Potio pur-
gans.

poly, foliorū senæ, utriusq; 3 6. corticū myrobalanorū flauorum, ceruleorū, utrorūq; ꝯ 5. agarici optimi 3 2. rhabarbari scenitici selecti 3 1. & spicæ nardi grana 6. zingiberis 3 & decoquātur in aqua iustæ quantitatis, donec dimidiū absumatur, & ea quæ decocta sunt per integrā noctē simul persēt, postea colo transfundantur, adiectaq; sacchari conuenienti quātitate ius decocti dulce reddatur, & subinde in eo diluantur cōpositionis hamech & diaphœnicon, utriusq; 3 3. fiatq; potio, de qua quotidie in aurora exhibeātur ꝯ 4. Corpore uacuato ad localia progrediendū erit: quapropter si recētes fuerint impetigines, parietariæ folia cū aceto trita illinēda: aut ammoniacū cū parietariæ succo in aceto tritū illinendū. Idē facit brassicæ succus, aut quod ex eius caule dū aduritur destillat illitū. Confert etiā plurimū cortex radices oxylapathi cōmanducatus, & illitus. Puerorū impetigines, hominis salina cōtinuē defricta curātur. His etiā opitulatur gummi pruni illitū. Et linimentū hoc, quod accipit: Resinæ terebinthiæ in stillaticio liquore rosarū lotæ ꝯ 1. olei rosacei ꝯ 5. ouorū lutea duo, succi duorū malorū arantiorū dulciū. Commixtis omnibus fiat linimentū. Vbi uerò iandiu durauerint im-

Localia.

Linimentū

470 DE MEDENDIS TVMOR.

petigines, tum ualide siccātia, & abstergētia, Gal. lib. 5. De cōp. med. *ἡ γὰρ τὸ πρὸς τῷ τῷ* teste, requirūt. Quare illis uiticis fōlia cū aceto trita et illita p̄sunt, aut asphodeli maris radix in aceto decocta & trita, si affricetur. Probatur etiā ad impeti

Vnguentū. gines hoc unguentū, quod habet. Resinā terebinthina instil laticio rosarū liquore lotæ 3 1. olei rosacei 3 1. butyri recētis, axungie porcine, utriusq; 3 3. sulphuris uiui 3 2. f. nitri 3 1. f. aluminis facticij, zucharmū uocāt, 3 1. salis fōsilis 3 1. seminis staphydis agriæ, lithargyri, utriusq; 3 2. uitellos oui duos. Cera quod satis est, singatur unguentū. Aëtius lib. 8. cap.

Vnguētū. 16. inter multa alia hoc unice cōmēdat, quod habet: Picis, sicca, resinā colophonie, radicis ellebori albi triti, olei rosacei, cera, sing. partes æquales, fiat unguētū, uel ut Aëtius uocāt, emplastrū liquidū. Verū ubi malū iā stabile factū fuerit, & medicamentorū molimini resistit, utendū erit excoriatorijs,

Excoriato rium, quale est quod accipit: Lithargyri, nitri, æris usti, foliorū uiticis, sing. 3 2. chalcāthi 3 1. sulphuris uiui, ellebori albi, utriusq; 3 1. æruginis 3 2. unūquodq; per se cōtere, deinde simul cōtusa oleo rosaceo & cera excipe, ac in unguēti formā redige. Post excoriatoria, medicamēta quæ ulcera repurgāt ad mouenda. Vlceribus autē repurgatis, utendū ijs quæ glutināt medicamentis, quorum aliqua suprà commemorauimus.

De scabie. Cap. VI.

Scabies. Scabies, quæ Græcis *Ψωρα* dicitur, summæ cutis asperitudo est, pruriens, in qua corpus paulatim absimitur.

Causa. Originē ex atra bile ducit, aut pituita salsa, crassa ac lenta, ut testatur Gal. lib. 2. De symp. caus. ca. 16. Scabies summā corporis cutē excedit, ouariasq; figuras habet, ac furfurea magis ex se corpuscula ædit. Principio uerò opus est ut cōueniēti uictus ratione utantur egrotantes, quapropter à cibis atrābilem generantibus, aut salsam pituitam, abstineant: qui quales

les sint, in cap. De cancro dicemus. Vtantur uerò potius ijs
 quæ facillè concoquuntur, & bonū procreāt sanguinē. Vinū
 bibant tenue & antiquum aquosum tamen. Curandi ratio, si Coratio.
 corpus plenum fuerit, à uenæ sectione auſpicabitur. Inciden-
 da autē erit uena media, & tantū sanguinis educendū, quan-
 tum egrotanti ex re eſſe uidebitur, aut quantū uires ferēt. Sin Purgatio.
 minus, purgatio ex ijs quæ atram bilē ducunt, eſt exhibenda.
 Præter decoctum autē in cap. præcedēti poſitum, & ea quæ
 in cap. De melācholia cōmemorauimus, mirificè proſunt ca-
 tapotia de ſumaria, & hæc quæ accipiūt: Aloës iccorarie 3 Catapotia.
 2. corticū myrobalanorū flauorū 3 2. f. folliculorū ſenæ, aga-
 rici optimi, epithymi, ſingu. 3 1. ſumariæ 3 2. diacrydij 3 f.
 tragacathæ, roſarū purpurearū, utriuſq; 3 f. cū ſtillaticio li-
 quore ſumariæ ſiāt catapotia, de quibus detur pōdus drach-
 mæ unius, plus aut minus, pro ætatis ac uirū ratione. In ſalſæ
 pituitæ abundātia catharticum imperiale, & cōpoſitio hæ-
 mech ſummopere ualebunt. Corpore uniuerſo euacuato, Balneum.
 uſus eſſe poterit balnei ærei, aut aquæ dulcis, in qua tamē ra-
 dix oxylapathi, ſumaria, ſcabioſa, beta, oxalis, & id genus
 alia, quæ in capite de pruritu cōmemorabimus, decocta ſint.
 Reponi quoq; in ſacculos debēt farinæ lentiū, fabarū, hor-
 dei, & ſurfures, & cum ijs abſtergi totū corpus. A balneo
 æger in lecto ſtragulis opertus ſudet. Extrinſecus ad ſolem, Localia.
 uel in balneo quæ illinuntur ferē eadē ſunt, quæ ſuprà de im-
 petigine diximus. Inter ſimplicia uerò potiſſimū ad eū uſum Vnguētū.
 adhibentur ſtaphis agria, lupini, ſulphur uiuū, cicer, lilij ra-
 dix, & lutea ouorū. Inter cōpoſita hoc unicè conſucit, quod
 habet: Reſinæ terebinthine in ſtillaticio liquore roſarū lotæ
 3 2. oleorum roſacei, coſtini, utriuſq; 3 f. ſulphuris uiui 3 3.
 ſeminis ſtaphidis agriæ 3 1. ſalis ſoſilis 3 1. f. lutea ouorum
 tria, butyri recentis 3 1. cōmixtis omnibus fiat linimentum.

472 DE MEDENDIS TVMOR.

Smegmata quoq; ex solis lapatis, oxylapatho præsertim, mirificè conferunt ad scabiei amolitionem.

De pruritu. Cap. VII.

Pruritus. **P** Ruritus est scalpēdi assidua cupiditas. Hic uerò senibus
Causa. maximè accidit. Cōtrahitur ex prauo humore, qui nimirū biliosus atq; adeò acris, aut pituitosus putris salsus ue est.
Signa. Malū de ægri sermonibus prōptè dignoscitur. Humorū uerò pruritū efficientiū diuersitas ab ætate, temperamento, uictus ratione, anni tēpore, regione, & reliquis ijs similibus agnoscitur. Si plenitudine corpus simul laboret, à sanguinis missione curatio ipsa auspicabitur. Sin cacochymia tantū affuerit, medicamenta exhibenda quæ redundantē uitiosum succū educunt. Corpore ipso euacuato, ad externam curationem
Balneum. diuertemur. Lauandum itaque prorsus ieiuno est, nonnunquā & modico cibo sumpto iterum lauandum: quippe uitium uix
Smegmata. hoc inhumescit. Detergitur autē scænograci, aut betarum, aut furfurū, aut maluæ, aut altheæ, aut hordei decocto. Præter hæc ualent farinæ etiā fabaceæ, uel lupinorum. Si inueterauerit malum, lauatio similiter quidem cōuenit. Fomentum autem ex saluiæ, myricæ, herbæ mercurialis, origani, pulegij, baccarum lauri, cucumeris syluestris radicis decocto, & oxhalme fiat. Poteest & linimentorum supra cōmemoratorum
Remediū **rum** usus esse. Ad pruritus etiā mirificè cōfert, si nucum iuglandium corticis ꝛi sulphuris uiui tantundē, cū apij succo
generosū, terātur: & cum ijs in balneo corpus assatim defricetur. Hoc enim solum, Paulo teste, multis tum scabiosis, tum pruritu detentis, abundè fuit. Apium etiā per se uiride tusum, infricatumq; in balneo uehementer auxiliatur. Smegmata quoq; ex lapathi radicibus in aceto coctis confici possunt.

De exanthematis. Cap. VIII.

Exanthemata. **E** xanthemata Græcis sunt tumores sponte in cute florescentes. Sic dicti, quod turgētium ad florem gemmarum

in plantis modo tumeant. Hippocrates tertio Epid. libro
ἐκθύματα, ἃ καὶ τὸ ἐκθύειν, hoc est, ab erumpendo, quòd sci, *ἐκθύμα-*
 licet sponte è cute erumpant, in eaq; floreāt, uocauit. Plinius *πα-*
 papulas, & interdū etiā pituitæ eruptiones nominat. Inter- *Papulæ.*
 pretes aliquot Latini pustulas appellāt. Sunt autem duplicia *Pituitæ e-*
 exanthemata, quedā enim sublimia, quedā uerò lata. Subli- *ruptiones*
 mia ab ijs qui barbarā sectantur medicinā, Morbilli nuncu- *Duplicia*
 pantur. Germanis autē, Kinds blattern. Lata & humilia Bar- *xanthema*
 baris uariolæ, Germanis dia Kinds flechen appellātur. Pro- *ta.*
 creātur ex crassis & cuti impactis humoribus. Sublimia ta- *Sublimia*
 men à calidiorē & tenuiorē humore fiunt, lata uerò à frigida *Morbili*
 diore & crassiore. Totū autē hoc genus exanthematū nasci- *Lata.*
 tur, natura corporis pfundū expurgante. Quare paucissimi *Variolæ.*
 admodū sunt, modo ad legitimā etatē perueniāt, q hoc malū *Causæ.*
 effugiāt. Exanthematū eruptionē grauiā quedā symptomata *Signa*
 sequuntur, uehemens nimirū dorsi capitisq; dolor, difficultas
 spiritus, pruritus narium & aurium, febris, punctiones uniuer-
 si corporis, pandiculationes & oscitationes crebræ. Vbi iam
 egrediuntur, initio facies maculas quasdā ostendit, quæ uel in
 sublime tolluntur, uel in latum extenduntur. Sublimia itaque
 exanthemata cutē in tumore manifestum attollūt, atq; exul-
 cerant, pruritumq; excitāt. Lata exiguum admodū tumorem
 efficiunt, neq; tamē exulcerant, neq; etiā pruritum excitant,
 quòd scilicet in latitudinē extensæ diffidentur, humorq; ea fa-
 ciens acris nō sit. Quod etiā Hippocrates in Aphorismis te- *6. Aph.*
 statur dicēs: Lata exanthemata nō admodum pruriūt. Post-
 quam uerò iam eruperint, raucedo uocis, dolorq; in faucibus
 ac gingiuis accidit. Porro difficilis exanthematum fit eru-
 ptio & progressus ijs, quorum cutis crassa & densa existit.
 Difficilior autē semp latorū est exitus, utpote quæ ex cras-
 sioribus ut dictum est, ac tenacioribus humoribus oriuntur,

atq; adeò hoc nomine nō facile cutē penetrare possunt. Quare si accedit cutis etiā densitas, plerunq; intus detentis exanthematis moriuntur. Cōtrā pauci admodum, modo in uictus ac curādi rationibus error absit, in sublimiū exanthematum eruptione pereūt, quū ex tenuioribus humoribus, ac prōptē erūpentib. generētur. Exanthemata etiā magna ex parte infantibus eueniūt & iuuenibus, rarissimē senibus. Meliora ex ijs sunt rubei coloris: deteriora, imò pessima quæ atrū, aut uiridē præ se ferunt colorē. In curādi ratione diligenter ad etatē est respiciendū. Si enim infantib. erūpere per cutē cōeperint exanthemata, cauendum unicē ne naturæ motus impediatur. Quare initio aērē deuitare frigidū oportet, is enim cutē dēsat, atq; adeò exanthematū eruptionē phibet. Versentur autē potius in eo qui mediocriter calidus est. Corpus etiā uestibus aut stragulis ab iniuria aëris frigidi, pbē muniatur. Cauendū tamē ne, quod uulgus facere solet, suprā modū calidis hypocaustis, aut nimijs tegumētis ac stragulis syncope accersatur, atq; adeò æger suffocetur. Infantes ipsi neq; pleniore, neq; nimis tenui cibo alantur. Et si uēter illorū nō respōdeat, tūc melle quod cibo additur, aut resina terebinthina ciceris magnitudine mouēdus. Vehemētiora enim medicamēta ne adultis quē dāda, tantū abest ut pueris cōuenire queāt: prōptē enim dysenteria cōcitāt, potissimū in sublimiorib. exanthematib., quorū generatio ex acribus est humorib. Quòd si natura probē excreuerit exanthemata, nullū sanē fac. escere negotiū oportet, iuxta hoc Hippocratis: Quæ iudicātur, & iudicata sunt integrē, neq; mouere, neq; nouare aliquid, siue medicamētis, siue aliter irritādo, sed sinere oportet. Sunt tamē qui infantes inuoluant pannis rubris aut puniceis, ut ad crebrum illius aspectū et intuitū ad exteriora atq; adeò summā cutē ferātur humores. Qui ubi euocati fuerint, facile discutiuntur. Quòd

Curatio in
fantium.

A quibus
cauendum.

Vehemen-
tiora medi-
camenta nō
dāda in hoc
affectu.

1. Aph. 20.

Panni ru-
bri aut pu-
nicei,

si ta

si tamen natura in expellendis humoribus tardior aut imbecillior esse appareat, hoc, aut simile decoctū quod obstructions tollit, exhibendū erit, qd̄ habet: Radicū apij, sceniculi, petroselinij, sing. ʒ. i. seminū anisi, asparagi, rusci, sing. 3. 2. caricarū nume. 6. calamintha m̄. 1. Coquātur in aqua sufficiēti, donec medietas absumatur. Iuri per colū trās fusi, & sacchari adiectione dulci, admisceātur serapij acidi simplicis ʒ. 3. & fiat potio, de qua detur quotidie mane & uesperij pondus ʒ. 3. plus aut minus pro ætatis ratione. Si adulti corripuntur exanthematis, initio curationis, si corpus plenū fuerit, sanguis mittendus, idq; faciendū antequā appareāt exanthemata. Si uerò humorum copia in alto cōstitit, purgatio primū tentāda est. Nam si hac neglecta prius discutere aggrediaris, obstrues ipsos potius q̄ per cutē euacuabis. Sin autē nulla in alto deliteāt humorū superuacua, per cutē uacuare oportet, & nō p̄cul attrahere, per aluum aut uomitū euacuationē molitus: sed humorum qui cuti impacti sunt curationē medicamētis quæ excalfaciunt & discutunt experiaris: idq; maximè quū lata sunt exanthemata, à frigido enim admodū & crasso humore hæc ipsa orta sunt. Quam quidē curādi rationē Hippocrates etiā ipse lib. 6. Epid. par. 2. Aph. 18. probat, ubi ita scriptū reliquit: Latæ pustulæ, quales hyeme Simon habuit nō admodū pruriūt. Hic sanè cū ad ignē mūgeretur, uel calida lauaretur, iuuabatur. Vomitiones nō expediebāt. Puto utiq; cum qui calidis abundè fouisset, huic prodesse potuisse. Quibus sanè uerbis manifestè innuit Hippocrates, humores crassos ad cutem repentes non esse per medicamenta ad profundum corporis trahendos, sed per cutem potius, calidis tum fomentis, tum medicamentis, uacuandos. Quæ autem sint eiusmodi, in superioribus libris sæpè est dictum. Porro si post eruptionem exanthematum oculi malè afficiantur, liquor stillaticius

Curatio a
dultorum.
Venæ se-
ctio.
Purgatio.

Hippocra-
tes,

”
”
”

Si oculi ma-
lè affician-
tur.

rosa

rosarum, in quo parum caphuræ, aut licij sit dissolutum, in=

Noxæ eris & faucium remedia, stillandus erit. Faucium uerò & oris noxæ medendum cōpo=

sitione diamoron, & id genus alijs medicamētis suo loco ex=

positis. Reliqua curandi ratio, quæ post plenam exanthema=

tum apparitionem requiritur, in desiccando sita est. Quare

humectatio omnis externa absit.

De ambustis. Cap. IX.

Corporibus quæ ab ignæ, aut feruente aqua exuruntur

Curatio ambustorū igni. Quibus, p= hibeantur bullæ,

tria accidunt symptomata, dolor, bullæ seu pustulæ, &

exulceratio. Igitur ambusta igni, πρὸς ἰατρικὰ uocāt Græci,

indigēt medicamētis quæ moderatè abstergūt, absq; eo quod

euidenter calefaciāt aut refrigerēt. Proinus ergo ad inhibē=

das pustulas terra quæuis leuis, cimolia præsertim, in teneris

quidē corporibus cum aqua, in durioribus autē cū aceto nō

admodum acri, aut posca madefacta illimēda. Sunt qui præfe=

rant eam terrā quæ sub uasis aquarijs reperitur, si cum albo

oui excipiat. Cimolia stillaticio etiā rosarū liquore excepta

mirificè cōfert. Item ouum integrū crudū statim impositum,

Quū integrū crudū, lana molli exceptū præclare facit, pustulasq; excitari prohi=

bet. Etenim refrigerat leuiter, & citra rosionē desiccāt. Idē

Atramentū scriptoriū, efficit atramentū scriptoriū illitū, aut thus aqua dilutum, uel

lens cocta tritaq; uel eruum illitum. Betæ etiā folia cruda cō=

Betæ folia, tusa, postea elixata, & cum uino illita cōducūt. Alumē item

Alumen o= mne. Santala, omne cum aqua & oui albo. Santala etiā trita & cum stilla=

ticio rosarum liquore excepta, adiecta caphura, prodesse plu=

Bolus arme= nia, rimum possunt. Itidē ualet bolus armenia illita. Locus autem

qui ustionē patitur, manu cōtingendus nō est: quare medica=

Curatio v= stionū ex a= qua feruen= te,

menta ipsa penna illimēda sunt. At ex aqua feruente ustioni=

bus priusquā pustulæ oriantur, alumē sciibile (plumosum uo=

cant officinæ) tritū cum aceto illimitur, aut fel taurinū cum

aqua copiosiore liquatū inungitur, aut bulbi liliorū, aut hya=

cinihorū cum rosaceo triti, & in sordiū spissitudinē coacti

delinūtur. Porro pustulæ si fuerint excitatæ, principio ne frā
 gito. Si uerò persistent, frangito cum acu, ut aquicus humor
 effluat, alijs enim partes subiacētes corrūpit, & exedit. Par
 tibusexulceratis adiantū aridū, leuigatumq; , aut myrti folia
 combusta pertritāq; insperguntur. Laudatum est remedium
 unguentum candidum uocatum cum caphura, & id quod in
 capite De carbunculo descripsimus.

De formica, verruca & clauo. Cap. X.

Formica, quā Græci *μυρμηκία* uocant, tumens & cal-
 losa, magnaq; ex parte rotunda est excrescentia, colore
 nigricans, latiore basi, & in cute sessilis, quæ in scalpendo &
 atritu mordentis formicæ sensum efficit, unde etiā nomen ac-
 cepit. Verruca uerò, quæ Græcis *ἀκροχορδών* dicitur, itidē
 exigua est cutis excrescentia, angustiore tamē basi, ac pen-
 lis, ut chordæ nexu suspensa esse uideatur. Hæc autē dum ab-
 scinditur, longē maiore sanguinis quantitātē, quā suæ par-
 uitati cōgruat, reddit. Clauus rotundum est tuberculū, clauo-
 rum capiti simile, quod plerunq; in calcaneis & pedum plā-
 tis nascitur, in gradiendo asserens dolorē & impedimētum.
 Generantur ex humoribus frigidis & crassīs, pituitosis atq;
 melancholicis. Signis nō est opus ad dignoscendū, sed prom-
 ptē ex ijs quæ diximus discernūtur. In curādis ijs tumoribus
 cauendū initio erit ægrotanti ab omnibus ijs quæ frigidos &
 crassos humores procreare possunt. Dein corpus purgan-
 dum medicamento quod pituitam, aut melancholicum educit
 humorem, aut utrosq; . Corpore purgato ad localia uenien-
 dū erit, inter quæ sanē medicamēta maximē laudatur liquor
 titymali, aut fici illitus. Elateriū quoq; cum sale infricatum
 eos tumores tollit. Thus item cum aceto, hircinum fel, nitrū
 cum urina pueri uenerem non experti, stercus ouillum aut
 hircinum cum aceto illitum. Valet etiā ærugo cum sulphure
 ignem

Pustularū
curatio.

Exulcera-
tionis.
Vnguentū
candidum.

Formica.
μυρμηκία.

Verruca.
ἀκροχορδών.

Clauus.

Causæ.

Signa
Curatio.

Locus.

478 DE MEDENDIS TVMOR.

Euulsio uerrucarum. ignem nō experto cōbusta. Verū antequā prædicta medicamēta apponātur, euelli debēt uerrucæ, maximæ potissimum, id quod bifariā fit. Vel enim pilo equino iuxta basim, excipiūtur, qui quotidie magis atq; magis cōstringitur, donec è corpore decidant. Vel circūscarificatæ scalpro radicitus eximūtur.

Verrucæ & formicæ quomodo ore sanentur. tur. Nonnulli ne rursus succrescant, candenti ferro utuntur, Gal. lib. 14. The. meth. cap. 17. Romæ fuisse quendā tradit, qui uerrucas & formicas ore sanauit. Formicas enim certa priamum labiorū applicatione, ceu suctu ad se traxit, atq; à radice euulsit, deinde primoribus apprehensam dentibus, totā simul exemit. Sed, ut idem scribit, scalpro ad myrtacei folij speciei formato, & ferramēto eo quod scolopomacheriō, Græci

Scolopomacheriō. uocāt, quisspiā manibus exercitatus, facile eas excidet, quum proprijs lineamentis à circūposita cute circūscripta discernātur.

Formicæ ut penna educenda. Aequè uerò & ualente aliqua penna, quales sunt ueterū gallorū, anserū, & aquilarū, circulo formicæ imposita, ipsam educimus. Debebit porrò pennæ cōcaua fistula esse formicæ crassitudini par, ut eā undiq; prorsus cōstringat. Quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsæ, celerrimè ita formicā etiā cū ipsa radice totā educet. Cōstet uerò & quod finis ipse pennæ quæ eā circulo secabit, nō tenuis modo, sed etiā acutus & firmus esse debebit. Abscindere ab ijs tantū radicē uersus oportet quatenus reliquæ partis fistula cōplecti formicā possit. Sanè ex ipsa statim abscissione, si modo scitè fiat,

Medicamēta ad tollēdas formicas. etiā acumē ipsi cōparabis. Cæterū sunt & alia medicamenta ad tollēdos prædictos tumores idonea, quale est quod habet: Fecis uini uisæ, calcis uiuæ, æruginis, sing. partes æquas, cum urina pueri impuberis exceptas. Hoc medicamēto statim decidere formicas, Oribasius memoriæ p̄didit. Et hoc qd accipit, æruginis, auripigmenti, sandarachæ (arsenicū rubē uocāt) salis ammoniaci, sing. ʒi. redacta in puluerē cū liquore

tithy

stibymali excipiatur, et in calycib. glandiū, aut nucū auellana
rū putaminibus, uerrucis et formicis clauisq; imponatur, ne
scilicet circūiacentes partes erodāt. Vbi deciderint, cōmunis
curatio ulcerū adhibeatur. Mirificè autē prodest puluis mil-
lesfolij. & granij species, quā herbā Roperi hodie uocant.

Vbi deci-
derint prae-
d. &. tumo-
res quid a-
gendum.

De uirilagine. Cap. XI.

Viriliginis, quae cuius est uitiū, duae sunt species. Vna e-
nim λευκή dicitur, quae nihil aliud est nisi coloris ad
albidius mutatio. Latin. uiriligo alba nominari potest. Arabi-
bus autē Alboras uocatur. Altera uiriliginis species αλφός
Græcis appellatur, cuius generatio eiusdē cū leuce modi est,
non tamē omnino in profundo caro in ea patitur, sed summa
tantū cutis, & ueluti squamula quaedā uirilignes ipsae infixae
adherēt. Et haec quidē duplices sunt, albæ, & nigræ: faciūtq;
duplicē alphū, albū & nigrū. Auicenna & Arabes alij hoc
malū Morphēā nūcupāt: & eam quoq; duplicē esse statuūt,
albā & nigrā. Leuce à uisoso glutinosoq; sanguine cōtra-
hitur. Gale. siquidē lib. 3. De sympt. causis cap. 5. teste, cū pi-
tuitoso uisosoq; sanguine diutius caro alitur, caro quidē ma-
net adhuc, sed mutatur eius differētia, & in aliā speciē con-
uertitur, & media caro fit inter eā quae sanguine praedita est,
& eam quae sanguine caret. Atq; quū talis existat, accidit ut
ne tentet quidē postea affluens sibi alimentū in rubētis car-
nis speciē transmutare, haud aliter quā polypis locustisq;
accidit. Hac occasione ipsa tota quā celerrimē & alba &
pituitosa euadit, quando & ipsa alimentum in ruborē post-
hac transmutare non potest: & id quod influit, pituitosum
est. Qualis enim protinus ab initio & locustarū & ostreo-
rum ferē omniū caro est, talem ex transmutatione acquirunt
ij, qui leuce in se stantur. Iam alphi haud diuersum (ut dictum
est) à leuce habet generationis modū. Verū per hos non tota
caro afficitur, sed cutis duntaxat superficies, ueluti squamis

Viriligo,
Leuce.

Alboras,
Alphos.

Alphos dū
plex.

Causae.

Signa. quibusdam inspergitur. Atq; albi quidē ex pituita, nigri uerò ex melancholico humore prodeūt. Leuce tam altè in corpus penetrando radices agit, ut & pili in ea cani, & lanugini similes enascātur. In alphi, ut cōprehēsum est, squamula quæ dā affixæ cuti inhærēt. Porro in curatione leuces, initio omnia fugiēda erunt, quæ sanguinē glutinosum ac pituitosum procreare possūt. Deinde cum nō quælibet leuce curationē recipiat, notas ipsius tales habeto. Acu per summa leuce pūcta, sed cute nō penitus, si sanguis emanauerit, sanabilis est: sin latea humiditas, desperata est. Vel panniculo laneo asperiore infricata cutis, si quidē rubicundior euaserit, medicina locus est: sin idem color remanet, non cōsanescit. Et quæ plura loca corporis obsidet leuce, difficilius tollitur, quàm quæ pauca deturbarit. Itē uetustior, quàm recēs, minus in medicina spei habere censenda est. In curabili itaq; leuce statim exhibenda medicamēta quæ glutinosos humores extenuare possūt, ut est hyssopus, calamintha, anisum, oxymeli, & id genus alia quæ in præcedentibus libris, primo potissimū cap. De dolore capitis ex pituita, dicta sunt. Deinceps quæ eosdē purgare ualēt medicamenta exhibēda. Corpore purgato, ad localia ueniēdum medicamenta: quare leuce hoc uel simili medicamento affricandæ. Fici folia uiridia macerato in aceto: sit autē aceti tantum, ut ea superet & penitus contegat: deinde cōtusa & trita cū sufficiente calce uiua misceto, & locis prius extersis in sole illimito, usquequo lētigini similem imaginē ipsa leuce induat, atq; deinde fici succum recentē suprà istam illirionē inducito, ipsamq; leucem solam aliquandiu confricato, & ne uicinas partes exulceres obseruato. Egregiè enim auxiliatur. Laudatur & hoc quod in eum paratur modum. Iuglandium nucum immaturarum & adhuc acerbarum exteriorē corticem uiridem detrahito, & fici nigre syluestris ramulos amputa

amputato, ad hæc lithargyrū cōiūcito, ac cum aceto coquito, terito, & ad unguēti formā reducito, idq; ipsum in sole illinito. In decoquēdo etiā hordei grana 7 addito. Hinc enim sufficiens decoctionis signū habebis, ubi uidelicet hordei grana cocta uideris. Fortiora iā dictis sunt, sulphur uiuū, ueratrū, sandaracha, calcāthū, alumē rotūdū & scissū, uentres cātharidū, sal ammoniacus, nitrū, & id genus alia, è quibus unguēta cōfici possunt, quale est hoc quod habet: Sulphuris uiui, Vnguentū nitri, utriusq; 3 2. aluminis scissi, rotundi, ellebori albi 3 1. salis ammoniaci 3 6. farinæ lupinorū 3 2. & redacta in puluerē cū unguēto flauo (citrimū uocāt qd' satis est excipiātur. Porro cutis prius quā medicamenta adhibeātur, nitro defricāda erit. Sunt etiā qui prius acu trāsfixa pungāt, quoad cruor emanet, antequā medicamenta illinant. In alphis curandis uia Curatio alphi, etus ratio sit quæ neq; pituitam, neq; atram bilē in corpore acceruet. In albo igitur, principio quæ pituitam educunt medicamenta, in nigro quæ melancholicū humorē uacuāt, exhibenda sunt. Corpore uacuato utriusq; cōmune prodest auxilium, elota calx aqua soluta, aut dracunculi aut ari radix, cū aceto illita. Simili modo utrinq; ueratrū eisdē efficax est. Itē lupinorū amarorū decoctū superfusum, eorumq; farina ex aceto uel oxymelite illita. Capparis quoq; radice cortex cum aceto, lilijq; radix cum melle, cepa ex aceto in sole peruncta. Alia quoq; medicamēta quæ paulò suprà commemorauimus adnota, plurimum adiuuenti asserre solent.

De œdemate. Cap. XII.

Oedemæ Galeno, & alijs post eum medicis Grecis Oedema est tumor mollis laxus ue & doloris expers. Barba, quid, ris corrupta & inepta uoce undimia dicitur. Nonnullis ineptius multo zimia. Fit ex substantia pituitosa, aut spiritu uia, H poro

49. DE MEDENDIS TUMOR.

Signa. poroso. Signa iam ferè dicta suunt: tumor enim adest mollis, qui si summis prematur digitis, cedit, fassulâq; reddit, colore albus, qualis in pedibus ac cruribus eorū quos aqua intercus uexat, et in tabidis, et alijs qui malo, corporis habitu (καχεξία Græci uocāt) laborāt, prouenire solet. Verū in illis periculosiss affectib. œdema quidē symptoma est, nulla propria præcipuâq; curatione indigēs. Sola enim frictio ex oxyrhodino, aut nonnūquā ex sale et oleo, uel etiā ex sale iniecto oxy-

Curatio. rhodino ipsum sistit. Quū uerò ppter pituitā particulā influxam œdema cōstitit, initio corpus purgetur medicamēto quod pituitā ducit. Eo uacuato, spōgia aqua quæ parū aceti habuerit imbuta, cū ligamēto leuiter stringēte imposita, quæ ab inferiori parte incipiēs suprà finiat, malū abigit. Esto autē sponsia, modo cōductura sit, recens: hæc enim plus exiccat, atq; discutit, Gal. lib. 11. de simp. med. facul. teste. seruat enim etiamnū eam quā à mari accepit facultatē. Aceti etiā in posca sit tam moderata tēperatura, ut possit ipsam quisspiā bibere. Quæ autē ex ea plus aquæ cōtinet, in principio adhibēda est, maximè in mollibus corporibus. Quæ uerò hac fortior fuerit, in robustis et durā habētibus cutē, et quæ ad primam sponsiæ appositionē nō iuuantur. Quòd si spōgiæ nouæ occasio non est, hæc detergebis abluesq; nitro et aphronitro, et lixiuio. Quòd si sub his œdema nō subsidat, ubi rursus deligabis, pusillum aliquid aluminis adijcies, ac nouam sponsiā admouebis, atq; tum (ut præscriptum est) deligetur ab inferiore sursum. Sit autem arctatio mediocris, ac primæ quidē fasciæ iniectiones, quæ scilicet infernè incipiunt, magis arctandæ, quæ deinceps sunt, remittendæ: ceterū nō adeò ut laxa sit aliqua deligationis pars. Curationis siquidē intentio in œdemate mixta est, una quidē ut eius substantia dissoluatur, alia ad constringendum et congregandum. Quòd si

diuntur

diuturnum œdema fuerit, œdema prius oleo inunges, deinde spongiam ex lixiuio impones, atq; stringes uehementius. Discutit etiã ac cõprimit œdemata quelibet terra illita, tũ isatis satiuã. In discutiẽdis etiã œdematis mirificẽ cõducit emplastrum diachylõn, & oxycroceum nominatum. Sic etiã emplastrum ex radice althee, liliorum alborum, malua, acantho, oxylapato, senecione, & ijs similibus compositum, miram in discutiendis œdematis uim obtinet.

De scirrhis. Cap. XIII.

Scirrhus exquisitus est tumor præter naturã, sensus ex- Scirrhos
 pers, & durus. Non exquisitus uerò non omnino insen- quid,
 sibilis est, difficulter tamen sentitur. Scirrhus igitur qui sensu
 prorsus uacat, sanari non potest: qui agrẽ sentitur, facilem
 curationẽ non admittit, nec tamen prorsus incurabilis. Fit ex Causa,
 humore glutinoso, & crasso, qui particulis induratis impa-
 ctus, solui contumaciter repugnat. Interdum statim ab initio
 consistit augeturq; Magna uerò ex parte medicorum impe-
 ritia cuenit, qui erysipelata & inflãmationes uehemẽter re-
 frigerant & adstringunt. Signa iam dicta sunt in scirrhis de Signa
 scriptione. Inchoãte itaq; scirrho, & quẽpiã adhuc imbecil-
 lum sensum seruante, curationẽ adhibere cõuenit. Curãdi ue- Curatio,
 rò eius cõmunis indicatio est, ut quod præter naturã in par-
 ticula est, totum uacuetur. Modus tamẽ uacuationis eius pro-
 prius est. Nã detergere id ubi cõtumaciter inhaeret oportebit.
 Quòd si quis ijs quæ uehemẽter trahunt discutiuntq; me-
 dicamẽtis uacuare tentet, nec ijs quæ humectant & excalsa-
 ciũt molliat ac liquet, huic paucis primis dieb. egregiẽ pro-
 cessisse curatio uidebitur: ceterũ quod de affectu restabit, id
 insanabile erit. Siquidẽ toto quod in eo tenuiũ partiũ erat dis-
 cussio, quod reliquũ est, ueluti lapidosa concretio linquetur.
 Quippe etiam qui in articulari morbo uisuntur calli, ex hu-

more crasso glutinosoq; proueniūt, quando is non paulatim est discussus, sed uiolentis medicamentis totus simul siccatus. Hac igitur de causa ad scirrhosos affectus nullū uehementer excalfaciēs siccās ue medicamentū est aptū: sed ea tantū quæ cū emolliendo discutere cōmodē possunt. Huius generis sunt oēs medullæ atq; adipēs. E' medullis autē primas tenet ceruina, & uitulina, ex adipibus cōmendantur anserinus in uolucrum genere: leoninus uerò in quadrupedū genere præstat. At gallinaceus post anserinū sequitur, & pardinus leoninū, ac deinde ursinū & taurinū. At caprinus crasior et siccior prædictis est, magisq; hircinus. Inter resinas terebinthina & laticina eligēdæ. Emollit etiā ammoniacū thymiana, et bdelliū utrunq; magisq; Scythicū, quātō uidelicet est humētius. Pari modo & styrax qui humētior est, sicco utilior est. Eiusdē generis etiā sunt butyrū, altheæ radix, & alia quæ suprà in cap. De lienis duritia cōmemorauimus. E' quibus unguēta & cerata cōponi possunt, ibidē monstrauius. Ceterū inter curandū malē affectā particulā calido oleo fouere oportet, & glutinosa medicamēta postquā apposita fuerint, nunquā remouere, priusquam sponte decident. Imò si etiā lauandus sit eger, omnino permittenda sunt. A balneis tamē medicamentosis ac sponte natis prorsus abstinendū. Hæc enim huic malo aduersantur. Quid multa? quo pacto scirrhus relictus in aliqua parte corporis sit curandus, elegāti historia Gal. lib. 2. ad Glau. ca. 9. docet, quā illic studiosi legere possūt. Præterea cū mēbrorum alia rariora sint naturaliter, alia dēfiora, etiā uacuationē eorū diuersa specie remedia postulare est necessum.

Scirrhosū Hac igitur de causa tū in tendonibus, tum in ligamētis quum in tendoni scirrhosa fuerint, satius est ei curationi quā p molliētia morbus & ligamētis curamur, aliquid incidentiū admiscere. Ex quorū numero uel in ratio, primis acetū est. Interim uerò & in alijs partibus quas scirrhosus

rhus afficit, eo utimur. Verum in tendonibus & ligamentis
 in hunc modum. In aceto acerrimo candente igni lapidē extin-
 guere oportet, ac si quidē haberi potest, pyriten: sin eius co-
 pia nō datur, molarē. Deinde ascendente post infusum lapidē
 acetū uapore calido, in hoc dimoueri scirrhum ligamentū
 uel tēdo debet, atq; exinde rursus medicamētū quod molliat
 imponi. Multienim hoc modo curatiōis perfectē sanati sunt,
 ut ferē magicū opus, ut Galeni utar uerbis, uideretur. Initio
 tamē oleo, nō aqua, quotidie omnino laborātē particulā per-
 fundere oportet. Est autē id oleū haudquaquā adstringēs, sed
 planē tenuiū partiū, cuiusmodi Sabinū est. Incoquimus autē
 oleo interdū scenogræcū, anethi comā aut altheæ, ac sylue-
 stris cucumeris radicē. Ceterū curatio quæ per acetū admi-
 nistratur, utilis est uitio iam adulto, & quū preparata iā sub
 molliētibus pars fuerit. Si quidē aceti uis modo quis ea modi Aceti
 cē & debito tēpore utatur, salutaris eiusmodi affectibus est,
 cum crassos humores diffecans ac resoluēs: sin uel immodera-
 tius, uel in tēpore nō idoneo, tenuiores partes uiolēter absum-
 mens, id quod reliquū est lapidescere finit. Sed & si quis eo
 diutius utatur, substantiā ipsam neruorū attinget. Ob id igitur
 nec sēpē, nec inter initia, nec longo tēpore, medicamētis
 quæ ex aceto cōponuntur, ad ligamēta & tēdones utendū. At
 in liene, & carnosis musculi partibus scirrhus affectis, tutus
 eius est usus. Quippe raræ sunt naturaliter hæ partes, nec est
 quod metuas ne q̄s neruus eius ui ledatur. Ac ammoniacō qdē
 thymiamate cū aceto etiā non pauci lieni imponētes utūtur,
 ad luti scilicet crassitudinē qd' ex utrisq; est mixtū redactō.
 Utendū autē eo tū maximē erit, cū per emollientia medica-
 menta antea scirrhus tumor mollitus est: hoc nanq; tempo-
 re aceto liquatū ammoniacū maximū usum præstat. Sufficit
 autē eo uno altero ue die usos, rursus ad molliētia reuerti. Ac

486 DE MEDENDIS TVMOR.

rursus his pluribus diebus usos, denuo ad medicamē quod ex aceto sit redire, siue id ammoniacū, siue quid aliud habeat eorum quæ molliunt. In medio tēpore etiā radice altheæ in adipē anserino, aut gallinaceo, aut suillo liquata, et cataplasma tis more imposita uti licebit. Sylvestris etiā malvæ folia cum aliquo supradictorum tusa proficiunt. Quæ singula copiosius prosequitur Gal. lib. 14. The. Meth. et 2. ad Glauco.

De strumis. Cap. XIII.

Strumæ.

Strumæ, quas Græci χοιράδας uocāt, sunt glandulæ indurate. Vel (ut Gal. lib. 13. The. meth. definit) sunt scirrhomioses glandularū phlegmones. Barbari scrofulas uocāt. Fiūt magna ex parte in collo, alis, et inguibus quod ijs locis glā

Differētiæ strumarū.

dulæ uasis substratæ collocantur. Differunt strumæ inter se, magnitudine, natura, loco, ortu, multitudine, et uasorū cō-

Magnitudo.
Natura.
Mites.

plicatione. Magnitudine, quoniā quædā parue, quædam magnæ, quædā maximæ, quædā mediæ. Natura, quod aliæ mites, aliæ malignæ sint. Mites sine inflammatione, et dolore, cum mediocri duricie apparēt. Neq; enim molles sunt, sicut steatomata: neq; duræ, sicut scirrhus: sed mediā quandā inter hæc tactus proprietatē obtinēt, tumoremq; omnino circumscri-

Malignæ.

ptum rotundū, æqualēq; afficiunt. Malignæ uerò inflammationes, pulsantesq; dolores inuehunt, tumoremq; inæqualem præ se ferunt, in quo uasa prominent, contre ctatuq; manū efferuntur. Loco præterea differunt, quoniā quædam in po-

Locus.

sterioribus colli partib. quædā in obliquis, quædā circa guttur oriuntur. Item quædā superficiē statim sub cute, quædam

Ortus.

prope magna nobiliaq; uasa penitiores partes occupāt. Ortu, quod quædā quasi suspensæ, quædam insertæ oriuntur. Ac suspensæ quidē huc illuc facillē mouentur. Insertæ uerò subnuntur, ualidiorū corporum impetum tolerantes. Multitudi-

Multitudo.

ne, quod modo una, modo plures generentur. Vasorum complica-

plicatione, quedam enim uenas arteriaq; implicatas habēt, ^{Vasorū} quedā prorsus nō habent. Omnes autē suis mēbranis inclu- ^{plicatio.} dūtur, perinde atq; steatomata, aliteromata, & melicerides. Generantur perinde atq; scirrhi ex crassīs & glutinosīs hu- ^{Causa} morib. Notis ad mali huius cognitionem nihil opus: sensibus ^{Signa} enim, uisu nimirū, & tactu, statim deprehēditur. Paruæ stru- ^{Curatio} mæ maiorib. facilius curātur, sicut mites & blandæ inflama- tis. Malignæ uerō sanari nō possūt. Quū enim oēs huiusmodi strumæ cācerosæ ac uasis refertæ sint, dū curātur per manū, curationi non cedunt: & dum curantur, erumpēdi sanguinis periculū afferunt præterquā quod quum plerunq; penitiores inueniantur, minimē abscindi possunt: uasa enī nobilia tan- quā radices obtinent. Sed pro loci ratione superficialiæ pro- fundis curatu faciliores sunt. In curatione etiam strumarum, ^{Glandular} diligenter glandularum scirrho affectarum natura conside- ^{natura cō} randa. Sunt enim quedam, quæ in medio uasorum spacio cō- ^{deranda,} sistunt, & quod ibidem scissum & diductum est implēt, atq; adeo eius diductionis pro firmamento sunt. In ijs cū earum baud magnus animantibus, usus sit, curandi ratio est, ut totiū quod uitiatum est scalpello excindatur, uel medicamentis pu- trefcere cogentibus. Quæ autē sit ratio excidendi, nō est no- stri instituti docere. Eam tamē luculēter admodū tradit Aë- tius lib. 15. cap. 5. Et Paulus lib. 6. cap. 35. Præterea sunt quedā glandule, quæ uel salinam, uel lac, uel genitale semen, ad hæc quæ pituitosum quendam humorem in mesenterio, uel fau- cibus uel larynge generant. Harum certē maior est usus. ideo quum in scyrroso affectu sunt, non aliter quā reliquæ partes quæ scyrrho laborant, sunt sanandæ. Corpore itaque ^{Vacuatio,} primū per ea medicamenta, modō etas & alia permittant, quæ crassos & glutinosos humores educūt uacuato, ad emol- lencia primū, deinde uerō ad discutientia progrediendum.

De emollientibus satis copiosè capite præcedenti est dictum.

- Discussi-
tia.** Inter discutientia laudatur priuatim farina lupinorū **exoxy**
melite cocta & illita. Bouillum itē stercus aceto incoctū &
illitum. Probè etiam discutit strumas calx uiua melle, uel oleo
Ceratum. irino, uel adipe suillo excepta. Valet etiā hoc ceratū quod ha
bet: Sulphuris, seminis nasturtij et urticæ, sing. 3 1. nitri 3 1. f.
myrrhæ, galbani, ammoniaci, singu. 3 1. olei ueteris 3 1. f. Cum
cera & resina terebinthina quod satis est, in formetur cera-
tum. In pus cōuersas strumas rumpit loliacea farina cū fimo
Vicius. columbæ, & semine lini uino incocta. Caterū struma la-
borantibus aluius reddi facilis debet, tenuisq; uictus adhiberi.
Quare ab omnibus crassos generātibus succos abstineāt. Bi-
bant uinum tenue & album. Fugiāt potionē aque frigidæ ac
turbidæ. Deniq; ijs assiduè uomitus prouocari debet, & per
os illis pituitam educere oportet, atq; caput exiccare.

De cancro. Cap. XV.

- Cancerqđ.** **C**ancer est inæqualis, liuescens, aspectu teter, & cū dolo
re tumor. Nomen accepit à fluuiatili cancro: quē admo-
dum enim in isto pedes ex utraq; parte sunt corporis, ita in
hoc malo uenæ oppletæ, & in ambitu tensæ, canceri animalis
pedib. omnino sunt similes. Fit in omnibus humani corporis
partibus, sed sæpius in fœminarū māmīs, quæ à natura pur-
Causa. gationē nō habēt, q̄ rare & laxæ sint, ac crassissimā melācho-
lici humori materiā prōptè excipiāt. Generatur ex melācho-
lico humore feruescente, qui si acrior existat, ulcerationem
etiā efficit. Sunt enim duæ supremae cancerorū differētiæ. Nam
Signa. quidā eorū ulcere carent, & ij ab omnibus ferè antiquis oculi
ti appellantur. Quidam etiam exulcerātur. Tumor is magis
quām inflammatio nigricat, sed ita ut tantam caliditatem nō
experiatur. Venæ quæ in ambitu sunt intumescūt, intendun-
turq; canceri animantis pedum, ut diximus, modo. Quoniam
uerò

uerò à profundo inutilis sanguinis multitudo attrahitur, ideo uaricose uenae redduntur. Color cæci cinericeus, ad purpurā uergens, subliuidus: ac spe stantibus quidē mollis apparet, tangentibus uerò durissimus. Pungētes etiā dolores ac latē diffusos infert. At si exulceretur, iugiter erodit, et profundū suffodit, nec sisti potest, saniemq; emittit quocūq; feratū ueneno nequiorē, copia et odore abominandā. Hoc malū per sui initia, priusquā in mēbro figatur, curari potest. Sed ubi in molem satis insignē attollitur, insanabile efficitur, nemoq; illud sine manus opere curabit. Id ipsum autē accidit propter succi crassiciē, qui nec repelli, nec discuti potest, nec totius corporis purgationi cedit. Mitiora etiā remedia cōtemnit, uehementioribus uerò irritatur excandescitq;. Inchoātes itaq; cāctos prohibere ne augeſcant, id quod principio fit cōmoda uictus ratione, in qua uitanda sunt omnia melancholicū succum generātia, ut sunt carnes bubulae, ceruinae, leporinae, salsae, fabae, lentes, caseus, et eiusmodi, quae in cap. De melancholia sunt commemorata. Utendum uerò uberrimē ptisanæ cremore, malua, atriplice, beta, et huiusmodi elixis, piscibus saxatilibus, quibus uniuersis, prater eas quae in aquis uersantur: car nibus gallinae, hœdi, luteis ouī, et similibus cōcoctu facilibus, et sanguinē bonum procreantibus. Bibendum uinum tenue, album, nec ualdē antiquū. Interea etiā tēporis humorē unde malum natum est, ilico euacuare oportet. Vacuatio autem primū tentanda est sanguinis. Quare, modò etas et uir-

Curatio.
Victus ratio.

Venae sectio.

Purgatio.

cocto præparāte, quod in eodē loco cōmemorauimus. Si hæc morrhoides in uiris quibus emanare consueuerunt suppressæ sunt, recludātur. In mulieribus autē menses euocare oportet.

Localia. Post hæc humorē qui in partē decubuit repellere, uel discutere oportet. In hunc autē usum cōuenientissimus est succus solani, linteo duplici in eo tincto impositus. Extrinsecus lana molliuscula & ipsa succo illo imbuta circumdatur, cura adhibita, ne hæc siccescat, succo continenter superinfuso. Quod si noluerit egrotās medicamēto adeò humido illiniri, cū præsertim domū exit ad cōsuetā negotia peragēda, hoc

Vnguentū. unguento erit utendum, quod habet: Olei rosacei ℥ 2. succi è fructu solani hortēsis expressi ℥ 1. f. cerusæ lotæ, plūbi usti et loti, utriusq; ʒ 2. lithargyri ʒ ʒ. thuris ʒ 1. pompholygis ʒ ʒ. ceræ albæ q. f. fingatur unguentū, quo locus patiens quotidie illinatur. Licebit interdū adijcere lemnii sigillū, & bolū armeniā, & succū semperuiui, uel uuæ acerbæ in plumbeo mortario cū plumbeo pistillo usq; ad glutinis cōsistētiā subacta. Nec parū prodest canceri usti cinis cū cadmia lota in spersus, uel in cerato illitus. Panis etiā cum symphito apponēdus, ita quantitātē moderando ne aggrauet. Folia quoq; althææ elixæ per se, aut cum pane cōmixta illinēda. Itē rosæ, melilotū, papaueris semē cum passo trita & paululū decocta, ac subinde cum luteis ouorū subacta applicanda. Porro assiduē etiā hoc malo correptis danda sunt medicamenta quæ uenenatis

Canceri ulcerati curatio. aduersantur, ut est theriaca & antidotū mithridaticum. Vlcera ceratis canceris, cū constet illos medicamentis & manuum tractatione exacui & irritari, placidissima medicamēta sunt imponenda, quale est hoc unguētum quod habet: Olei rosæ

Vnguentū. cei ℥ 3. adipis porcini ℥ 1. lithargyri ʒ ʒ. uitellos oui affos quinq; num. ceræ albæ qd' satis, fiat unguentū. Quod si ulcus dolore uacauerit, adijcito etiā iridis, myrrhæ, aristolocbie, singul. ʒ 1. Hoc itaq; unguento cancer illinendus. Commenda-

et etiā succus solani & plantaginis admixto puluere auripigmenti, si ijs locus patiens illinatur, & linteum in ijs mandefactum superponatur. Ceterum si quando cancer per chirurgiā curare audebis, coepisse quidē à uacuando per purgationē melancholico humore oportebit. Vbi uerò totum quod uitiatum est, prorsus excideris, sic ut nulla supersit radix, si ne effluere sanguinē, nec propter eum inhibebis: imò premendo potius uicinas partes, exprimes ex his crassiorem sanguinem: mox alijs ulceribus similiter curabis.

Cancer per
chirurgiā
ablatus.

De elephantia. Cap. XVI.

Eλεφας καὶ ἐλεφαντίασις uniuersi corporis cancer Elephātia est. Sic uocatū malū hoc, quod corio elephātis cutis in eo persimilis uideatur. Nā maculis quibusdā ad atrū colorē uergentibus inscitur, in equaliterq; aspera, crassa, & ueluti squamis fœda, liuēs, serinaq; redditur. Vnde satis liquet, elephātiā sin à lepra Arabum nihil differre, ut demonstrauimus lib. 2. Parad. ca. 16. Dicitur etiā Satyriasis, Gal. lib. De causis morb. cap. 5. teste quod facie, qui sic laborant, satyris similes sint, ut infra dicemus. Quin & alacritas uehemēs ad coitum ipsi adest. quēadmodū de satyris fertur, quod scilicet semine abundēt, Largior siquidē ipsius generatio in seminarijs uasis ob materie crassitiē accidit. Vocatur etiā Leontiasis, quod frons agrorū cū quodā tumore laxior reddatur, ad similitudinē pellis flexilis superciliorū leonis. Est autē graue malū et prope ex corū numero quę incurabilia existūt. Et graue quidem est ipsi agro, intolerabile autē cōspiciētibus utpote qui ipsum omnino auersantur, adeo ut pleriq; ex necessarijs & domesticis egri, ipsius cōuersionē deuitēt. Et sanē malū est cū ipsis cōuersari: inquinatur enim aēr quē inspirādo attrahimus, ex ulcerū fœtore, & ex uitiatā spiritus exhalatione. Origo mali est ex atra bile, quę ex crasso et fœculēto sanguine, aut flaua bile nimii uisā pcreatur, aut pituita salsa. Qua

Elephātia
sis à lepra
Arabū ni-
hil differt.
Satyriasis.

Elephāticū
curad ve-
nerem ala-
ciores.
Leontiasis.

Causa.

492 DE MEDENDIS TVMOR.

re hoc ipso magis corripuntur, qui ex praua uictus ratione
 Signa. crassum & uiscosum ac melancholiū sanguinē aceruāt. Con-
 sequitur eos qui obnoxij futuri sunt huic malo segnicies. spira-
 tio tarda, spiradi difficultas, motus difficilis, assidua cōstria-
 ctio alui, urinarū ueluti sūt iumētorū loti: excretio, respira-
 tio grauis & fœtida, ructus cōtinui, qui etiā ipsis ægris ali-
 quid molestiæ addūt, appetitus nō obtusi, impetus in uenerē
 intensus. Iam uerò ubi ad cutē progressū fuerit malū, primū
 male crassiores fiunt, & mentū dilatatur, deinde rubescunt,
 non florido sed liuido colore. Capilli etiā capitis magna ex
 parte rari fiūt, piliq; superciliū decidūt. Nasus fit simus,
 aures extenuatæ, labra crassa, uox rauca, & sub lingua ue-
 nulae uaricosæ fiunt, nigrescuntq; : quod signum est etiā ui-
 scera ipsa in simili cōstitutione esse, eiusmodi planè qualis in
 porcis quibusdā circa interna uidetur, quæ grandinis nomi-
 ne insignitur. Quandoq; uerò & per omne corpus eminē-
 tiæ apparent, & præsertim iuxta summā frontē ac mentum.
 Corpus præterea ipsorum magnū esse uidetur, & cuiusdam
 intolerabilis grauitatis eis sensus adest. Pusillanimes fiūt ad
 omnia. Quidē porrò ex eis ad modū eorū qui strāgulantur,
 maximè circa somnos afficiuntur. Quanquā uerò malū hoc
 ferè incurabile sit, tamē humanum est, ut ait Aëtius, & ple-
 num beneuolētiæ signum, in extremis etiā malis usq; ad expe-
 rimentū procedere, ad difficultatē eorū cōpescendā. Princi-
 pio itaq; uictus ratio eiusmodi præscribenda. A somno mē-
 bra eorum plurimū et leniter manibus cōtrectari debēt. De-
 inde curandum ut aluius excrementa deponat. Post hæc deambu-
 lent, aut gestationibus cōmittantur, & clamore exerceantur,
 aut frictionibus alijs ue generibus exercitationum utantur.
 Sudore subinde, quē illinc cōtraxerunt, absterfo, adipe
 urfino aut uulpino illinantur : qui si non adsint, caprimo aut
 taurino, aut pro ijs aliquis ex uolucrū genere, aut butyrū re-

Victus ratio.

cens sumatur. Pauxillo temporis interposito cum scenogra-
 ci aut ptisanæ succo, qui parū ammoniaci cum aceto liquefa-
 cti a mixtū habeat, perfundatur, atq; ita lauacro utatur. No-
 ciū enim est malo, si quis nō lauet. Cōmoda sunt etiā arida fō Balneum.
 menta, & post sufficientē ex dictorū usu exudationē, natatio-
 nes in mari, aut sulphurulētis & aluminosis aquis. Fomenta,
 uerò parabūtur ex sumaria, origano, scabiosa, oxylapatho,
 chamemelo, meliloto, mentastro, & similibus. A balneo de-
 tersi, ad acrimonie & mordacitatis curationē ex oleo myr-
 teo, rosaceo, aut mastichino cū aceto et uino cōquassatis illi-
 nantur. Aut decocto aliquo eorum quæ adstringūt, plantagi-
 nis scilicet, aut betæ, aut helxines, perfundantur. Optimū est
 & butyrum recēs illiū. Post lotionē & extersionē per te-
 nera lintecola ad horæ dimidium quiescāt: deinde aqua tepida
 hausta spōtē uomāt, digitis in os, aut pinnis demissis. Postea
 modico interuallo tēporis interposito, uinū absinthites, aut
 ex origano cōfectū bibāt, nō infrā hemine mensurā, & pau- Cibi.
 lō post cibis eis apponatur. Cibus autem erit panis hordea-
 ceus, aut triticeus recēs. Inter olera betæ, lactuca, malua, lapa-
 thum, sisarū, porrū, brassica binis aquis edulcata, & cappa-
 ris. Rectē etiā ipsis datur ptisana, oua sorbilia, alica lota, lac
 cū melle. Carnibus auicularū montanarū utantur, & hædo-
 rū, gallinarū, caporū, & ijs similib. Piscibus molli carne præ-
 ditis. Ex fructibus cōueniūt ficus & uue arefactæ, pyrū co-
 ctū in aqua mulsā. A reliquis fructibus omnino abstineāt. Bis
 cibū capere præstat, q̄ semel se replere. Prædiū simplicissimē
 paretur: cœna magis uaria sit. Potus sit uinū tenue, albū & a-
 quosū. Aut aqua in qua parū cinnamomi decoctū sit. Vino
 forti & uimoso, perinde atq; uenere, per totū morbi curricu-
 lū abstineāt. Sōnus porrò diurnus nociuus, nocturnus aptissi-
 mus. Post longū a cœna interstitiū, deambulatio lenta, ac se- Deambula-
tio
 sun facta cōmoda est, ut cibi eo melius descendant. Quod ad Curatio.

curandirationem attinet, protinus inter initia sanguis mitti debet, & magis uere, in quo potissimum hoc malū nascitur, & intenditur. Reuiuiscit enim inde aliquo modo insitus calor, & sensibiliter corpus ipsum alleuatur. Auferendus autē particulatim ex utroq; cubito, ac incidēda interna aut media quæ in cubitis existit uena. Habēdus etiā modus est in euacuādo, in multo enim prauo ac uitiato sanguine parum quiddam boni sanguinis inest. Post sanguinis detractiōē, nouem decem uel diebus interpositis aluus infernē subducatur. Quibus uerò medicamētis purgandū sit corpus, in cap. De melācholia, & alijs quibusdā, ubi de uitijs cutis egimus, dictū est. Post dies autē aliquot sero lactis utendū, ex eoq; non minus tribus acetabulis, neq; ultra quinq; accipiendū, Aëtio & Paulo testibus. Admiscendū est illi aliquid scāmonie, epithymi, uel senæ: ita ut hæc ipsa cū modico sero ieiunis præbeamus, atq; deinde ipsum serū paulatim exhibeamus. Hac purgatione frequēter utendum est. Omnino nanq; conandum est, ut omnem corporis habitū ab hoc malo occupatū liquefaciamus, aliūq; quendā ueluti ex integro regeneremus. Id ipsum uerò fiet, si per interualla opportunē purgationes adhibeantur, & cibi apponātur qui facili cōcoqui & distribui possint. Deinceps uomitus citetur à cibo, aut ieiunis à radiculis. Postea ad uerum perueniendū. Post hæc autē uiriū refocillatrice uictus ratione utendū est, ac medicamentis quæ summā cutē desiccant adstringantq;. Leues igitur cucurbitulæ ori uentriculi, & hypochondrijs utrinq; affigentur. Et primo quidē auxiliorū circuitu hoc modo perfectō, rursum ad principiū reflectendum est. Et uenæ quidem sectio uitetur, ut quæ plus noxæ quàm præsidij esset allatura. Ab hiera uerò principiū purgandi sumatur: & reliqua deinceps ordine faciēda, uelut prædictū est, ter & quater in anno codē ductu repetito. Malignū enim & difficulter cedens malum est, quapropter plurima

Venæ sectio.

Purgatio.

Vomit.

cura opus est, ne in peius euadat. Caterum theriaca ex uiperis Andromachi mirifice prodest, & quasi cōpendiū totius curationis est, si post purgationes per modica interualla præbeatur, & ea cutis etiā oblinēda. Mirabile quoq; elephantie remediū uiperarum esus existit, ut testatur Galenus lib. 2. ad Glau. cap. penult. Eas autē hoc modo apparatus edere oportet. Primū quidē capite amputato, & cauda usq; ad digitos quatuor, & detracta pelle, & omnibus interaneis exēptis, corpus ipsarū aqua bis aut ter lotū, in olla instar anguillarū coquitur, aqua quidē sufficiente affusa, & oleo modico cum porro & anetho. Liquet autē, quod carnes sint decoquendæ donec molles reddantur. Post sufficientē cocturā, iusculū moderato sale cōdiatur, atq; ita ægro in sole desidenti exhibeatur, capite tamē probē uelato. Neq; uerō semel tantū aut bis uiperas edere satis est, sed sæpē id fiat, quum extra periculū sit, & in super cōmoditatem afferat. Sint autē uiperæ recens capte, & ex humectioribus locis accipiātur. Nam quæ iuxta mare, aliāq; salsa loca degunt, uehementē siticulosæ existunt. Viperarū autē esum mirificè cōferre elephantia correptis, multis historijs lib. 11. De simp. med. fac. cap. 2. Gale. cōprobat. Porro extrinsecus, in balneo potissimum, medicamenta quæ extergūt & repurgāt sunt adhibenda, ut est nitrū, sulphur uiuum, pumex, testa sepiæ, nigella, rumex acutus, quæ interdū arida affricari possunt. Aut trita cum aceto, aut rosaceo oleo, aut mastichino corpori illinēda sunt. Profunt etiā ea medicamenta quæ suprā in cap. De impetigine dicta sunt. Præterea tuberosi tumores efferati & inflāmati in facie, illi nantur cū succis plātaginis, polygoni, portulacæ, lylicio, hyposcisthidae aloë, & similib. Si aut nō fuerint inflāmati, ut edū est ijs remedijs, quæ suprā De impetigine et scabie dicta sunt.

Theriaca
Viperarū
esus.Viperarū
preparatiExtrinsē
cus quæ ac
mouenda.

F I N I S.

BIBLIOTHECA